

Екологія_бакалавр_2019/2020

Базовий рівень

1. Термін "екологія" вперше було запропоновано:
 - а. Вернадським
 - б. Зюссом
 - в. Тенслі
 - г. Геккелем
2. Розділ теоретичної екології, який займається вивченням взаємозв'язків окремих особин з оточуючим середовищем називається:
 - а. аутокологія
 - б. демекологія
 - в. синекологія
 - г. біогеоценологія
3. Розділ біоекології, який вивчає структурно-функціональні характеристики і динаміку біосистем популяційного рівня у зв'язку з дією сукупності абіотичних і біотичних факторів середовища називається:
 - а. аутокологія
 - б. демекологія
 - в. синекологія
 - г. біосферологія
4. Комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біосферу, загалом, та кругообіг в ній речовини й енергії називається:
 - а. синекологією
 - б. аутокологією
 - в. демекологією
 - г. глобальною екологією
5. Термін "екосистема" вперше введено:
 - а. А. Тенслі
 - б. Е. Геккелем
 - в. Ю. Одумом
 - г. В.І. Вернадським
6. Особини одного виду або угруповання інтенсивність розвитку яких у тому чи іншому середовищі є показником певних екологічних процесів називаються:
 - а. біоіндикаторами
 - б. біотесторами
 - в. еврибіонтами
 - г. стенобіонтами
7. Об'єктом дослідження екологічної науки є:
 - а. навколишнє середовище;
 - б. угруповання живих організмів
 - в. біота в цілому
 - г. екосистема

8. Науковий напрям, який аналізує стосунки між особинами, які належать до різних видів певного угруповання, а також між ними і оточуючим середовищем називається:

- а. синекологією
- б. аутокологією
- в. демекологією
- г. глобальною екологією

9. Екологічна система, до складу якої входять популяція і середовище її існування називається:

- а. моноцен
- б. демоцен
- в. плеоцен
- г. поліцен

10. Метод наукового дослідження, при якому дослідник не втручається у перебіг природних процесів називається:

- а. аналіз
- б. моделювання
- в. експеримент
- г. спостереження

11. Методологічною основою біоекології є метод:

- а. аналізу
- б. моделювання
- в. експерименту
- г. спостереження

12. В основі поділу екологічних факторів Ніколсона-Шведтфегера лежить:

- а. періодичність появи
- б. генезис
- в. важливість для забезпечення життєздатності виду
- г. специфіка впливу на структурно-функціональні параметри екосистем

13. У відповідності до класифікації екологічних факторів Мончадського зміна пір року належить до групи:

- а. первинно періодичних
- б. вторинно періодичних
- в. умовно важливих
- г. другорядних

14. Температура як екологічний фактор діє за принципом:

- а. градієнтів
- б. "все або нічого"
- в. функціональності
- г. ціленаправленості

15. До абіотичних екологічних чинників відносяться:

- а. ґрунтова волога, повітря і підстилаючі гірські (гірничі) породи
- б. фітоценози, що визначають хід біологічної продуктивності
- в. ґрунти, включаючи ґрунтових мікроорганізмів і ґрунтову вологу
- г. сонячна радіація і продуценти, що використовують її для виробництва біомаси

16. Екологічною нішею називається:

- а. позиція виду у співтоваристві в співвідношенні з іншими видами і середовищем перебування
 - б. територія переважного незаселеного якогось виду
 - в. територія, в межах якої здійснюється конкурентна боротьба між видами
 - г. місцеперебування будь-якого виду організмів, що характеризуються сприятливими для нього умовами
17. Організми, які витримують сильний ступінь дефіциту кисню, називаються
- а. реофіли
 - б. олігосапроби
 - в. мезосапроби
 - г. полісапроби
18. Якому з основних підходів відповідає таке визначення "Популяція – сукупність особин одного виду, які заселяють територію певної конкретної екологічної системи":
- а. феноценотипічному
 - б. генетичному
 - в. ценотипічному
 - г. плеотипічному
19. Стратегія розвитку, при якій відбір спрямований на імовірність виживання окремих особин це:
- а. r - стратегія
 - б. T - стратегія
 - в. K - стратегія
 - г. L – стратегія
20. Популяція, в якій виразно виявляється відмінність життєвих вимог у різних фазах життєвого циклу, а окремі особини займають різне місце у середовищі називається:
- а. геміпопуляція
 - б. ценопопуляція
 - в. елементарна популяція
 - г. псевдопопуляція
21. Найбільш точно визначення біоценозу:
- а. сукупність взаємодіючих між собою організмів, які населяють певну ділянку суші чи водойми
 - б. сукупність рослинних організмів, що займають певну територію
 - в. сукупність біотичних і абіотичних умов певної ділянки суші чи водойми
 - г. сукупність тварин, які є ланками трофічного ланцюга
22. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов'язані між собою обміном речовин і потоком енергії – це:
- а. біогеоценоз
 - б. екосистема
 - в. агроценоз
 - г. сукцесія
23. До першого трофічного рівня належать:
- а. консументами I порядку
 - б. продуцентами

- в. деструкторами
- г. біоредукторами

24. Біологічна продуктивність це:

- а. загальна кількість біомаси, що виробляється угрупованням або популяцією за одиницю часу на одиниці площі
- б. темпи розвитку будь-якого організму, залежно від умов його місцеперебування
- в. функціонування трофічного ланцюга екосистеми або ландшафту
- г. загальна кількість енергії, яка засвоюється консументами угруповання

25. Принцип конкурентного витіснення Г.Ф. Гаузе полягає у тому, що

- а. два види не можуть займати один ареал, якщо їхні екологічні потреби ідентичні
- б. неможливий розвиток екосистем при надмірному техногенному тиску
- в. успіх не може протікати в умовах дефіциту вологи або сонячної енергії
- г. екосистема не досягне клімаксного стану в разі деструктивної сукцесії

26. Трофічні структури біоценозів, які зображуються графічним методом є:

- а. екологічні піраміди
- б. трофічні ланцюги
- в. екологічні гістограми
- г. трофічні діаграми

27. Сфера розуму:

- а. ноосфера
- б. техносфера
- в. номогенез
- г. біосфера

28. Сукупність живих організмів Землі утворює:

- а. живу речовину
- б. біогенну речовину
- в. біокосну речовину
- г. літосферу

29. Нижня межа біосфери зумовлена:

- а. нестачею кисню
- б. надвисокими температурами, при яких відбувається денатурація білка
- в. надлишком вуглекислоти
- г. надвисокими тисками глибин Землі

30. Середовищевірна функція біосфери це:

- а. мінералізація органічної речовини та розкладання гірських порід
- б. трансформація фізико-хімічних властивостей природних сфер Землі
- в. перенесення хімічних елементів між різними компонентами навколишнього середовища
- г. вибіркоче накопичення окремих видів речовин

31. Кругообіг вуглецю на Землі є прикладом:

- а. косного процесу
- б. біогенного процесу
- в. біокосного процесу
- г. радіоактивного розпаду

32. Вибіркове накопичення атомів окремих речовин лежить в основі функції біосфери:
- концентраційної
 - енергетичної
 - транспортної
 - середовищетвірної
33. Система управлінських рішень, які визначають вплив суспільства на довкілля, тактику і стратегію екологічно збалансованого розвитку називається:
- економіка природокористування
 - екологічна політика
 - екологічний маркетинг
 - екологічна експертиза
34. Розділ екології, який вивчає обсяги, механізми і наслідки впливу на навколишнє середовище різних галузей і об'єктів антропогенної діяльності називається:
- геоекологією
 - демекоекологією
 - техноекологією
 - біоекологією
35. Наука, яка вивчає біосферу, в цілому, та кругообіг в ній речовини й енергії називається:
- синекологією
 - аутекологією
 - демекоекологією
 - глобальною екологією
36. Система поглядів, згідно з якою людина є центром всесвіту і його кінцевою метою називається:
- геоцентризмом
 - біоцентризмом
 - антропоцентризмом
 - екоцентризмом
37. Де прийнято "Порядок денний на XXI століття":
- на Конференції ООН у червні у Ріо-де-Жанейро
 - на Базельській конференції у 1989 року
 - на Роттердамському саміті у вересні 1989 року
 - у рамках Стокгольмської конвенції у травні 2004 року
38. Яке з нижче зазначених тверджень не є законом Баррі Коммонера?
- все пов'язано зі всім
 - все повинно кудись подітися
 - природа знає краще
 - природа самовідновна
39. Яке із визначень не відповідає поняттю "екологічна толерантність":
- стійкість живих організмів до дії факторів середовища
 - діапазон між екологічним мінімумом і максимумом
 - екологічна валентність виду, зумовлена його пристосувальною здатністю
 - взаємовідносини виду або популяції з екосистемою
40. Кліматичні фактори середовища існування належать до:

- а. біотичних
- б. абіотичних
- в. антропогенних
- г. біогенних

41. Як співвідносяться між собою поняття біогеоценоз і екосистема:

- а. біогеоценоз є окремим випадком екосистеми
- б. біогеоценоз - екосистема в межах конкретного фітоценозу
- в. екосистема є окремим випадком біогеоценозу
- г. як синоніми

42. Група особин деякої популяції, яка не має змоги розмножуватись на даній території називається:

- а. локальна популяція
- б. елементарна популяція
- в. ценопопуляція
- г. псевдопопуляція

43. Поліциклічними називаються популяції :

- а. які складаються з особин одного віку
- б. які складаються з особин різних вікових станів і поколінь
- в. із різко переважаючою кількістю особин постгенеративного віку
- г. із різко переважаючою кількістю особин генеративного віку

44. Інтенсивним зростанням у формі геометричної прогресії характеризується:

- а. показниковий тип росту чисельності
- б. логістичний тип росту чисельності
- в. циклічний тип росту чисельності
- г. стабільний тип росту чисельності

45. Кінцева відносно стійка фаза природного розвитку екосистеми, яка максимально відповідає екологічним характеристикам місцевості у певний період називається:

- а. сукцесією
- б. клімаксом
- в. ектоном
- г. крайовим ефектом

46. Загальна кількість енергії, утворена продуцентами певного угруповання називається:

- а. чиста продукція
- б. валова продукція
- в. біопродукція
- г. вторинна продукція

47. Канали, якими постійно відбувається передача енергії з одного трофічного рівня на інший називаються:

- а. ланцюгами живлення
- б. пірамідами енергії
- в. кормовою мережею
- г. трофічною структурою

48. Горизонтальна структуризація біосфери розпочинається з:

- а. біому
- б. синузії
- в. біогеоценотичного комплексу
- г. біогеоценозу

49. Верхня межа біосфери зумовлена:

- а. низькими температурами, при яких порушується нормальний хід ферментативних процесів
- б. нестачею кисню та вуглекислого газу
- в. наявністю короткохвильового ультрафіолетового випромінювання
- г. дефіцитом вологи у верхніх шарах атмосфери

50. Максимум живої речовини біосфери локалізовано на межі:

- а. нижні шари тропосфери – земна кора – верхні шари гідросфери
- б. верхні шари тропосфери – нижні шари стратосфери
- в. нижні шари земної кори - верхні шари мантії – зона нафтоутворення
- г. нижні шари гідросфери - верхні шари мантії

51. Поглинання сонячної енергії в процесі фотосинтезу та її передача по кормових ланцюгах лежить в основі:

- а. концентраційної функції біосфери
- б. енергетичної функції біосфери
- в. транспортної функції біосфери
- г. трофічної функції біосфери

52. Деструктивна функція біосфери полягає у:

- а. мінералізації органічної речовини та розкладанні гірських порід
- б. трансформації фізико-хімічних властивостей природних сфер Землі
- в. перенесенні речовин проти сили тяжіння за горизонтальним вектором
- г. вибіркового накопиченні окремих видів речовин

53. Наука, яка вивчає економічні аспекти раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища називається:

- а. економіка природокористування
- б. урбоекологія
- в. екологічний аудит
- г. екологічна експертиза

54. Стратегія сталого розвитку:

- а. віддає перевагу захисту екологічного стану довкілля
- б. віддає перевагу необхідності підвищення темпів економічного росту
- в. передбачає різке зниження темпів економічного росту
- г. передбачає гармонізацію екологічного, економічного та соціального розвитку

55. Блок екологічних наукових напрямів, результати досліджень яких спрямовані на вирішення практичних проблем охорони навколишнього природного середовища називається:

- а. біоекологія
- б. прикладна екологія
- в. соціальна екологія
- г. геоекологія

56. Системний підхід в екології заснований:

- а. Л. фон Берталанфі
- б. А. Лоткою
- в. Дж. Хакслі
- г. Е. Геккелем

57. Оберіть найбільш точне визначення біоценозу:

- а. сукупність взаємодіючих між собою організмів, які населяють певну ділянку суші чи водойми
- б. сукупність рослинних організмів, що займають певну територію
- в. сукупність біотичних і абіотичних умов певної ділянки суші чи водойми
- г. сукупність тварин, які є ланками трофічного ланцюга

58. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов'язані обміном речовин і енергії – це:

- а. біогеоценоз
- б. біотоп
- в. агроценоз
- г. сукцесія

59. Перший трофічний рівень представлений:

- а. консументами I порядку
- б. продуцентами
- в. деструкторами
- г. біоредукторами

60. Що таке біологічна продуктивність?

- а. загальна кількість біомаси, що виробляється угрупованням або популяцією за одиницю часу на одиниці площі
- б. темпи розвитку будь-якого організму, залежно від умов його місцеперебування
- в. функціонування трофічного ланцюга екосистеми або ландшафту
- г. загальна кількість енергії, яка засвоюється консументами угруповання

61. У чому полягає принцип виключення Г.Ф. Гаузе?

- а. два види не можуть займати один ареал, якщо їхні екологічні потреби ідентичні
- б. неможливий розвиток екосистем при надмірному техногенному тиску
- в. сукцесія не може протікати в умовах дефіциту вологи або сонячної енергії
- г. екосистема не досягне клімаксного стану в разі деструктивної сукцесії

62. Графічним методом зображення трофічної структури біоценозів є:

- а. екологічні піраміди
- б. трофічні ланцюги
- в. екологічні гістограми
- г. криві живлення

63. Сфера взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна діяльність є визначальним фактором розвитку:

- а. ноосфера
- б. техносфера
- в. номогенез
- г. літосфера

64. Сукупність усіх живих організмів на Землі називається:

- а. живою речовиною
 - б. біогенною речовиною
 - в. біокосною речовиною
 - г. косною речовиною
65. Нижня межа біосфери обумовлена:
- а. нестачею кисню
 - б. надвисокими температурами, при яких відбувається денатурація білка
 - в. надлишком вуглекислоти
 - г. надвисокими тисками глибин Землі
66. Середовищевірна функція біосфери полягає у:
- а. мінералізації органічної речовини та розкладанні гірських порід
 - б. трансформації фізико-хімічних властивостей природних сфер Землі
 - в. перенесенні хімічних елементів між різними компонентами навколишнього середовища
 - г. вибіркового накопиченні окремих видів речовин
67. Кругообіг карбону на Землі є прикладом:
- а. косного процесу
 - б. біогенного процесу
 - в. біокосного процесу
 - г. радіоактивного розпаду
68. Вибіркове накопичення атомів окремих речовин, розсіяних у природі, лежить в основі:
- а. концентраційної функції біосфери
 - б. енергетичної функції біосфери
 - в. транспортної функції біосфери
 - г. середовищевірної функції біосфери
69. Система концепцій, принципів, підходів, заходів, які визначають вплив суспільства на навколишнє середовище, тактику і стратегію екологічно збалансованого розвитку називається:
- а. економіка природокористування
 - б. екологічна політика
 - в. екологічне управління
 - г. екологічна експертиза
70. Розділ прикладної екології, який досліджує вплив різних галузей і об'єктів антропогенної діяльності на довкілля називається:
- а. аутоекологією
 - б. соціоекولوгією
 - в. техноекولوгією
 - г. біоекولوгією
71. Термін "біосфера" вперше було вжито:
- а. В.І. Вернадським
 - б. М.Ф. Реймерсом
 - в. Е. Зюссом
 - г. Ю. Одумом
72. Вчення про біосферологію розвинуто:
- а. В.І. Вернадським
 - б. М.Ф. Реймерсом

- в. Е. Зюссом
- г. Ю. Одумом

73. Ґрунт належить до:

- а. косної речовини
- б. біогенної речовини
- в. біокосної речовини
- г. живої речовини

74. Дисципліна, яка вивчає економічні аспекти раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля називається:

- а. економіка природокористування
- б. екологічна політика
- в. екологічне управління
- г. екологічна експертиза

75. Концепція сталого розвитку:

- а. віддає перевагу захисту екологічного стану довкілля
- б. віддає перевагу необхідності підвищення темпів економічного росту
- в. передбачає різке зниження темпів економічного росту
- г. передбачає гармонізацію екологічного стану довкілля і економічного розвитку

76. Розділ прикладної екології, який (за М.Ф. Реймерсом) вивчає шляхи оптимізації взаємовідносин людського суспільства з природою називається:

- а. геоекологією
- б. соціекологією
- в. техноекологією
- г. біоекологією

77. Розділ прикладної екології, який вивчає особливості впливу на довкілля різних галузей і об'єктів людської діяльності називається:

- а. синекологією
- б. соціекологією
- в. техноекологією
- г. біоекологією

78. Комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біосферу, вцілому, та кругообіг в ній речовини й енергії називається:

- а. синекологією
- б. аутоекологією
- в. демекологією
- г. біосферологією

79. Комплексна дисципліна про навколишнє середовище, його якість та охорону – це:

- а. біоекологія
- б. енвайронментологія
- в. глобальна екологія
- г. агроекологія

80. Світоглядна концепція, згідно з якою окремі особини живих істот, насамперед птахів і ссавців, є морально значимими і вимагають турботи:

- а. біоцентризмом
- б. геоцентризмом
- в. антропоцентризмом
- г. екоцентризмом

81. Система поглядів, згідно з якою жива природа є основою світобудови, а біосфера – природне утворення, здатне до самоорганізації називається:

- а. біоцентризмом
- б. геоцентризмом
- в. антропоцентризмом
- г. екоцентризмом

82. Екологічну групу рослинних організмів, що зростають на засолених ґрунтах називають:

- а. псамофіти
- б. галофіти
- в. петрофіти
- г. гігрофіти

83. Як називається ділянка абіотичного середовища, яку займає угруповання живих організмів:

- а. ареал
- б. біоценоз
- в. біотоп
- г. екотоп

84. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов'язані обміном речовин, енергії та інформації – це:

- а. біоценоз
- б. екосистема
- в. агроценоз
- г. сукцесія

85. Вид взаємовідношень між видами, внаслідок яких обидва види отримують користь від сумісного існування називають:

- а. мутуалізмом
- б. мімікрією
- в. симбіозом
- г. адаптацією

86. Ключовим фактором формування вертикальної структури біоценозів є:

- а. характер підстилаючої поверхні;
- б. видовий склад рослинних угруповань;
- в. географічна широта місцевості;
- г. проникнення сонячного світла на окремі яруси рослинного угруповання.

87. Екологічну групу рослин, що ростуть на перезволожених ґрунтах називають:

- а. псамофіти
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. гігрофіти

88. Екологічну групу рослин, що ростуть на кислих і дуже кислих ґрунтах називають:

- а. псамофіти
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. ацидофіли

89. Екологічну групу рослин, що ростуть при нейтральній кислотності ґрунтового розчину називають:

- а. ацидофіли
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. нейтрофіли

90. Екологічну групу рослин, що не виявляють чіткої вимогливості до кислотності ґрунтового розчину називають:

- а. ацидофіли
- б. індиферентні
- в. геліофіти
- г. нейтрофіли

91. До біотичних екологічних чинників відносяться:

- а. ґрунтова волога, повітря і підстилаючи гірські породи
- б. конкуренція, мутуалізм, коменсалізм, аменсалізм
- в. ґрунти, включаючи ґрунтових мікроорганізмів і ґрунтову вологу
- г. сонячна радіація і продуценти, що використовують її для виробництва біомаси

92. Абіотична складова екосистеми це:

- а. продуценти
- б. консументи
- в. редуценти
- г. органічні та неорганічні сполуки

93. Екологічну групу рослин, що добре розвиваються в умовах високих температур називають:

- а. псамофіти
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. термофіли

94. Екологічну групу рослин, що добре розвиваються в умовах низьких температур називають:

- а. психрофіли
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. термофіли

95. Рослини, які приурочені до ґрунтів з лужною реакцією ґрунтів називають:

- а. психрофіли
- б. базифіли
- в. геліофіти
- г. термофіли

96. Зміни рослинного покриву, які характеризують перехід одного фітоценозу в інший та мають необоротний пкрєбіг називають:

- а. сукцесією
- б. флорогенезом
- в. фітоценогенезом
- г. флорогенезом

97. Біологічні види з великою пристосовуваністю до змін навколишнього середовища або ж іншими словами до різноманітних умов існування називаються:

- а. біоіндикаторами
- б. біотесторами
- в. еврибіонтами
- г. стенобіонтами

98. Біологічні види з малою пристосовуваністю до змін навколишнього середовища називаються:

- а. біоіндикаторами
- б. біотесторами
- в. еврибіонтами
- г. стенобіонтами

99. Позиція виду у співтоваристві в співвідношенні з іншими видами і середовищем перебування це:

- а. екологічна ніша
- б. біотоп
- в. сукцесія
- г. мутуалізм

100. Пристосування організмів до навколишнього середовища це:

- а. екологічна ніша
- б. адаптація
- в. сукцесія
- г. мутуалізм

101. Другий трофічний рівень представлений:

- а. консументами I порядку
- б. продуцентами
- в. деструкторами
- г. біоредукторами

102. Третій трофічний рівень представлений:

- а. консументами I порядку
- б. продуцентами
- в. редуцентами
- г. консументами III порядку

103. Територій стику або зон різкого переходу між двома і більше різними екологічними це:

- а. континуум
- б. екотон
- в. агроценоз
- г. сукцесія

104. Діапазон інтенсивності дії екологічного фактора, в якому можливе існування певного виду це:

- а. екологічна валентність
- б. континуум

- в. зона песимуму
- г. екотон

105. Синонімом популяційної екології є:

- а. Синекологія
- б. демекологія
- в. геоботаніка
- г. фітоценологія

106. Якому з нижче перелічених підходів відповідає таке визначення "Популяція – сукупність особин одного виду, які заселяють територію конкретної екосистеми":

- а. фенотипічному
- б. генотипічному
- в. ценотипічному
- г. плеотопічному

107. Сукупність особин одного виду, що формується і розвивається під впливом однорідних фітоценотичних умов і однаково на них реагує називається:

- а. геміпопуляція
- б. псевдопопуляція
- в. ценопопуляція
- г. генетична популяція

108. Сукупність особин одного виду, що походять від спільного предка називається:

- а. геміпопуляція
- б. псевдопопуляція
- в. ценопопуляція
- г. генетична популяція

109. Яка із зазначених характеристик не відноситься до популяцій:

- а. дискретна форма існування
- б. атрибут живої матерії
- в. нездатність до самопідтримки
- г. сукупність особин одного виду

110. Оберіть вірно побудований ієрархічний ряд організованих систем у біосфері:

- а. популяція → вид → біом → біогеоценотичний комплекс
- б. організм → популяція → біом → біоценоз → біосфера
- в. організм → популяція → вид → біоценоз → біом → біосфера
- г. організм → популяція → біом → вид → біогеоценоз

111. Група особин популяції, яка не може розмножуватись на даній території називається:

- а. популяція
- б. елементарна популяція
- в. геміпопуляція
- г. псевдопопуляція

112. Популяція, в якій виразно виявляється відмінність життєвих вимог у різних фазах життєвого циклу, а окремі особини займають різне місце у природі називається:

- а. геміпопуляція
- б. ценопопуляція

- в. елементарна популяція
- г. псевдопопуляція

113. Сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю морфологічних, фізіологічних і біохімічних особливостей називається:

- а. популяцією
- б. видом
- в. екотипом
- г. генетою

114. Окремий рослинний чи тваринний організм, що характеризується індивідуальними морфологічними, фізіологічними й адаптивними властивостями, зберігаючи типові ознаки свого виду, називається:

- а. ранетою
- б. особиною
- в. популяцією
- г. генетою

115. Особини виду, що виникли внаслідок статевого розмноження із зиготи називаються:

- а. популяціями
- б. індивідами
- в. генетами
- г. ранетами

116. Групу особин одного виду, які пристосовані до певних умов середовища і відрізняються деякими морфологічними ознаками називаються:

- а. популяцією
- б. видом
- в. екотипом
- г. ранетами

117. Сукупність особин виду, які населяють невелику ділянку однорідної площі, а їх кількість пропорційна різноманіттю умов середовища, називається:

- а. геміпопуляцією
- б. локальною популяцією
- в. псевдопопуляцією
- г. генетичною популяцією

118. Сукупність елементарних популяцій, внутривидові сукупності організмів, приурочені до конкретних біогеоценозів називається:

- а. геміпопуляцією
- б. географічною популяцією
- в. псевдопопуляцією
- г. генетичною популяцією

119. Кількість особин (або їх біомаса) у перерахунку на одиницю доступної площі або об'єму, які фактично можуть бути зайняті популяцією, називається:

- а. оптимальна щільність
- б. екологічна щільність
- в. максимальна щільність
- г. мінімальна щільність

120. Популяції, у яких відсутні особини початкових онтогенетичних стадій називаються:
- інвазійними
 - регресивними
 - прогресивними
 - псевдопопуляціями
121. Загальна кількість особин на даній території або в даному об'ємі, які належать до однієї популяції називається:
- чисельністю
 - щільністю
 - віталітетом
 - біотичним потенціалом
122. Біотичний потенціал популяції відображає:
- експоненціальна крива
 - логістична крива
 - s-подібна крива
 - синусоїда
123. Ріст популяції в умовах обмежених, але поповнюваних, ресурсів відображає:
- експоненціальна крива
 - логістична крива
 - j-подібна крива
 - синусоїда
124. Зростання у формі геометричної прогресії це:
- показниковий тип росту чисельності
 - нестабільний тип росту чисельності
 - циклічний тип росту чисельності
 - стабільний тип росту чисельності
125. Динаміка чисельності популяції, яка регулярно повторюється описується:
- показниковим типом
 - логістичним типом
 - циклічним типом
 - стабільним типом
126. Запис $M = N_0 \cdot R^t$ (M - кількість особин популяції; N_0 - початкова щільність популяції; R - величина на яку кожна щільність N може вирости за одиницю часу) справедливий за умови росту чисельності за:
- логістичним типом
 - експоненціальним типом
 - стабільним типом
 - циклічним типом
127. Поліциклічними називаються популяції, які:
- складаються з особин одного віку
 - складаються з особин різних вікових станів і поколінь
 - характеризуються різко переважаючою кількістю особин постгенеративного віку
 - характеризуються різко переважаючою кількістю особин генеративного віку
128. Співвідношення статей у популяції 1:1 називається:

- а. сім'єю
- б. прайдом
- в. колонією
- г. зграєю

129. Співвідношення статей у популяції "1:декілька" називають:

- а. сім'єю
- б. зграєю
- в. прайдом
- г. колонією

130. Як називають розподіл особин ценопопуляції за віковим станом:

- а. вікова група
- б. віковий період
- в. покоління
- г. віковий спектр

131. Група особин в межах однієї популяції, які народилися в один момент часу і проіснували впродовж певного періоду до загибелі останнього індивіда називається:

- а. поколінням
- б. віковим станом
- в. когортою
- г. віковим періодом

132. Вплив зовнішніх факторів на статеву структуру популяцій характеризує:

- а. первинне розщеплення
- б. вторинне розщеплення
- в. третинне розщеплення
- г. зовнішні фактори на визначення статевої структури не впливають

133. Існування в межах одного виду живих організмів двох або більше груп особин з різко відмінними ознаками, називається:

- а. віталітетною структурою
- б. поліморфізмом
- в. природним добором
- г. життєвою стратегією

134. Принцип, згідно якому види (популяції) з однаковою системою потреб не можуть заселяти одну екологічну нішу належить:

- а. Г.Ф. Гаузе
- б. А. Лотці і В. Вольтеру
- в. П.С. Погребняку
- г. Р. Чепмену

135. Умовний показник, що відображає здатність популяції до розмноження, виживання та розвитку при оптимальних екологічних умовах, тобто до збільшення чисельності при відсутності лімітуючих факторів, називається:

- а. біотичним потенціалом
- б. екологічною нішею
- в. життєвою стратегією
- г. життєвим спектром

136. Співвідношення статей у популяції при народженні особин називають:
- а. первинним
 - б. вторинним
 - в. третинним
 - г. дефінітивним
137. Популяція, яка з'являється на певній незаселеній території за умови виникнення тут сприятливих умов середовища називаються:
- а. інвазійними
 - б. періодичними
 - в. прогресивними
 - г. псевдопопуляціями
138. Період первинного спокою особин у популяціях називається:
- а. латентним
 - б. генеративним
 - в. сенильним
 - г. пострепродуктивним
139. Сукупність оптимальних умов за яких популяція є максимально життєздатною і може безперешкодно себе відтворювати називається:
- а. фундаментальною екологічною нішею
 - б. реалізованою екологічною нішею
 - в. фактичною екологічною нішею
 - г. постконкурентною екологічною нішею.
140. Популяційна структура, яка формується внаслідок розмірної диференціації особин і відображає різні умови реалізації ростових і продукційних процесів називається:
- а. просторовою
 - б. віталітетною
 - в. генетичною
 - г. екологічною
141. Народжуваність всередині популяції, яка обмежується виключно фізіологічними особливостями особин називається:
- а. реальною
 - б. екологічною
 - в. максимальною
 - г. мінімальною
142. Відношення кількості особин, які народилися впродовж визначеного періоду часу до загальної кількості особин у популяції називається:
- а. реальною народжуваністю
 - б. питомою народжуваністю
 - в. абсолютною народжуваністю
 - г. екологічною народжуваністю
143. Модель П.Ф. Ферхюльста використовується для опису:
- а. експоненціального типу росту чисельності популяцій
 - б. логістичного типу росту чисельності популяцій

- в. стабільного типу росту чисельності популяцій
- г. циклічного типу росту чисельності популяцій

144. Види, які характеризуються максимальною плідністю, слабкою конкурентною спроможністю й сукупністю інших пристосувань до змінного середовища називаються:

- а. r-стратегіями
- б. S-стратегіями
- в. K-стратегія
- г. L-стратегія

145. Види, які характеризуються здатністю до перенесення екстремальних умов середовища, тобто є витривалими, називаються:

- а. r-стратегіями
- б. S-стратегіями
- в. K-стратегія
- г. L-стратегія

146. Головною еволюційною одиницею є:

- а. особина
- б. популяція
- в. вид
- г. екосистема

147. Математична модель Лотки-Вольтерра описує:

- а. взаємодію у системі "хижак-жертва"
- б. конкурентні взаємодії між особинами всередині популяції
- в. динаміку чисельності популяцій без врахування лімітуючих чинників
- г. проектування екологічної ніші популяцій

148. Концепція мінімальної життєздатної популяції (МЖП) описує особливості:

- а. виживання популяцій в екстремальних природних умовах
- б. керування і експлуатацію популяцій
- в. динаміку чисельності популяцій за дії антропогенних чинників
- г. закономірності визначення життєвої стратегії популяцій

149. Стратегія розвитку, при якій відбір напрямлений на імовірність виживання окремих особин називається:

- а. r-стратегія
- б. S-стратегія
- в. K-стратегія
- г. L-стратегія

150. Який з перерахованих типів зв'язків не реалізується в екологічній системі рівня демоцен:

- а. внутріпопуляційна коакція
- б. міжпопуляційна коакція
- в. акція
- г. реакція

151. Види, які живуть у критичних екстремальних умовах і таким чином уникають конкуренції називаються:

- а. віолентами
- б. інфлуентами

- в. експлерентами
- г. пацієнтами

152. Еволюційний процес, що відбувається в межах виду називається:

- а. коеволуцією
- б. макроеволуцією
- в. мегаеволуцією
- г. мікроеволуцією

153. Аменсалізм належать до:

- а. антропогенних факторів
- б. біотичних факторів
- в. непрямих факторів
- г. антропічних факторів

154. Коменсалізм належать до:

- а. антропічних факторів
- б. прямих факторів
- в. абіотичних факторів
- г. біотичних факторів

155. Мутуалізм належать до:

- а. антропогенних факторів
- б. абіотичних факторів
- в. антропічних факторів
- г. біотичних факторів

156. Фактори, зумовлені діяльністю людини називаються:

- а. синергетичними
- б. антропогенними
- в. абіотичними
- г. антагоністичними

157. Неконтрольований збір рослин належать до:

- а. антропогенних факторів
- б. абіотичних факторів
- в. біогенних факторів
- г. біотичних факторів

158. Сукупність близькоспоріднених організмів, що характеризуються певними, тільки їм властивими морфо-фізіологічними та еколого-географічними особливостями – це:

- а. підвид
- б. вид
- в. клас
- г. тип

159. Критерії виду, вірно все, крім:

- а. географічний
- б. екологічний
- в. поведінковий
- г. еволюційний

160. Основний критерій виду полягає в його єдності:

- а. генетичній
- б. фізіологічній
- в. екологічній
- г. філогенетичній

161. Біологічні види зберігають індивідуальність завдяки механізму:

- а. географічної ізоляції
- б. репродуктивної ізоляції
- в. екологічної ізоляції
- г. поведінкової ізоляції

162. Сукупність особин, які подібні між собою за будовою, функціями, каріотипом, екологічними потребами, мають спільне походження, населяють певну територію (ареал), у природних умовах схрещуються виключно між собою і дають плодюче потомство – це:

- а. популяція
- б. підвид
- в. вид
- г. клас

163. Фактором, який об'єднує організми у види, є:

- а. статевий процес
- б. поведінка
- в. екологічна ніша
- г. еволюційний шлях

164. Елементарною структурною одиницею виду є:

- а. особина
- б. прайд
- в. зграя
- г. популяція

165. Еволюційний процес, який відбувається всередині виду, веде до його диференціації і може завершитися утворенням нового виду називається:

- а. макроеволюцією
- б. мікроеволюцією
- в. мегаеволюцією
- г. субеволюцією

166. Ізоляція – елементарний еволюційний фактор, який:

- а. розділяє популяції
- б. підсилює генетичні відмінності між популяціями
- в. сприяє дивергенції популяцій
- г. усі вище наведені відповіді вірні

167. Що таке зоологія?

- а. наука, яка вивчає рослини, гриби та водорості
- б. наука, яка вивчає взаємодії живих організмів і їх вплив на навколишнє середовище
- в. наука, яка вивчає будову і життєдіяльність тварин, їх історичний та індивідуальний розвиток, класифікацію

г. наука про будову, функції й розвиток клітин тварин і рослин, а також одноклітинних організмів і бактерій

168. Об'єктом вивчення зоології є:

- а. тварини
- б. рослини
- в. окремі тварини та тваринний світ у цілому
- г. тваринний світ

169. Підберіть правильні слова: ... (1) – одна із форм існування живої матерії на Землі. Вона є цілісною біологічною системою, здатною до росту, розмноження і саморегулювання. Ці організми - ... (2), які здатні використовувати лише готові органічні сполуки і не можуть синтезувати їх з органічної речовини. Більшості властива підвищена активність, здатність до пересування в просторі:

- а. 1. бактерії; 2. міксотрофи
- б. 1. тварини; 2. хижаки
- в. 1. рослини; 2. гетеротрофи
- г. 1. тварини; 2. гетеротрофи

170. Зоогеографія – це:

- а. наука, що досліджує поширення тварин по Землі і виявляє історичні закономірності формування фауни в різних районах
- б. наука, що вивчає історичні закономірності формування фауни в різних районах
- в. наука, що досліджує поширення тварин по Землі
- г. наука, що досліджує поширення тварин по Землі, загальнобіологічні основи, виявляє історичні закономірності формування фауни в різних районах

171. Палеозоологія – наука яка вивчає:

- а. закономірні поведінки тварин
- б. екологію популяцій і є тісно пов'язана з філогенією
- в. тваринний світ минулих часів
- г. антропогенний вплив людини на тваринний світ

172. Що вивчає етологія?

- а. будову тваринного організму
- б. поведінку тварин
- в. паразитів тварин
- г. поширення одноклітинних

173. Вкажіть які групи тварин вивчає кожна з цих наук: 1. Теріологія, 2. Орнітологія, 3. Герпетологія

- а. 1. птахів; 2. ссавців; 3. плазунів
- б. 1 ссавців; 2. птахів; 3. плазунів
- в. 1. ссавців; 2. плазунів; 3. птахів
- г. 1. плазунів; 2. земноводних; 3. плазунів

174. Що вивчає 1. іхтіологія, 2. ентомологія, 3. гельмінтологія?

- а. 1. риб; 2. комах; 3. паразитичних червів
- б. 1. комах; 2. риб; 3. паразитичних червів
- в. 1. риб; 2. паразитичних червів; 3. патогенних червів
- г. 1. патогенних червів; 2. паразитичних червів; 3. риб

175. Яка наука виникла в 60-х роках і вивчає принципи будови і функціонування живих систем з метою створення машин, приладів та інших механізмів?
- а. екологія тварин
 - б. екологія популяцій
 - в. екологія біоценозів
 - г. біоніка
176. Що таке екологія тварин?
- а. наука про закономірності взаємозв'язку тварин і їх системних угруповань із навколишнім середовищем
 - б. наука, що вивчає поведінку тварин при несприятливих умовах
 - в. наука, що вивчає поведінку тварин в цілому
 - г. система наук, які ще не повністю досліджені вченими, отже чіткого пояснення немає
177. Демекологія – це:
- а. наука, яка вивчає деградовані види
 - б. складова екології тварин і вивчає екологію популяцій
 - в. наука, яка вивчає ареали видів
 - г. наука, яка вивчає різноманітність видів
178. Коли і хто ввів термін "екологія" ?
- а. Луї Пастер в 1866р.
 - б. Клод Бернар в 1865р.
 - в. Ернест Геккель в 1866р.
 - г. Роберт Кох в 1865р.
179. Який метод є найдавніший?
- а. експериментальний
 - б. порівняльний
 - в. історичний
 - г. описовий
180. Що таке "моніторинг"?
- а. система довготривалих спостережень за тваринним світом
 - б. експериментальні дослідження над тваринами для збагачення виду
 - в. організація, де збирається велика кількість науковців для вирішення масштабних питань
 - г. порівняльна характеристика всіх системних одиниць
181. Пізнання методів і явищ шляхом їх порівняння, встановлення подібності та відмінності. Про що іде мова?
- а. описовий метод
 - б. порівняльний метод
 - в. експериментальний метод
 - г. моніторинг
182. Хто зробив великі вкладення в історичний метод, тим самим збільшивши його популярність?
- а. Роберт Кох
 - б. Гіпократ
 - в. Чарльз Дарвін
 - г. Ернест Геккель
183. Експериментальний метод - це :

- а. метод, при якому дослідник не втручається в досліджувані явища
- б. метод, при якому дослідник порівнює різні організми
- в. метод, при якому дослідник втручається в хід процесів чи явищ, вносить певні зміни
- г. такий метод є сумішшю усіх попередніх методів

184. Що вивчає морфологія?

- а. зовнішню і внутрішню будову тваринного організму
- б. взаємовідносини між тваринами, їхній вплив на навколишнє середовище
- в. походження тварин
- г. поведінку тварин

185. Який внесок зробив Геккель у вивчення анатомії?

- а. написав книгу "Морфологічні закономірності еволюції"
- б. ввів термін "анатомія"
- в. написав трактат про частини тварин
- г. створив біогенетичний закон

186. Розділ біології, покликаний створити єдину струнку систему живого світу на основі виділення системи біологічних таксонів і відповідних назв, вибудованих за певними правилами (номенклатура) – це:

- а. екологія
- б. фізіологія
- в. анатомія
- г. систематика

187. Клітинний рот:

- а. Перистом
- б. Цитостом
- в. Фагоцитом
- г. Пароцитом

188. Як називається злиття двох статевих клітин (гамет)?

- а. Кон'югація
- б. Шизогонія
- в. Копуляція
- г. Апарація

189. Як називається чергування статевого та нестатевих способів розмноження?

- а. Онтогенез
- б. Метагенез
- в. Ендодіогенія
- г. Гіпогенез

190. Найпростіші, які живляться органічними рештками:

- а. Сапрофаги
- б. Хроматофори
- в. Гідробіонти
- г. Фітофаги

191. Органи руху інфузорій:

- а. Війки
- б. Джгутики

- в. Не мають органів руху
 - г. Псевдоподії
192. Основною функцією скоротливої вакуолі є:
- а. Синтез
 - б. Перетравлення їжі
 - в. Осморегуляція
 - г. Рух
193. Псевдоподії це:
- а. Несправжні ніжки за допомогою яких тварина рухається та захоплює їжу
 - б. Занурена в цитоплазму частина джгутика
 - в. Видозмінена частина мітохондрії
 - г. Місце виведення неперетравлених решток
194. Назвіть середовище існування радіолярії:
- а. Солоні водойми
 - б. Прісні водойми
 - в. Грунт
 - г. Болото
195. Які способи життя властиві найпростішим?
- а. Вільноживучі
 - б. Паразити
 - в. Вільноживучі і паразити
 - г. Водні
196. У одноклітинних відомі такі органи руху:
- а. Джгутики, ніжки, війки
 - б. Війки, псевдоподії, джгутики
 - в. Не мають органів руху
 - г. Війки, ніжки
197. Неперетравлені рештки їжі у амеби виділяються через:
- а. Ротовий отвір
 - б. Поверхню тіла
 - в. Анальний отвір
 - г. Порошицю
198. Яким чином можна заразитися дизентерійною амебою?
- а. З водою
 - б. Зіпсованими фруктами
 - в. Від іншої людини
 - г. Від тварин
199. Як проходить площина поділу у Евглени?
- а. Впоперек
 - б. Вздовж
 - в. Вперед
 - г. Радіально
200. Яка кількість скоротливих вакуоль у тувельки?

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

201. Основні способи живлення найпростіших:

- а. Автотрофне і гетеротрофне
- б. Гетеротрофне, автотрофне і мікотрофне
- в. Гетеротрофне
- г. Міксотрофне

202. Як проходить площина поділу у інфузорії туфельки?

- а. Впоперек
- б. Вздовж
- в. Вперед
- г. Радіально

203. Органи травлення найпростіших:

- а. Шлунок
- б. Скоротливі вакуолі
- в. Травні вакуолі
- г. Тонка кишка

204. В якому середовищі мешкає евглена зелена?

- а. У морському
- б. У ґрунті
- в. У прісноводному
- г. У болоті

205. Інфузорія-туфелька мешкає в середовищі:

- а. Морському
- б. Ґрунті
- в. Прісноводному
- г. Болоті

206. Як називається парне з'єднання грегарин?

- а. Сизигій
- б. Копуляція
- в. Кон'югація
- г. Поліподій

207. На межі між тонкою і товстою кишкою є

- а. перетинка
- б. воло
- в. сліпа кишка
- г. інший варіант

208. Протоки печінки і підшлункової залози відкриваються у...

- а. шлунок
- б. сліпу кишку
- в. товсту кишку
- г. тонку (дванадцятипалу) кишку

209. Неперетравлені рештки у земноводних виводяться з організму через ...
- а. клоаку
 - б. порошницю
 - в. анальний отвір
 - г. рот
210. Органи виділення земноводних представлені ...
- а. тулубними нирками
 - б. метанефросом
 - в. мета нефридіями
 - г. коксальними залозами
211. Серце у більшості Плазунів...
- а. двокамерне
 - б. трикамерне
 - в. чотирикамерне
 - г. однокамерне
212. Розмноження рослин листками та живцями – це приклади:
- а. вегетативного розмноження
 - б. селекції;
 - в. статевого розмноження
 - г. партеногенетичного розмноження
213. Сітчасте жилкування листя характерне для рослин:
- а. класу Дводольних
 - б. класу Однодольних
 - в. класу Хвойних
 - г. не є діагностичною ознакою у систематиці рослин
214. Характерною ознакою дводольних рослин є:
- а. мичкувата коренева система
 - б. зародок с двома сім'ядолями
 - в. двочленна квітка
 - г. дугове жилкування листків
215. Рослини родини Злакових належать до:
- а. класу Дводольних
 - б. класу Однодольних
 - в. класу Хвойних
 - г. класу Папоротевидних
216. Основною ознакою зелених рослин є:
- а. здатність до статевого розмноження
 - б. наявність квітки
 - в. здатність до фотосинтезу
 - г. ріст
217. Процес фотосинтезу – це:
- а. процес утворення органічних речовин з неорганічних, що відбувається завдяки сонячному світлу

- б. процес утворення соматичних клітин
 - в. процес молочнокислого бродіння
 - г. процес розщеплення складних органічних речовин до їх мономерів
218. У рослинній клітині хлорофіл знаходиться у:
- а. хлоропластах
 - б. вакуолях
 - в. лейкопластах
 - г. ядрі
219. Основна ознака покритонасінних рослин, яка забезпечила їх панування у сучасній флорі, це:
- а. наявність фотосинтезу
 - б. наявність коренів
 - в. наявність квітки
 - г. пришвидшений метаболізм
220. Нижчі рослини відрізняються від вищих наступною головною ознакою:
- а. наявністю хлоропластів
 - б. тим, що їх тіло не поділене на корінь, стебло і листя
 - в. нездатністю до статевого розмноження
 - г. мовами існування
221. Папоротеподібні належать до:
- а. нижчих рослин
 - б. вищих насінневих рослин
 - в. голонасінних рослин
 - г. вищих спорових рослин
222. Як називаються водорості, що плавають у поверхневих шарах водойм?
- а. планктонні
 - б. зоопланктонні
 - в. бентосні
 - г. нектонні
223. Лишайники – це симбіоз двох організмів:
- а. зелених водоростей та бактерій
 - б. синьо-зелених і зелених водоростей та грибів
 - в. вищих водоростей та бактерій
 - г. синьо-зелених водоростей та вищих рослин
224. Мікориза – це взаємовигідне співіснування:
- а. міцелію грибів з коренями вищих рослин
 - б. міцелію нижчих грибів з зеленими водоростями
 - в. бульбочкових бактерій з коренями бобових рослин
 - г. синьо-зелених і зелених водоростей та грибів
225. Яку фізіологічну функцію виконують у листках рослин продихи?
- а. захист від пошкодження
 - б. накопичення поживних речовин
 - в. газообмін та транспірація
 - г. захист від впливу токсикантів

226. За яку з перерахованих нижче функцій відповідає такий структурний компонент листка, як флоема?

- а. надходження повітря з атмосфери в листок
- б. транспорт води зі стебла в листок
- в. транспорт поживних речовин з листка в інші частини рослини
- г. захист листка і сповільнення процесу втрати води

227. Продихи на листках розміщені на:

- а. завжди на верхній поверхні
- б. завжди на нижній поверхні
- в. лише на нижній або верхній поверхні
- г. як на нижній, так і на верхній поверхні залежно від виду рослини

228. Стебло рослин - це...:

- а. основа рослини, яка складається із стеблової частини, бруньок і листків
- б. частина рослин, яка повністю розміщена над ґрунтом
- в. осьова частина пагона
- г. частина кореневища

229. Головним пагоном називають :

- а. стовбур дерева і скелетну гілку куща
- б. пагін, який розвивається з верхівкової бруньки
- в. пагін, який розвивається з бічної бруньки
- г. перший видовжений пагін рослини

230. Пагін - це...:

- а. стебло з листками і бруньками, утворене однією твірною тканиною
- б. гілку дерева або надземну частину трав'янистої рослини
- в. видовжені стебла з листям, утворені рослиною для вегетативного розмноження
- г. підземні органи розмноження і захоплення життєвого простору рослин

231. Продихи рослин :

- а. перешкоджають випаровуванню води
- б. регулюють газообмін і транспірацію
- в. перешкоджають втраті рослиною кисню
- г. активно постачають рослині вуглекислий газ

232. Транспірацією у рослин називають :

- а. поглинання води
- б. випаровування води
- в. поглинання кисню
- г. газообмін

233. За формою основи листкові пластинки є :

- а. зубчасті, пильчасті
- б. ланцетні, яйцеподібні
- в. лопатеві, роздільні
- г. серцеподібні, клиноподібні

234. Сидячим називають листок :

- а. без прилистків
 - б. з розвиненою піхвою
 - в. не розчленований на черешок і пластинку
 - г. лускоподібні
235. Оцвітина складається з:
- а. тичинок і маточок
 - б. приквіток і пелюсток
 - в. пелюсток і маточок
 - г. чашечки і віночка
236. Віночок складається з:
- а. пелюсток
 - б. тичинок
 - в. маточок
 - г. приймочок
237. Якими оболонками вкрите пилкове зерно:
- а. септина, інтина
 - б. інтина, пектина
 - в. ензина, інтина
 - г. екзина, інтина
238. Багатодомні рослини - це:
- а. рослини у яких поряд із стерильними квітками зустрічаються й одностатеві
 - б. рослини у яких поряд із двостатевими квітками зустрічаються й одностатеві
 - в. таких рослин не буває
 - г. рослини у яких є безстатеві і статеві квітки
239. Наука яка вивчає пилок називається:
- а. спорологія
 - б. пилкологія
 - в. палінологія
 - г. ентомологія
240. Рослини, які зростають на ґрунтах, багатих Нітрогеном, називають:
- а. нітрофілами
 - б. азотфіксаторами
 - в. оліготрофами
 - г. нітрофобами
241. Місцем проживання рослин-галофітів слугує:
- а. болото
 - б. прибережна, затоплювана при розливі, зона водойми
 - в. прісноводна водойма з текучкою водою
 - г. сухий степ з засоленими ґрунтами
242. Закономірно повторювані підйоми і спади чисельності природних популяцій, називаються:
- а. хвилями життя
 - б. спалахами чисельності
 - в. парцелами
 - г. сукцесіями

243. Інтродукцією називають:

- а. механічний вплив тварин на елементи екосистем
- б. впровадження нового виду в екосистему
- в. зміна екосистем під впливом ксенобіотиків
- г. стан підвищеної чутливості компонентів екосистеми при впливі людини

244. Явище закономірного розподілу організмів (переважно рослин) в залежності від освітленості називають:

- а. ксерофітністю
- б. галофітністю
- в. гідрофітністю
- г. ярусністю

245. Екологічну групу рослин, що ростуть на засолених ґрунтах називають:

- а. псамофіти
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. гігрофіти

246. Регенерація – це:

- а. статеве розмноження
- б. безстатеве розмноження
- в. відновлення втрачених частин тіла
- г. пристосування організму до сукупності факторів середовища

247. Ознака, яка проявляється як в гомозиготному, так і в гетерозиготному стану у гібридів першого покоління, називається:

- а. рецесивною
- б. домінантною
- в. алельною
- г. успадкованою

248. Яку функцію виконують у клітині рибосоми:

- а. дихання
- б. синтез білка
- в. фотосинтез
- г. катаболізм

249. Який набір хромосом має статеві клітини або гамети:

- а. триплоїдний;
- б. гаплоїдний;
- в. диплоїдний.
- г. поліплоїдний

250. Індивідуальний розвиток організму називається:

- а. філогенез
- б. онтогенез
- в. генотип
- г. овогенез

251. Мітохондрії – це органели клітини, у яких здійснюється процес:

- а. дихання
 - б. фотосинтезу
 - в. відкладання поживних речовин
 - г. синтез білка
252. Статеві клітини утворюються завдяки:
- а. мітозу
 - б. спороутворенню
 - в. мейозу
 - г. амітозу
253. Авторами клітинної теорії вважають:
- а. Ч. Дарвіна та Г. Менделя
 - б. М. Шлейдена та Т. Шванна
 - в. К. Маркса і Ф. Енгельса
 - г. Е. Геккеля та В.І. Вернадського
254. У якому випадку вірно перелічені фази мітозу у порядку їх проходження?
- а. профаза, метафаза, анафаза, телофаза
 - б. інтерфаза, телофаза, метафаза
 - в. анафаза, профаза, телофаза, метафаза
 - г. метафаза, анафаза, інтерфаза
255. Втрата білковою молекулою своєї структури називається:
- а. реплікація
 - б. денатурація
 - в. гібридизація
 - г. репарація
256. Неклітинні форми життя це:
- а. віруси, віроїди, пріони
 - б. бактерії, дріжджі, ціанобактерії
 - в. архібактерії, найпростіші
 - г. пластиди й мітохондрії
257. Обмін між окремими ділянками гомологічних хромосом, який відбувається у мейозі, називається:
- а. кросинговером
 - б. схрещуванням
 - в. мутацією
 - г. транслокацією
258. Речовина, яка зупиняє ферментативну реакцію, називається:
- а. продуктом
 - б. субстратом
 - в. інгібітором
 - г. активатором
259. Спадковий матеріал у вірусів представлений:
- а. білками
 - б. ліпідами

- в. вуглеводами
 - г. нуклеїновими кислотами
260. Яка з властивостей є найважливішою і суттєво відрізняє живе від неживого?
- а. дискретність і цілісність
 - б. розмноження
 - в. ріст
 - г. обмін речовин
261. До структурних рівнів організації життя не відноситься:
- а. клітинний
 - б. тканинний
 - в. організмівий
 - г. популяційно-видовий
262. Елементарними явищами клітинного рівня організації життя є:
- а. життєвий цикл клітини
 - б. фізіологічні процеси, що забезпечують життєдіяльність
 - в. мікроеволюція (видоутворення)
 - г. динамічний взаємозв'язок біогеоценозів у масштабах біосфери
263. Екологічними проблемами молекулярно-генетичного рівня організації життя є:
- а. збільшення частки мутацій у генофондах
 - б. зниження адаптаційних можливостей
 - в. погіршення екологічних показників популяцій
 - г. збільшення кількості антропоценозів
264. Екологічними проблемами організмівого рівня організації життя є:
- а. збільшення частки мутацій у генофондах
 - б. зниження адаптаційних можливостей
 - в. погіршення екологічних показників популяцій
 - г. збільшення кількості антропоценозів
265. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах миші увели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
- а. клітинний центр
 - б. комплекс Гольджі
 - в. лізосоми
 - г. рибосоми
266. Ядерно-цитоплазматичним співвідношенням зветься:
- а. співвідношення об'ємів і мембранних органел клітини
 - б. співвідношення об'ємів ядра і вакуолярної системи клітини
 - в. співвідношення об'ємів ядра і цитоплазми
 - г. співвідношення об'ємів ядра і двомембранних органел клітини
267. З якою з органел клітини безпосередньо з'єднана ядерна оболонка?
- а. з плазматичною мембраною
 - б. з мембраною вакуолей
 - в. з системою трубочок і міхурців комплексу Гольджі
 - г. з канальцями ендоплазматичної сітки

268. В яких органелах забезпечується цитоплазматична спадковість?
- а. у рибосомах
 - б. в ендоплазматичній сітці
 - в. у комплексі Гольджі
 - г. у мітохондріях
269. В ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?
- а. ядерця
 - б. нуклеосоми
 - в. полісоми
 - г. мікрофібрили
270. З чого побудована нуклеосома?
- а. з РНК
 - б. з ліпідів
 - в. з полісахаридів
 - г. з молекул білків гістонів
271. Ядра клітин обробили препаратом, який зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зазнають змін?
- а. мітохондрії
 - б. ядерна оболонка
 - в. рибосоми
 - г. хромосоми
272. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірних хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?
- а. інтерфаза
 - б. телофаза
 - в. анафаза
 - г. профаза
273. На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?
- а. анафаза
 - б. профаза
 - в. метафаза
 - г. інтерфаза
274. Як називається період життєвого циклу клітини, на якому відбувається синтез ДНК?
- а. пресинтетичний період інтерфази
 - б. синтетичний період інтерфази
 - в. премітотичний період інтерфази
 - г. мітоз
275. Яка з тканин дорослої людини має найвищу здатність до регенерації?
- а. епітеліальна
 - б. м'язова
 - в. пухка волокниста власне сполучна
 - г. нервова

276. Які особливості будови притаманні одношаровому епітелію шлунка за нормальних умов?
- а. не всі клітини зв'язані з базальною мембраною
 - б. всі клітини зв'язані з базальною мембраною
 - в. всі клітини не зв'язані з базальною мембраною
 - г. частково зроговілий
277. Які структурно-функціональні ознаки характерні для ендокринних залоз?
- а. наявність вивідної протоки
 - б. секреторні продукти надходять у кров
 - в. секреторні продукти надходять на поверхню епітелію шкіри
 - г. секреторні продукти надходять на поверхню епітелію слизової оболонки
278. Поняття "екологія" вперше введено у науку:
- а. Е. Геккелем
 - б. В.І. Вернадським
 - в. Ламарком
 - г. Мебіусом
279. Розділ біоекології, який займається вивченням взаємозв'язків окремих особин з оточуючим середовищем називається:
- а. біогеоценологія
 - б. аутокологія
 - в. Біосферологія
 - г. синекологія
280. Розділ біоекології, який вивчає структурно-функціональні характеристики і динаміку біосистем популяційного рівня називається:
- а. аутокологія
 - б. демекологія або популяційна екологія
 - в. біогеоценологія
 - г. біосферологія
281. Комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біосферу загалом називається:
- а. синекологією
 - б. біогеоценологія
 - в. демекологією
 - г. глобальною екологією
282. Поняття "екологічна система" вперше введено у науку:
- а. А. Тенслі
 - б. В.І. Вернадським
 - в. Е. Геккелем
 - г. Мебіусом
283. Розділ екології, який вивчає угруповання організмів різних видів та їхню взаємодію із середовищем існування називається:
- а. біоценологія
 - б. біогеоценологія
 - в. демекологія
 - г. аутокологія
284. До якого розділу екології можна віднести роботи В. Вернадського?

- а. аутокології
 - б. демекології
 - в. синекології
 - г. біосферології
285. Яка основна причина збільшення парникового ефекту і зміни клімату?
- а. збільшення викидів CO₂ в атмосферу
 - б. зменшення біорізноманіття
 - в. танення льодовиків
 - г. поширення генетично модифікованих продуктів
286. Який методологічний підхід характерний саме для екології?
- а. проведення експерименту
 - б. системність та ієрархічність
 - в. дедукція
 - г. індукція
287. Який розділ екології вивчає взаємодію окремих особин із середовищем існування:
- а. аутокологія
 - б. демекологія
 - в. Синекологія
 - г. біосферологія
288. Які форми охорони природи виділяють на глобальному рівні
- а. заповідні урочища
 - б. національні парки
 - в. природні заповідники
 - г. резервати біосфери
289. Яка різниця між екосистемами та біогеоценозами:
- а. різниці немає
 - б. екосистема складається з біогеоценозів
 - в. біогеоценози складаються з екосистем
 - г. біогеоценоз – це екосистема в межах фітоценозу
290. Які з рівнів організації живого найчастіше вивчає екологія?
- а. клітинний
 - б. молекулярний
 - в. популяційний
 - г. тканинний
291. Індекс відновлення це:
- а. відношення генеративних до дорослих особин
 - б. відношення генеративних та старіючих особин
 - в. відношення прегенеративних до генеративних особин
 - г. відношення прегенеративних до дорослих особин
292. Життєздатність – це:
- а. нема правильної відповіді
 - б. обидві відповіді правильні
 - в. це сукупність властивостей, ознак і зв'язків, що забезпечують притаманну популяції здатність підтримувати рівень системної організації, необхідний для відновлення,

розселення та еволюції

г. реалізація потенцій популяції в конкретних умовах біотопу

293. Популяція, яка складається виключно з молодих прегенеративних особин називається:

- а. нема правильної відповіді
- б. інвазійною повночленною
- в. регресивною повночленною
- г. нормальною повночленною

294. Синергетика – це:

- а. наука про регуляцію екологічних систем
- б. наука про самозародження життя
- в. наука про самоорганізуючі та саморегулюючі системи
- г. немає правильної відповіді

295. Спостереження за визначеними об'єктами природоохоронних зон для оцінювання і прогнозування змін стану екосистем називаються:

- а. фоновим моніторингом
- б. точковим моніторингом
- в. регіональним моніторингом
- г. імпактним моніторингом

296. Система спостережень за планетарними процесами і явищами називається:

- а. регіональним моніторингом
- б. локальним моніторингом
- в. глобальним моніторингом
- г. імпактним моніторингом

297. "Порядок денний на XXI століття" прийнято:

- а. на Конференції ООН у червні у Ріо-де-Жанейро
- б. у рамках Стокгольмської конвенції у травні 2004 року
- в. на Рамсарській конференції у 1989 року
- г. на Роттердамському саміті у вересні 1989 року

298. Об'єктом вивчення екології є:

- а. навколишнє середовище
- б. екосистема
- в. угруповання живих організмів
- г. живі організми

299. Методологічною основою аут-, дем-, синекології є метод:

- а. синтезу
- б. моделювання
- в. експерименту
- г. індукції

300. Якому з основних підходів відповідає таке визначення "Популяція – сукупність особин одного виду, які заселяють територію конкретної екосистеми":

- а. ценотипічному
- б. феноценотипічному
- в. генетичному
- г. плеотипічному

301. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов'язані обміном речовин і енергії – це:

- а. біогеоценоз
- б. екосистема
- в. агроценоз
- г. сукцесія

302. Вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей це:

- а. екологічна експертиза
- б. екологічний аудит
- в. екологічна перевірка
- г. екологічний менеджмент

303. Етап розвитку органічного світу, на якому розумна людська діяльність є домінуючим фактором розвитку біосфери називається:

- а. номогенез
- б. ноосфера
- в. техносфера
- г. техногенез

304. Розділ прикладної екології, який займається вивченням обсягів, механізмів і наслідків впливу на довкілля різних галузей і об'єктів антропогенної діяльності називається:

- а. геоекологією
- б. урбоекологією
- в. техноекологією
- г. біоекологією

305. Комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біосферу, в цілому, та кругообіг в ній речовини й енергії називається:

- а. демекологією
- б. глобальною екологією
- в. синекологією
- г. біогеоценологією

306. Яке з нижче зазначених тверджень є законом Баррі Коммонера?

- а. все повинно кудись подітися
- б. природа знає краще
- в. ніщо не дається задарма
- г. усі перелічені

307. Пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник не втручається у перебіг природних процесів і явищ називається:

- а. дедукція
- б. індукція
- в. експеримент
- г. спостереження

308. Методологічною основою функціональної екології є метод:

- а. порівняння
 - б. моделювання
 - в. експерименту
 - г. синтезу
309. В основі класифікації екологічних факторів Ніколсона-Шведтфегера лежить:
- а. специфіка впливу на структурно-функціональні параметри екосистем
 - б. періодичність появи
 - в. генезис
 - г. важливість для забезпечення життєздатності виду
310. Не відповідає терміну "екологічна толерантність" таке визначення:
- а. стійкість живих організмів до дії факторів середовища
 - б. діапазон між екологічним мінімумом і максимумом
 - в. екологічна валентність виду, зумовлена його пристосувальною здатністю
 - г. спосіб життя організму
311. Едафічні фактори середовища існування належать до:
- а. біотичних
 - б. абіотичних
 - в. антропогенних
 - г. біогенних
312. Як співвідносяться між собою екологічні терміни біогеоценоз і екосистема:
- а. біогеоценоз є окремим випадком екосистеми
 - б. біогеоценоз - екосистема в межах конкретного фітоценозу
 - в. екосистема є окремим випадком біогеоценозу
 - г. як синоніми
313. Конкуренція належать до:
- а. біотичних факторів
 - б. абіотичних
 - в. антропогенних
 - г. біогенних
314. Квартиранство належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. біотичних факторів
 - в. абіотичних факторів
 - г. біогенних факторів
315. Промислове виробництво належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. біотичних факторів
 - в. абіотичних факторів
 - г. біогенних факторів
316. Взаємовигідне співжиття двох організмів належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. біотичних факторів
 - в. абіотичних факторів
 - г. антропічних факторів

317. Симбіоз належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. біотичних факторів
 - в. абіотичних факторів
 - г. антропічних факторів
318. Первинним джерелом енергії для переважної більшості біологічних систем є:
- а. температура
 - б. рослини
 - в. немає правильної відповіді
 - г. сонячне світло
319. Комплекс організмів, які розкладають органічні речовини до мінеральних – це:
- а. редуценти
 - б. продуценти
 - в. консументи
 - г. гетеротрофи
320. Закономірні харчові відносини між організмами характеризують:
- а. вікову структуру
 - б. видову структуру
 - в. трофічну структуру
 - г. Немає правильної відповіді
321. Префіксом „стено” позначають:
- а. недостатність дії якогось фактора
 - б. надмірність дії якогось фактора
 - в. немає правильної відповіді
 - г. вузьку екологічну валентність виду
322. Форма взаємовідносин між двома видами тварин, коли один з них користується якимись перевагами за рахунок іншого, не завдаючи йому безпосередньої шкоди - це:
- а. коменсалізм
 - б. паразитизм
 - в. квартиранство
 - г. конкуренція
323. Під поняттям "емерджентність системи" розуміють:
- а. здатність системи підтримувати стабільність
 - б. незалежність системи
 - в. набуття системою нових якостей
 - г. немає правильної відповіді
324. Група особин одного виду або угруповання, наявність, кількість або інтенсивність розвитку яких у тому чи іншому середовищі є показником певних екологічних процесів називаються:
- а. стенобіонтами
 - б. біоіндикаторами
 - в. біотесторами
 - г. еврибіонтами
325. Об'єктом вивчення екології є:

- а. навколишнє середовище
- б. угруповання живих організмів
- в. будь-яка система
- г. екосистема

326. Порогове значення дії фактору, вище або нижче якого організм не може існувати, називається:

- а. зоною екологічної толерантності
- б. екологічна валентність
- в. точкою максимуму
- г. критичною точкою

327. Лімітуючий вплив максимуму довів:

- а. Ю. Одум
- б. Ю. Лібіх
- в. Мебіус
- г. В. Шелфорд

328. Глибоководні живі організми можна віднести до групи:

- а. евритермних еврибатних
- б. евритермних стенобатних
- в. стенотермних стенобатних
- г. немає правильної відповіді

329. Яке із запропонованих визначень не відповідає терміну "екологічна толерантність":

- а. діапазон між екологічним мінімумом і максимумом
- б. стійкість живих організмів до дії факторів середовища
- в. екологічна валентність виду, зумовлена його пристосувальною здатністю
- г. життєва форма, яка визначається систематичним положенням виду

330. Природні об'єкти можна поділяти на різні види, зокрема, на:

- а. диференційовані (води, ліси, надра, надра тощо) і комплексні (лікувальні зони, природно-заповідні території та інші)
- б. власне природні
- в. природно-господарські
- г. усі перелічені

331. Загальні обов'язки громадян в екологічній сфері визначені в:

- а. Конституції України
- б. Конституції України та в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- в. в Земельному кодексі
- г. в поресурсовому законодавстві

332. Перелік видів діяльності і об'єктів, що являють собою підвищену екобезпеку надано в:

- а. Конституції України
- б. Постанові КМУ
- в. ЗУ "Про основи національної безпеки України"
- г. ЗУ "Про охорону НПС"

333. Державні органи, які здійснюють керівництво природокористування поділяються на:

- а. загальної та спеціальної компетенції
 - б. первинні та вторинні
 - в. адміністративні та цивільні
 - г. усі перелічені
334. До державних органів загальної компетенції належать:
- а. Кабінет Міністрів України
 - б. Верховна Рада України
 - в. Президент України
 - г. усі перелічені
335. До державних органів спеціальної компетенції належать:
- а. Кабінет Міністрів України
 - б. Верховна Рада України
 - в. Президент України
 - г. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
336. До органів державної влади спеціальної компетенції належать:
- а. Кабінет Міністрів України
 - б. Верховна Рада України
 - в. Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція)
 - г. Президент України
337. Найсуворішим видом відповідальності за екологічні правопорушення є:
- а. адміністративна
 - б. кримінальна
 - в. цивільно-правова
 - г. немає правильної відповіді
338. За якісними показниками стан довкілля можна представити такими рівнями:
- а. чисте, сприятливе, безпечне
 - б. найвищий, середній, чистий
 - в. небезпечне, безпечне
 - г. всі перераховані вище
339. До ознак безпечного навколишнього природного середовища відноситься:
- а. стабільність здорового навколишнього середовища
 - б. якість природного ресурсу
 - в. лімітування антропогенного навантаження
 - г. велике число зборів за порушення ПЗ
340. Які нормативи екологічної безпеки Ви знаєте:
- а. гранично дозволений викид
 - б. гранично дозволена концентрація
 - в. гранично дозволений рівень радіаційного впливу
 - г. все перераховані вище нормативи
341. Згідно чинного законодавства України найстрогіший заповідний режим для всієї території запроваджений у:
- а. природних заповідниках
 - б. біосферних заповідниках

- в. заказниках
 - г. національних природних парках
342. Перелік рідкісних рослинних угруповань, які підлягають охороні, представлений у
- а. Зеленій книзі України
 - б. Червоній книзі України
 - в. Додатку Бернської конвенції
 - г. Переліку Рамсарської конвенції
343. Біосферний заповідник має статус:
- а. природоохоронної території місцевого значення
 - б. природоохоронної території регіонального значення
 - в. природоохоронної території загальнодержавного значення
 - г. природоохоронної території міжнародного значення
344. Реліктовими називають види:
- а. які є залишками флори чи фауни попередніх геологічних епох
 - б. з незначним за площею ареалом
 - в. з розірваним ареалом
 - г. з ареалом, що займає території кількох материків
345. Вкажіть, який відсоток заповідності на сьогодні притаманний Україні:
- а. близько 10 %
 - б. близько 6 %
 - в. близько 2 %
 - г. близько 3 %
346. Ендемічними називають види:
- а. які є залишками флори чи фауни попередніх геологічних епох
 - б. з незначним за площею ареалом
 - в. з розірваним ареалом
 - г. з ареалом, що займає території кількох материків
347. Рідкісні рослинні угруповання, які підлягають охороні, наведені у
- а. Зеленій книзі України
 - б. Червоній книзі України
 - в. Додатку Рамсарської конвенції
 - г. Переліку Рамсарської конвенції
348. Багаторічні комплексні спостереження за визначеними об'єктами природоохоронних зон для оцінювання і прогнозування змін стану екосистем, віддалених від об'єктів промислової і господарської діяльності називаються:
- а. біосферним моніторингом
 - б. глобальним моніторингом
 - в. фоновим моніторингом
 - г. імпактним моніторингом
349. Система спостережень за планетарними процесами і явищами називається:
- а. регіональним моніторингом
 - б. глобальним моніторингом
 - в. фоновим моніторингом
 - г. імпактним моніторингом

350. Спостереження за територіями, які піддаються антропогенному впливу, що зумовлює небезпечні або критичні наслідки називається:

- а. біосферним моніторингом
- б. глобальним моніторингом
- в. фоновим моніторингом
- г. імпактним моніторингом

351. Вивчення критичних забруднень на локальних територіях проводять на:

- а. локальному рівні моніторингу
- б. регіональному рівні глобального моніторингу
- в. фоновому рівні глобального моніторингу
- г. міжрегіональному рівні фонового моніторингу

352. Спостереження за кліматичними, едафічними, гідрологічними й орографічними умовами середовища належать до програми:

- а. абіотичної складової фонового моніторингу
- б. біотичної складової фонового моніторингу
- в. біогеохімічного моніторингу
- г. геофізичного моніторингу

353. Оптимальні за кількістю параметрів спостереження на пунктах, об'єднаних у єдину інформаційну мережу називаються:

- а. науковим моніторингом
- б. оперативним моніторингом
- в. стандартним моніторингом
- г. фоновим моніторингом

354. Спеціальні високоточні спостереження за всіма складовими довкілля, за складом, кругообігом та міграцією забруднювачів і реакцією екосистем на їх вплив називаються:

- а. науковим моніторингом
- б. оперативним моніторингом
- в. стандартним моніторингом
- г. кризовим моніторингом

355. За ієрархічними рівнями виділяють такі види моніторингу:

- а. глобальний, регіональний, локальний
- б. науковий, оперативний, локальний
- в. стандартний, кризовий, фоновий
- г. глобальний, регіональний, оперативний

356. Інтенсивні спостереження за природними об'єктами, джерелами техногенного впливу, розташованими в районах екологічної напруженості, у зонах аварій та природних явищ із шкідливими екологічними наслідками це:

- а. науковий моніторинг
- б. оперативний моніторинг
- в. стандартний моніторинг
- г. фоновий моніторинг

357. Контроль стану навколишнього природного середовища за допомогою живих організмів це:

- а. науковий моніторинг
- б. біологічний моніторинг

- в. геомоніторинг
- г. фоновий моніторинг

358. Науковий радіоекологічний моніторинг здійснюють:

- а. МОЗ України
- б. Міністерство екології та його управління на місцях
- в. підрозділи НАН України
- г. обласні екоінспекції

359. Система спостережень за біотичною складовою екосистем та її реакцією на антропогенний вплив називається:

- а. біологічним моніторингом
- б. біогеохімічним моніторингом
- в. біогеофізичним моніторингом
- г. біоіндикацією

360. Фонове забруднення – це ...:

- а. перевищення середніх концентрацій забруднювачів у довкіллі у даний момент часу, порівняно з попередніми періодами
- б. перевищення природних концентрацій хімічних елементів і їх сполук у довкіллі внаслідок антропогенної діяльності
- в. рівень забруднення довкілля на об'єктах природно-заповідного фонду
- г. середній природний вміст хімічних елементів чи їх сполук на певній території упродовж тривалого періоду часу

361. Хроматографічний аналіз належить до групи:

- а. хіміко-аналітичних методів
- б. фізико-хімічних методів
- в. інструментальних методів
- г. біологічних методів

362. Потенціометрію можна віднести до:

- а. методів електрохімічного аналізу
- б. методів радіометричного аналізу
- в. хімічних методів кількісного аналізу
- г. біохімічних методів аналізу

363. Який із нижче перелічених показників не може бути визначеним із застосуванням гравіметричного аналізу:

- а. запиленість атмосферного повітря
- б. зависі у водному середовищі
- в. карбонати ґрунту
- г. вміст розчинних солей у воді

364. Метод кількісного хімічного аналізу, який базується на точному вимірюванні маси певної речовини після її виділення з розчину чи суміші називається:

- а. гравіметричним
- б. титрометричним
- в. потенціометричним
- г. хроматографічним

365. Метод кількісного хімічного аналізу, який ґрунтується на вимірюванні об'єму розчину реагенту відомої концентрації, витраченого на взаємодію з аналізованою речовиною називається:

- а. гравіметричним
- б. титрометричним
- в. потенціометричним
- г. хроматографічним

366. Який із нижче перелічених методів не належить до категорії радіометричних:

- а. польова дозиметрія
- б. кулонометрія
- в. рентгеноспектральний аналіз
- г. ізотопне розбавлення

367. Місце на водоймищі або водотоці, де проводять комплекс робіт для одержання даних про якісні і кількісні характеристики води називається:

- а. пунктом спостереження
- б. створом пункту спостереження
- в. вертикаль створу
- г. горизонтом створу

368. Умовний поперечний переріз водоймища або водотоку, де проводиться комплекс робіт для одержання інформації про якість води називається:

- а. пунктом спостереження
- б. створом пункту спостереження
- в. вертикаль створу
- г. горизонтом створу

369. Умовна вертикальна лінія від поверхні води до дна водоймища або водотоку, на якій здійснюють дослідження для отримання інформації про якість води називається:

- а. пунктом спостереження
- б. створом пункту спостереження
- в. вертикаль створу
- г. горизонтом створу

370. Колі-титр є одним з основних критеріїв:

- а. гідрохімічного стану водойм
- б. бактеріологічного стану водойм
- в. гідрофізичного стану водойм
- г. гідрологічного стану водойм

371. Надходження у водойми шкідливих домішок органічного походження спричинює:

- а. хімічне забруднення
- б. біологічне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

372. Фоновим називають створ пункту спостереження, розміщений:

- а. нижче джерела забруднення
- б. на водотоках, які знаходяться у межах природно-заповідних територій
- в. вище джерела забруднення
- г. вище від місця водозабору

373. Надходження у водойми шкідливих домішок неорганічного походження спричинює: хімічне забруднення;

- а. хімічне забруднення
- б. біологічне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

374. Надходження у водойми шкідливих домішок неорганічного та органічного походження спричинює:

- а. хімічне забруднення
- б. біологічне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

375. Води суходолу, які постійно або тимчасово перебувають на земній поверхні у рідкому і твердому станах називаються:

- а. поверхневі
- б. океанічні
- в. зворотні
- г. природні

376. Вода, яка утворюється у процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності називається:

- а. стічна
- б. скидна
- в. зворотна
- г. дренажна

377. Вода, яка відводиться від зрошувальних сільгоспугідь, присадибних ділянок тощо називається:

- а. стічна
- б. скидна
- в. зворотна
- г. дренажна

378. Вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води це:

- а. стічна
- б. скидна
- в. зворотна
- г. дренажна

379. Прилад для відбору проб води з певної глибини для визначення її властивостей називається:

- а. барометр
- б. люксметр
- в. курвіметр
- г. батометр

380. Прості проби води характеризують:

- а. якість води за певним єдиним показником;
- б. якість води в одному водному об'єкті;

- в. якість води у певному пункті відбору;
- г. якість води на певній ділянці водотоку.

381. Хімічне забруднення води це:

- а. наявність у воді забруднюючих речовин у концентраціях, що викликають порушення норм якості води
- б. надходження у водойми шкідливих домішок органічного походження
- в. наявність у воді забруднюючих речовин у концентраціях, що не викликають порушення норм якості води
- г. надзвичайна ситуація техногенного характеру

382. Максимальну кількість спостережень за якістю води проводять у пунктах:

- а. I і II категорій
- б. III категорії
- в. IV категорії
- г. II і III категорії

383. На водних об'єктах, які характеризуються помірним або слабким антропогенним навантаженням розміщують пункти спостереження:

- а. I категорії
- б. II категорії
- в. III категорії
- г. IV категорії

384. На водних об'єктах, розташованих у зоні промислових міст розташовують пункти спостереження:

- а. I категорії
- б. II категорії
- в. III категорії
- г. IV категорії

385. На водотоках і водоймищах, що мають особливо важливе народногосподарське значення розміщують пункти спостережень:

- а. I категорії
- б. II категорії
- в. III категорії
- г. IV категорії

386. На незабруднених водних об'єктах формують пункти спостережень:

- а. I категорії
- б. II категорії
- в. III категорії
- г. IV категорії

387. Плівку на поверхні води, яка перешкоджає газообміну між водою та атмосферою та зменшує вміст у воді кисню, утворюють:

- а. детергенти
- б. органічні суспензії
- в. нафта і нафтопродукти
- г. органічні фосфати

388. Детергенти – це ...

- а. синтетичні миючі засоби, які часто містять фосфор
 - б. органічні забруднювачі
 - в. мікродисперсні механічні забруднювачі
 - г. патогенні мікроорганізми, які спричинюють мікробіологічне забруднення середовища
389. Евтрофікацію водойм спричинює:
- а. забруднення мінеральними речовинами
 - б. інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей через забруднення органікою
 - в. зміна фізичних параметрів водойм
 - г. випадкова і направлена інтродукція
390. Дампінгом називають:
- а. обміління поверхневих вод через відведення води для зрошення сільськогосподарських угідь
 - б. захоронення відходів на дні морів й океанів
 - в. спорудження на водоймах гідротехнічних споруд, наприклад захисних дамб
 - г. мікробіологічне забруднення водойм
391. Температура, прозорість, радіоактивність природних належать до групи:
- а. гідрологічних показників
 - б. гідрохімічних показників
 - в. гідрофізичних показників
 - г. гідробіологічних показників
392. Колір, запах і смак води належать до групи:
- а. бактеріологічних показників
 - б. гідрохімічних показників
 - в. гідрофізичних показників
 - г. органолептичних показників
393. Зміну прозорості та радіоактивності вод зумовлює:
- а. хімічне забруднення;
 - б. фізичне забруднення;
 - в. біологічне забруднення;
 - г. біотехногенне забруднення
394. Збагачення водних об'єктів біогенними елементами, що супроводжується підвищенням продуктивності водойми це:
- а. евтрофікація
 - б. нітрифікація
 - в. фізичне забруднення
 - г. біотехногенне забруднення
395. Головною ознакою, яка відрізняє ґрунти від гірських порід є:
- а. біотичне походження
 - б. родючість
 - в. буферність
 - г. гранулометричний склад
396. Радіоактивні елементи та ізотопи земної кори належать до:
- а. природних джерел опромінення
 - б. штучних джерел опромінення

- в. комбінованих джерел
- г. антропогенних джерел

397. Перевищення природного рівня вмісту радіонуклідів у навколишньому середовищі спричинює:

- а. радіаційне забруднення
- б. електромагнітне забруднення
- в. інгредієнтне забруднення
- г. радіоактивне забруднення

398. Форма фізичного забруднення, викликана дією іонізуючого випромінювання, називається:

- а. радіаційне забруднення
- б. електромагнітне забруднення
- в. інгредієнтне забруднення
- г. радіоактивне забруднення

399. Для нормування впливу підприємств на водойми використовують показник:

- а. еквітокс
- б. ГДВ
- в. ГДС
- г. ГДЕН

400. Пункти спостереження за станом поверхневих вод поділяються на:

- а. п'ять категорій
- б. шість категорій
- в. три категорії
- г. чотири категорії

401. На водотоках при наявності організованого скиду зворотних вод встановлюють:

- а. не більше двох
- б. 1 створ пункту спостереження
- в. два і більше
- г. жодного

402. Надзвичайно небезпечні забруднюючі речовини належать до класу:

- а. 1
- б. 3
- в. 5
- г. немає правильної відповіді

403. Помірно небезпечні забруднюючі речовини належать до класу:

- а. 1
- б. 3
- в. 5
- г. 4

404. Малонебезпечні забруднюючі речовини належать до класу: } 1 3 немає правильної відповіді
=4 } 405. Виникнення кислотних опадів зумовлене потраплянням в атмосферне повітря:

- а. вуглекислого газу
- б. парів органічних кислот
- в. вуглекислого газу і метану
- г. оксидів сульфуру і нітрогену

405. Групу парникових газів утворюють:
- а. вуглекислий газ, метан й галовуглеводи
 - б. інертні гази атмосфери
 - в. оксид сульфуру (IV) і сірководень
 - г. немає правильної відповіді
406. Видування й перевідкладення пилюватих чи дрібно піщаних часток ґрунту називається:
- а. дефляцією
 - б. ксерофітизацією
 - в. немає правильної відповіді
 - г. ерозією
407. Речовини, які спричинюють зміну числа і структури хромосом, називаються:
- а. мутагенами
 - б. канцерогенами
 - в. дефоліантами
 - г. біологічно активними речовинами
408. Речовини, які спричинюють вади індивідуального розвитку - це:
- а. тератогени
 - б. ксенобіотики
 - в. канцерогени
 - г. дефоліанти
409. Хімічні речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень це:
- а. тератогени
 - б. ксенобіотики
 - в. канцерогени
 - г. дефоліанти
410. Хімічні сполуки, які спричиняють опадання листя з рослин це:
- а. тератогени
 - б. ксенобіотики
 - в. канцерогени
 - г. дефоліанти
411. Вперше термін “ландшафтна екологія” введений:
- а. 1939 року
 - б. 1910 року
 - в. 1981 року
 - г. 1868 року
412. Множина елементів природного походження, існуючі взаємозв'язки між якими зумовлюють прояв природи в таких якостях та реалізації нею таких функцій, які без взаємодії елементів були б неможливими, називається:
- а. геотехносистемою
 - б. геосоціосистемою
 - в. соціосистемою
 - г. геосистемою
413. “Геоєкологія” у порівнянні з “ландшафтною екологією” за широтою розуміння є:

- а. більш вузьким поняттям
- б. більш широким поняттям
- в. вузькоспеціалізованим
- г. це геологічний термін

414. Термін "геосистема" впровадив у науковий вжиток:

- а. В.Б. Сочава;
- б. Ф. Дюбуа;
- в. К. Тролль;
- г. І. Зонефельдом.

415. Ділянка земної поверхні у складі географічної оболонки, яка характеризується відносною цілісністю свого складу називається:

- а. природно-територіальний комплекс
- б. фація
- в. геосистема
- г. екосистема.

416. Рівень просторової організації геосистем, виділення якого пов'язане з неодинаковою величиною надходження сонячної енергії на різні широти, а також з неоднорідністю планетарного рельєфу Землі, називається:

- а. регіональний;
- б. локальний;
- в. загальнопланетарний або глобальний.
- г. біомний

417. Однорідні елементарні поверхні рельєфу називаються:

- а. морфотипи
- б. геотопи
- в. кліматопи
- г. екотопи

418. Який з термінів є найбільш широким за змістом:

- а. геокомпонент
- б. геомаса
- в. геогоризонт
- г. геоелемент

419. Сукупність у геосистемах механізмів знешкодження забруднень або виведення їх з кругообігу і з геосистеми взагалі, називається:

- а. циркуляцією
- б. забрудненням
- в. функціонуванням
- г. самоочищенням

420. Найменший за розмірами та найбільш однорідний у природному відношенні комплекс, на всьому протязі якого зберігається однакова літологія поверхневих порід, однаковий характер рельєфу та зволоження, один мікроклімат, один ґрунтовий різновид та один біоценоз, називається:

- а. урочище
- б. місцевість
- в. ландшафт
- г. фація

421. Група фацій, розташованих на одному елементі мезорельєфу та об'єднаних загальними процесами перерозподілу поживних речовин, тепла і вологи називається:

- а. урочище
- б. підурочище
- в. ландшафт
- г. фація

422. Природно-територіальний комплекс пов'язаний з випуклими або увігнутими мезоформами рельєфу, який представляє закономірно побудовану систему генетично, динамічно і територіально пов'язаних фацій або їх груп:

- а. урочище
- б. підурочище
- в. ландшафт
- г. фація

423. Основна відмінність геосистеми від екосистеми:

- а. Поліцентричність
- б. Моноцентричність
- в. Рівномірність
- г. відкритість

424. Геосистема являє собою:

- а. моноцентричну модель
- б. поліцентричну модель
- в. симетричну модель
- г. радіальну модель

425. Індикатором фації є:

- а. біоценоз
- б. крутизна схилу
- в. гірські породи
- г. екотоп

426. Індикатором підурочища є:

- а. біоценоз
- б. біотоп
- в. елемент мезоформи рельєфу
- г. екосистема

427. Видовжений ареал, представлений геотопами з природною, або близькою до неї рослинністю, вздовж якого відбуваються біотичні міграції між окремими біоцентрами це:

- а. фація
- б. фундаментальна ніша
- в. біокоридор
- г. реалізована ніша

428. Лінійний ареал, зайнятий геотопами з природною, або близькою до неї рослинністю, який відгалужується від біоцентра або біокоридора і виконує функцію поширення їх дії на прилеглі агро- чи урбоугіддя це:

- а. фація
- б. біокоридор

- в. інтерактивний елемент
- г. екосистема

429. Предметом ландшафтної екології є:

- а. біотоп
- б. екосистема
- в. геосистема
- г. екоотп

430. Межі між геосистемами можна розділити:

- а. за рівнем забруднення повітря
- б. за морфологічною вираженістю
- в. за рівнем забруднення ґрунтових вод
- г. не можна розділити

431. Метод наукового дослідження, при якому дослідник втручається у перебіг природних процесів і явищ називається: } аналіз синтез =експеримент індукція } 433. Здатність ландшафту зберігати в основних рисах свою структуру і характер зв'язків між елементами незважаючи на зовнішні впливи називається: } стійкість ландшафту =гомеостаз ландшафту сукцесія ландшафту витривалість ландшафту } 434. Процес погіршення сутнісних властивостей, стану і якості ландшафту, збіднення його ресурсних, самозахисних та самовідтворювальних можливостей і загальної цінності називається: } динаміка ландшафту =деградація ландшафту сукцесія ландшафту видозміна ландшафту } 435. Послідовна зміна станів ландшафту в напрямку до корінного або близького до нього динамічного стану називається: } динаміка ландшафту деградація ландшафту =сукцесія ландшафту видозміна ландшафту } 436. Наука про взаємозв'язки та взаємодію у часі й просторі двох систем — міської (її с. оціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністративної підсистем) і природної, а також про ноосферне управління екосистемою називається:

- а. урбоекологія
- б. ландшафтна екологія
- в. загальна екологія
- г. біосферологія

432. Урбанізація – це процес:

- а. підвищення ролі міст в розвитку суспільств
- б. збільшення частки міського населення в регіоні
- в. збільшення частки міського населення у світі
- г. усі правильні

433. Дуже велике місто, яке включає мільйони жителів і тисячі підприємств:

- а. метрополія
- б. мегаполіс
- в. обласний центр
- г. конурбація

434. Центральна зона міста включає в себе:

- а. адміністративні та громадські заклади, об'єкти соціальної інфраструктури та сфери обслуговування
- б. виробничі території
- в. садибну забудову
- г. терикони

435. Вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води:

- а. технічна
- б. зворотна
- в. питна
- г. комбінована

436. Вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів:

- а. технічна
- б. зворотна
- в. стічна
- г. комбінована

437. Встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування:

- а. гранично допустима концентрація
- б. гранично допустимий вплив
- в. залповий скид
- г. фоновая концентрація

438. Скид зворотних вод або забруднюючих речовин, що призвів у будь-який час після скиду до екстремально високого забруднення водного об'єкта, тобто перевищення ГДК шкідливих речовин в контрольному створі водного об'єкта в 50 і більше разів[к1]:

- а. гранично допустимий скид
- б. гранично допустимий вплив
- в. залповий скид
- г. Тимчасово-допустимий скид

439. Концентрація речовини у воді водного об'єкта, що сформувалася під впливом усіх домішок, за винятком впливу даного джерела, відносно якого визначається ця концентрація:

- а. гранично допустима концентрація
- б. відносна концентрація
- в. комбінована концентрація
- г. фоновая концентрація

440. Маса речовини у зворотній воді, тимчасово допустима до відведення у водний об'єкт при поетапному досягненні ГДС:

- а. гранично допустимий скид
- б. гранично допустимий вплив
- в. залповий скид
- г. тимчасово-допустимий скид

441. Верхні шари землі, що несуть на собі відбиток діяльності людини, називають...

- а. угіддя
- б. "культурний шар"
- в. ґрунтовий шар
- г. чорнозем

442. Підвищення температури в місті на 1,5-2°C у порівнянні з навколишніми територіями дістало назву:

- а. парникового ефекту
- б. депресійної воронки
- в. "острова тепла"
- г. селітебної зони

443. Ознака шкідливості, яка проявляється при найменшій концентрації речовини називається:

- а. Гранично допустима концентрація
- б. відносна концентрація
- в. фоновая концентрація
- г. лімітуюча ознака шкідливості (ЛОШ)

444. Скільки класів небезпечності речовини враховують при оцінці якості води у об'єктах культурно-побутового та господарсько-питного водокористування?

- а. 2
- б. 3
- в. 4
- г. 5

445. Максимальна концентрація домішки в атмосферному повітрі, віднесена до визначеного часу осереднення, яка при періодичному впливі або протягом всього життя людини не чинить на неї негативного впливу, в тому числі і при віддалених наслідках, і на навколишнє середовище в цілому це:

- а. Гранично допустима концентрація домішок в атмосферному повітрі (ГДК)
- б. аварійний викид
- в. залповий викид
- г. гранично допустимий вплив

446. Зміну вмісту суспензій, нерозчинних домішок вод зумовлює:

- а. радіоактивне
- б. фізичне забруднення
- в. біологічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

447. Відвали шахтних порід або порід збагачення у формі конусів називаються:

- а. териконами
- б. скверами
- в. суфозіями
- г. угіддями

448. До першого еколого-фітоценотичного поясу в урбоекосистемі належить:

- а. приміські ліси, луки, болота, водойми
- б. міські парки та лісопарки, лугопарки, гідропарки, великі зелені масиви різного призначення
- в. сади та сквери
- г. немає правильної відповіді

449. Гемеробія це:

- а. виділення однотипних рослинних угруповань
- б. еколого-фітоценотичні зони чи пояси або еокліни
- в. рівень окультурення біогеоценозів
- г. немає правильної відповіді

450. Мертва підстилкова поверхня міст належить до класу гемеробії:
- а. першого класу гемеробії (агемеробні)
 - б. третього класу гемеробії (мезогемеробні)
 - в. четвертого класу гемеробії (еугемеробні)
 - г. п'ятого та шостого класів гемеробії (полі- та метагемеробні)
451. Методи, що пов'язані з дією електричного струму на водні розчини належать до:
- а. біологічних
 - б. хімічних
 - в. механічних
 - г. фізико-хімічних
452. Озонування належать до методів очистки стічних вод:
- а. біологічних
 - б. фізико-хімічних
 - в. механічних
 - г. немає правильної відповіді
453. Хлорування належать до методів очистки стічних вод:
- а. механічних
 - б. біологічних
 - в. немає правильної відповіді
 - г. фізико-хімічних
454. Сукупність інженерних споруд, в яких стічні води очищаються від забруднювальних речовин, називаються:
- а. каналізацією
 - б. флотаторами
 - в. очисними спорудами
 - г. усереднювачами
455. Напрямок екології, який займається дослідженням, прогнозуванням та використанням рослинних систем для покращення геофізичних, геохімічних, біотичних, просторових та естетичних характеристик навколишнього середовища:
- а. фітомеліорація
 - б. фітоіндикація
 - в. екологічний моніторинг
 - г. біомоніторинг
456. Як називається забруднення, що полягає у впливі на склад і структуру популяції живих організмів:
- а. інгредієнтне
 - б. параметричне
 - в. біоценотичне
 - г. стадіально - декструкційне
457. Як називається забруднення пов'язане із зміною якісних параметрів навколишнього середовища?
- а. інгредієнтне
 - б. параметричне

- в. біоценотичне
- г. стаціонально-деструкційне

458. Які допустимі межі сили звуку?:

- а. 30 дБ
- б. 45-85 дБ
- в. 100-125 дБ
- г. 130-140 дБ

459. До якого із типу забруднення відновиться світлове?

- а. фізичне
- б. теплове
- в. біологічне
- г. хімічне

460. Гранично-допустиме значення якого-небудь виду навантаження на окремі елементи біосфери - це:

- а. ГДН
- б. ГДЕН
- в. ГДШВ
- г. ГДВ

461. Як називається тип комбінованої дії хімічних речовин, коли одна речовина посилює дію іншої:

- а. антагонізм
- б. синергізм
- в. сумація
- г. адитивна дія

462. До якого класу за ступенем небезпечності відносять помірно небезпечні хімічні речовини:

- а. 1 клас
- б. 2 клас
- в. 5 клас
- г. 3 клас

463. Техноекологія це:

- а. розділ екології, який вивчає джерела і можливий вплив технологічної діяльності на довкілля
- б. розділ біоекології, який займається вивченням взаємозв'язків окремих особин з оточуючим середовищем
- в. наука про навколишнє середовище
- г. наука різні галузі промисловості

464. Явище в атмосфері Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні це:

- а. парниковий ефект
- б. озонова діра
- в. гало
- г. кислотний дощ

465. Локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10—40 % це:

- а. парниковий ефект
 - б. озONOва діра
 - в. гало
 - г. озоновий ефект
466. Основними речовинами, що руйнують молекули озону, є:
- а. прості речовини (водень (H₂), атоми кисню (O), хлора (Cl), бром (Br))
 - б. неорганічні сполуки (хлороводень (HCl), монооксид азоту (NO))
 - в. органічні сполуки (метан (CH₄), фторхлор- і фторбромфреони, які виділяють атоми (Cl) і (Br))
 - г. усі правильні
467. Основними руйнівниками озону є:
- а. фреони
 - б. важкі метали
 - в. нітрати
 - г. вуглекислий газ
468. Дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної це:
- а. парникові ефекти
 - б. лужні дощі
 - в. кислі дощі
 - г. кислотні дощі
469. Вплив працюючої ТЕС на водні об'єкти полягає у:
- а. скиданні охолоджуючих вод
 - б. викиданні димових газів
 - в. утворенні золи та шлаку
 - г. утворенні шлаку
470. Вплив працюючої ТЕС на гідросферу полягає у:
- а. скиданні охолоджуючих вод
 - б. викиданні димових газів
 - в. утворенні золи
 - г. утворенні шлаку
471. Сфера, яка містить штучні технічні споруди, які виготовляються та використовуються людиною називається:
- а. біосферою
 - б. техносферою
 - в. антропосферою
 - г. літосферою
472. Техносфера, як цілісна система, включає в себе:
- а. власне самі технічні артефакти, тобто техніку як об'єкт та її соціокультурне значення
 - б. специфічне технічне знання, уміння, правила, теорії, їх культурну цінність
 - в. технічну діяльність
 - г. усе перелічене
473. Створення і зміна ландшафтів під впливом виробничої діяльності людини це:
- а. техногенез
 - б. антропогенез

- в. генезис
- г. біогенез

474. Ознаку шкідливості, що проявляється при найменшій концентрації речовини називають:

- а. лімітуючою ознакою шкідливості (ЛОШ)
- б. гранично допустимим впливом
- в. відносною концентрацією
- г. фоновою концентрацією

475. Скільки класів небезпечності речовини враховують при оцінці якості води?

- а. 2
- б. 3
- в. 4
- г. 5

476. Максимальна концентрація домішки в атмосферному повітрі, віднесена до визначеного часу осереднення, яка при періодичному впливі або протягом всього життя людини не чинить на неї негативного впливу це:

- а. гранично допустимий вплив
- б. Гранично допустима концентрація домішок в атмосферному повітрі (ГДК)
- в. аварійний викид
- г. залповий викид

477. Пилоподібний або шлакоподібний залишок, що утворюється з мінеральної частини палива, коли воно повністю згоряє це:

- а. вугілля
- б. зола
- в. доменний газ
- г. кокс

478. Зміну прозорості, вмісту суспензій, нерозчинних домішок, радіоактивності вод зумовлює:

- а. радіоактивне
- б. фізичне забруднення
- в. хімічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

479. Збагачення водойм біогенними елементами, що супроводжується підвищенням продуктивності водойми це:

- а. евтрофікація
- б. біологічне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

480. Надходження у водні об'єкти домішок неорганічного та органічного походження спричинює:

- а. радіоактивне забруднення
- б. фізичне забруднення
- в. біологічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

481. Розтоплена або затверділа маса різних домішок, золи і флюсів, що є побічним продуктом металургійних процесів і використовується для виготовлення в'язучих матеріалів це:

- а. шлаки
- б. вугілля
- в. зола
- г. кокс

482. Сировиною для отримання коксу є:

- а. вугілля
- б. зола
- в. кокс
- г. нафта

483. Концентрація забруднювача в повітрі, що не викликає рефлексорних реакцій в організмі людини це:

- а. ГДВ
- б. ГДКс.д.
- в. ГДКм.р.
- г. ГДК

484. Наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей це:

- а. механічне забруднення
- б. біотехногенне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біологічне забруднення

485. Випуск у водойми підігрітих вод підприємств, теплових і атомних ЕС створює:

- а. механічне забруднення
- б. теплове забруднення
- в. біотехногенне забруднення
- г. хімічне забруднення

486. Відходи нафтопереробки:

- а. бензин та мастила
- б. мазут
- в. нафтошлами та кислі гудони
- г. немає правильної відповіді

487. Видалення крупнозернистих забруднюючих речовин на ґратах, відстоювання та фільтрування належать до методів очистки стічних вод:

- а. фізико-хімічних
- б. механічних
- в. біохімічних
- г. біологічних

488. Локальне очисне устаткування, що застосовується на стадії проектування та будівництва комплексних систем локального очищення побутових і господарських стічних вод:

- а. септик
- б. флотатор-усереднювач
- в. аеротенк
- г. відстійник

489. Термін „біологія” запропонував вчений

- а. Ернст Геккель
 - б. Арістотель
 - в. Грегор-Йоганн Мендель
 - г. Жан-Батіст Ламарк
490. Біологія індивідуального розвитку вивчає
- а. Сперматогенез
 - б. Оогенез
 - в. Філогенез
 - г. Онтогенез
491. Закономірності спадковості і мінливості організмів вивчає
- а. Систематика
 - б. Біохімія
 - в. Філогенія
 - г. Генетика
492. Шляхи історичного розвитку певних систематичних груп живих організмів вивчає
- а. Систематика
 - б. Біохімія
 - в. Філогенія
 - г. Генетика
493. Неклітинні форми життя вивчає
- а. Вірусологія
 - б. Біохімія
 - в. Біоніка
 - г. Бактеріологія
494. Прокаріотичні організми вивчає
- а. Вірусологія
 - б. Бактеріологія
 - в. Мікологія
 - г. Ліхенологія
495. Наука, яка досліджує викопні рештки вимерлих організмів
- а. Іхтіологія
 - б. Палеонтологія
 - в. Філогенія
 - г. Ліхенологія
496. Закономірності поширення живих організмів на Землі досліджує
- а. Систематика
 - б. Екологія
 - в. Біогеографія
 - г. Біометрія
497. Систематика – наука, яка
- а. Вивчає шляхи історичного розвитку систематичних груп живих організмів;
 - б. Досліджує закономірності історичного розвитку живих організмів;
 - в. Досліджує закономірності поширення живих організмів на Землі;
 - г. Описує, упорядковує, класифікує існуючі і вимерлі види живих організмів.

498. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого описують і аналізують певні біологічні об'єкти чи явища

- а. Порівняльно-описовий
- б. Експериментальний
- в. Моніторинг
- г. Статистичний

499. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого штучно створюють ситуацію, що допомагає вивчити певні властивості живих організмів

- а. Порівняльно-описовий
- б. Експериментальний
- в. Моделювання
- г. Статистичний

500. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого проводять постійні (довготривалі) стеження за перебігом певних біологічних процесів, за станом певних біологічних об'єктів

- а. Порівняльно-описовий
- б. Моделювання
- в. Моніторинг
- г. Статистичний

501. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого проводять математичну обробку матеріалу, одержаного в результаті спостережень за біологічними об'єктами, явищами, процесами

- а. Порівняльно-описовий
- б. Моделювання
- в. Моніторинг
- г. Статистичний

502. Живлення – це процес

- а. Окислення органічних речовин із вивільненням енергії
- б. Надходження до організму поживних речовин та їх засвоєння
- в. Надходження до організму води та її засвоєння
- г. Збільшення розмірів тіла

503. Дихання – це процес

- а. Окислення органічних речовин із вивільненням енергії
- б. Видалення з організму продуктів життєдіяльності
- в. Надходження до організму води та її засвоєння
- г. Випаровування води поверхнею тіла

504. Виділення – це процес

- а. Окислення органічних речовин із вивільненням енергії
- б. Видалення з організму продуктів життєдіяльності
- в. Виведення з організму неперетравлених решток їжі
- г. Випаровування води поверхнею тіла

505. Автотрофи – організми, які

- а. Для процесів окислення використовують молекулярний кисень
- б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
- в. Живляться готовими органічними речовинами
- г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних

506. Гетеротрофи – організми, які
- а. Не здатні підтримувати сталість хімічного складу, будови, властивостей у змінних умовах
 - б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
 - в. Живляться готовими органічними речовинами
 - г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних
507. Аероби – організми, які
- а. Для процесів окислення використовують молекулярний кисень
 - б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
 - в. Живляться готовими органічними речовинами
 - г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних
508. Анаероби – організми, які
- а. Для процесів окислення використовують молекулярний кисень
 - б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
 - в. Живляться готовими органічними речовинами
 - г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних
509. Сапрофіти – організми, що живляться
- а. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі хемосинтезу
 - б. За рахунок інших організмів, з якими взаємовигідно співживуть
 - в. Органічними речовинами живих організмів, завдаючи шкоди останнім
 - г. Органічними речовинами відмерлих організмів, всмоктуючи їх поверхню тіла
510. Паразити – організми, що живляться
- а. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі фотосинтезу
 - б. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі хемосинтезу
 - в. За рахунок інших організмів, з якими взаємовигідно співживуть
 - г. Органічними речовинами живих організмів, завдаючи шкоди останнім
511. Симбіонти – організми, що живляться
- а. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі фотосинтезу
 - б. За рахунок інших організмів, з якими взаємовигідно співживуть
 - в. Органічними речовинами живих організмів, завдаючи шкоди останнім
 - г. Органічними речовинами відмерлих організмів, всмоктуючи їх поверхню тіла
512. Здатність організму відповідати на зміни навколишнього середовища обмін речовин;
- а. Розвиток
 - б. Подразливість
 - в. Саморегуляція
 - г. Пристосованість
513. Здатність організму підтримувати сталість хімічного складу, будови, властивостей у змінних умовах середовища
- а. Розвиток
 - б. Подразливість
 - в. Саморегуляція
 - г. Пристосованість
514. Відповідність будови та життєдіяльності організму конкретним умовам середовища

- а. Розвиток
 - б. Подразливість
 - в. Саморегуляція
 - г. Пристосованість
515. Збільшення кількості організмів
- а. Розвиток
 - б. Розмноження
 - в. Саморегуляція
 - г. Пристосованість
516. Подразливість організмів виявляється у формі
- а. Руху
 - б. Розвитку
 - в. Розмноження
 - г. Обміну речовин
517. Ріст організмів розрізняють
- а. Обмежений і необмежений
 - б. Аеробний і анаеробний
 - в. Видовжений і вкорочений
 - г. Автотрофний і гетеротрофний
518. Дихання організмів розрізняють
- а. Внутріклітинне та внутріпорожнинне
 - б. Пряме й непряме
 - в. Автотрофне і гетеротрофне
 - г. Аеробне й анаеробне
519. Індивідуальний розвиток організму
- а. Партеногенез
 - б. Ембріогенез
 - в. Філогенез
 - г. Онтогенез
520. Розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини
- а. Гаметогенез
 - б. Партеногенез
 - в. Філогенез
 - г. Онтогенез
521. До надцарства Прокаріоти належать
- а. Віруси і бактерії
 - б. Бактерії та ціанобактерії
 - в. Гриби й лишайники
 - г. Синьо-зелені та зелені водорості
522. Зв'язаною (структурованою) називають воду, яка
- а. Міститься у протопластах клітин
 - б. Міститься в міжклітинному середовищі
 - в. Формує водяну оболонку навколо деяких сполук (наприклад білків) і перешкоджає їхній взаємодії

г. Утворюється в результаті реакції конденсації або бере участь у гідролізі складних органічних сполук

523. Гідрофільними називаються речовини, які

- а. Мають неполярні молекули і нерозчинні у воді
- б. Мають полярні молекули і нерозчинні у воді
- в. Мають неполярні молекули і розчиняються у воді
- г. Мають полярні молекули і розчиняються у воді

524. Завдяки великій теплоємності вода

- а. Бере участь у біохімічних реакціях
- б. Забезпечує рівномірний розподіл теплоти в організмі
- в. Запобігає різким змінам температури у живих системах та навколишньому середовищі
- г. Здатна підніматись на великі відстані по судинах ксилеми

525. Завдяки високій теплопровідності вода

- а. Є універсальним розчинником і середовищем для біохімічних реакцій
- б. Забезпечує рівномірний розподіл теплоти в організмі
- в. Запобігає різким змінам температури у живих системах та навколишньому середовищі
- г. Здатна підніматись на великі відстані по судинах ксилеми

Основний рівень

1. Префіксом „еври” позначають:

- а. температуру повітря
- б. критичні точки витривалості
- в. вузьку екологічну валентність виду
- г. широку екологічну валентність виду

2. Коменсалізм є фактором:

- а. абіотичним
- б. біотичним
- в. неживої природи
- г. антропогенним

3. Взаємовідносини між видами з близькими екологічними потребами – це:

- а. конкуренція
- б. коменсалізм
- в. паразитизм
- г. мутуалізм

4. Первинним джерелом енергії для переважної більшості біологічних систем є:

- а. температура
- б. рослини
- в. вода
- г. сонячне світло

5. Комплекс організмів, які розкладають органічні речовини до мінеральних – це:

- а. редуценти
- б. продуценти
- в. консументи
- г. гетеротрофи

6. Закономірні харчові відносини між організмами характеризують:
- а. вікову структуру
 - б. видову структуру
 - в. трофічну структуру
 - г. екологічну структуру
7. Потік енергії, який доходить до 3-ї ланки трофічного ланцюга, зменшується в:
- а. 105 разів
 - б. 100 разів
 - в. 50 разів
 - г. 150 разів
8. Перша Червона книга України видана в:
- а. 2000
 - б. 1935
 - в. 1994
 - г. 1980
9. Першим Природним Національним Парком в Україні став:
- а. Карпатський
 - б. Шацький
 - в. Галицький
 - г. Канівський
10. Префіксом „стено” позначають:
- а. недостатність дії якогось фактора
 - б. надмірність дії якогось фактора
 - в. широку екологічну валентність виду
 - г. вузьку екологічну валентність виду
11. Форма взаємовідносин між двома видами тварин, коли один з них користується якимись перевагами за рахунок іншого, не завдаючи йому безпосередньої шкоди - це:
- а. коменсалізм
 - б. паразитизм
 - в. мутуалізм
 - г. конкуренція
12. У 1935 р. А. Теслі запровадив термін:
- а. популяція
 - б. біоценоз
 - в. екосистема
 - г. біогеоценоз
13. Продуценти – це:
- а. фотосинтезуючі організми
 - б. гетеротрофні організми різних рівнів
 - в. гетеротрофні організми одного рівня
 - г. організми, які розкладають органічні речовини
14. Поступове зменшення продукції від нижчих до вищих трофічних рівнів – це:

- а. екологічна піраміда
 - б. трофічна піраміда
 - в. вікова піраміда
 - г. просторова піраміда
15. Збагачення місцевої фауни новими видами тварин, завезеними з інших територій - це...:
- а. акліматизація
 - б. реакліматизація
 - в. реабілітація
 - г. рекреація
16. Які організми відносяться до первинних консументів?
- а. фітофаги
 - б. міофаги
 - в. ентомофаги
 - г. батрахофаги
17. Поняття "екологія" вперше введено у науку:
- а. Одумом
 - б. Тенслі
 - в. Зюссом
 - г. Геккелем
18. Розділ біоекології, який займається вивченням взаємозв'язків окремих особин з оточуючим середовищем називається: } =аутекологія демекологія синекологія біогеоценологія } 19.
Екологічна система до складу якої входять усі популяції певного угруповання і перебувають між собою в екологічних зв'язках називається:
- а. моноцен
 - б. демоцен
 - в. плеоцен
 - г. поліцен
19. Який з перерахованих типів зв'язків не реалізується в екологічній системі рівня демоцен:
- а. внутріпопуляційна коакція
 - б. міжпопуляційна коакція
 - в. акція
 - г. реакція
20. Який ієрархічний ряд організованих систем у біосфері є правильним?:
- а. організм → популяція → біом → біоценоз → біосфера
 - б. організм → популяція → вид → біоценоз → біом → біосфера
 - в. популяція → вид → біом → біогеоценологічний комплекс → біосфера
 - г. організм → популяція → біом → вид → біосфера
21. Розділ біоекології, який вивчає структурно-функціональні характеристики і динаміку біосистем популяційного рівня у зв'язку з дією сукупності абіотичних і біотичних факторів середовища називається:
- а. аутекологія
 - б. демекологія
 - в. синекологія
 - г. біосферологія

22. Комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біосферу, загалом, та кругообіг в ній речовини й енергії називається:
- а. синекологією
 - б. аутокологією
 - в. демекологією
 - г. глобальною екологією
23. Блок екологічних наукових напрямів, результати досліджень яких спрямовані на вирішення практичних проблем охорони навколишнього природного середовища називається:
- а. біоекологія
 - б. прикладна екологія
 - в. соціальна екологія
 - г. геоекологія
24. Поняття "екологічна система" вперше введено у науку:
- а. А. Тенслі
 - б. Е. Геккелем
 - в. Ю. Одумом
 - г. В.І. Вернадським
25. Системний підхід в екології заснований:
- а. Л. фон Берталанфі
 - б. А. Лоткою
 - в. Дж. Хакслі
 - г. Е. Геккелем
26. Під поняттям "емерджентність системи" розуміють:
- а. здатність системи підтримувати стабільність
 - б. незалежність системи
 - в. набуття системою нових якостей
 - г. дестабілізацію системи
27. Група особин одного виду або угруповання, наявність, кількість або інтенсивність розвитку яких у тому чи іншому середовищі є показником певних екологічних процесів називаються:
- а. біоіндикаторами
 - б. біотесторами
 - в. еврибіонтами
 - г. стенобіонтами
28. Об'єктом вивчення екології є:
- а. навколишнє середовище
 - б. угруповання живих організмів
 - в. біота в цілому
 - г. екосистема
29. Предметом вивчення екології як науки є:
- а. екосистеми різних ієрархічних рангів
 - б. зв'язки між компонентами екосистем
 - в. зв'язки між живими організмами
 - г. фактори середовища

30. Науковий напрям, який аналізує стосунки між особинами, які належать до різних видів певного угруповання, а також між ними і оточуючим середовищем називається:
- а. синекологією
 - б. аутокологією
 - в. демекологією
 - г. глобальною екологією
31. Особливості сукцесійних змін угруповань досліджує:
- а. статичний напрям синекології
 - б. динамічний напрям синекології
 - в. статичний напрям демекології
 - г. динамічний напрям аутокології
32. Екологічна система, до складу якої входять популяція і середовище її існування називається:
- а. моноцен
 - б. демоцен
 - в. плеоцен
 - г. поліцен
33. Пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник не втручається у перебіг природних процесів і явищ називається:
- а. аналіз
 - б. моделювання
 - в. експеримент
 - г. спостереження
34. Основним методом функціональної екології є метод:
- а. аналізу
 - б. синтезу
 - в. експерименту
 - г. індукції
35. Порогове значення дії фактору, вище або нижче якого організм не може існувати, називається:
- а. зоною екологічної толерантності
 - б. точкою мінімуму
 - в. точкою максимуму
 - г. критичною точкою
36. Лімітуючий вплив максимуму довів:
- а. Ю. Одум
 - б. Ю. Лібіх
 - в. Г.Ф. Гаузе
 - г. В. Шелфорд
37. Глибоководні живі організми відносяться до:
- а. евритермних еврибатних
 - б. стенобатних
 - в. стенотермних стенобатних
 - г. стенотермних еврибатних
38. Яке із визначень не відповідає поняттю "екологічна толерантність":

- а. стійкість живих організмів до дії факторів середовища
 - б. діапазон між екологічним мінімумом і максимумом
 - в. екологічна валентність виду, зумовлена його пристосувальною здатністю
 - г. спосіб існування виду
39. Яке із нижче перелічених явищ зумовлене впливом абіотичного фактору:
- а. вплив популяції хижака на популяцію жертви
 - б. конкуренція за кормові ресурси
 - в. зміна ареалу поширення виду, зумовлена перебудовою температурного режиму певної території
 - г. витіснення аборегенного виду через інвазію чужорідного
40. Кліматичні фактори середовища існування належать до:
- а. біотичних
 - б. абіотичних
 - в. антропогенних
 - г. біогенних
41. За класифікацією екологічних факторів Мончадського зміна пір року належить до:
- а. первинно періодичних
 - б. вторинно періодичних
 - в. першочергових
 - г. другорядних
42. Діапазон екологічного фактору, у межах якого може існувати вид за відсутності конкурентного середовища називається:
- а. фундаментальною екологічною нішею
 - б. реалізованою екологічною нішею
 - в. потенційною екологічною нішею
 - г. постконкурентною екологічною нішею
43. Температура як екологічний фактор діє за принципом:
- а. градієнтів
 - б. "все або нічого"
 - в. функціональності
 - г. ціле направленості
44. До абіотичних| екологічних чинників|факторів| відносяться:
- а. ґрунтова волога, повітря і підстилаючи гірські|гірничі| породи
 - б. фітоценози|, що визначають хід біологічної продуктивності
 - в. ґрунти, включаючи ґрунтових мікроорганізмів і ґрунтову вологу
 - г. сонячна радіація і продуценти, що використовують її для виробництва біомаси
45. Терміни біогеоценоз і екосистема співвідносяться:
- а. біогеоценоз є окремим випадком екосистеми
 - б. біогеоценоз - екосистема в межах конкретного фітоценозу
 - в. екосистема є окремим випадком біогеоценозу
 - г. як синоніми
46. Що таке екосистема (виберіть найбільш точне визначення)?
- а. єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх перебування, в якому живі і косні компоненти взаємозв'язані обміном речовини, енергії і

інформації

- б. асоціація рослинності, що займає певне положення в просторі, що відрізняється від суміжних асоціацій
- в. єдиний природний комплекс, що включає рослинність, ґрунти і підстилаючи гірські породи
- г. поєднання рослинних і тваринних організмів

47. Екологічною нішею називається:

- а. позиція виду у співтоваристві і в співвідношенні з іншими видами і середовищем перебування
- б. територія переважного незаселеного якогось виду
- в. територія, в межах якої здійснюється конкурентна боротьба між видами
- г. місцеперебування будь-якого виду організмів, що характеризуються сприятливими для нього умовами

48. Організми, які витримують сильний ступінь дефіциту кисню, називаються:

- а. реофіли
- б. олігосапроби
- в. мезосапроби
- г. полісапроби

49. Рослини пристосовані до значних втрат вологи і ростуть в умовах недостатнього зволоження, називаються:

- а. гігрофіти
- б. ксерофіти
- в. мезофіти
- г. мезогігрофіти

50. Екологічну групу рослин, що живуть в умовах підвищеної вологості повітря і на вологих ґрунтах називають:

- а. гігрофітами
- б. мезофітами
- в. гідрофітами
- г. ксерофітами

51. Сукупність особин одного виду, що формується і розвивається під впливом однорідних фітоценотичних умов і однаково на них реагує називається:

- а. геміпопуляція
- б. псевдопопуляція
- в. ценопопуляція
- г. генетична популяція

52. Кількість особин (або їх біомаса) у перерахунку на одиницю доступної площі або об'єму, які фактично можуть бути зайняті популяцією, називається:

- а. оптимальна щільність
- б. екологічна щільність
- в. максимальна щільність
- г. мінімальна щільність

53. Популяції, у яких відсутні особини початкових онтогенетичних стадій називаються:

- а. інвазійними
- б. регресивними

- в. прогресивними
- г. псевдопопуляціями

54. Біотичний потенціал популяції показує:

- а. експоненціальна крива
- б. логістична крива
- в. s-подібна крива
- г. синусоїда

55. Ріст популяції в умовах обмежених, але поповнюваних, ресурсів відбувається за:

- а. експоненціальна крива
- б. логістична крива
- в. s-подібна крива
- г. синусоїда

56. Стратегія розвитку, при якій відбір напрямлений на імовірність виживання окремих особин називається:

- а. r - стратегія
- б. d - стратегія
- в. K - стратегія
- г. L – стратегія

57. Яка із зазначених характеристик не відноситься до популяцій:

- а. дискретна форма існування
- б. атрибут живої матерії
- в. нездатність до самопідтримки
- г. сукупність особин одного виду

58. Група особин деякої популяції, яка не має змоги розмножуватись на даній території називається:

- а. локальна популяція
- б. елементарна популяція
- в. ценопопуляція
- г. псевдопопуляція

59. Популяція, в якій виразно виявляється відмінність життєвих вимог у різних фазах життєвого циклу, а окремі особини займають різне місце у природі називається:

- а. геміпопуляція
- б. ценопопуляція
- в. елементарна популяція
- г. псевдо популяція

60. Поліциклічними називаються популяції:

- а. які складаються з особин одного віку
- б. які складаються з особин різних вікових станів і поколінь
- в. із різко переважаючою кількістю особин постгенеративного віку
- г. із різко переважаючою кількістю особин генеративного віку

61. Співвідношення статей у популяції 1:1 називається:

- а. сім'єю
- б. прайдом

- в. колонією
- г. зграєю

62. Запис $M = N_0 \cdot R^t$ (M - кількість особин популяції; N_0 - початкова щільність популяції; R^t - величина на яку кожна щільність N може вирости за одиницю часу) справедливий за умови росту чисельності за:

- а. логістичним типом
- б. експоненціальним типом
- в. стабільним типом
- г. циклічним типом

63. Синонімом популяційної екології є:

- а. демекологія
- б. аутекологія
- в. синекологія
- г. фітоценологія

64. Якому з основних підходів відповідає таке визначення "Популяція – сукупність особин одного виду, які заселяють територію конкретної екосистеми":

- а. демотипічному
- б. фенотипічному
- в. центипічному
- г. плеотипічному

65. Інтенсивним зростанням у формі геометричної прогресії характеризується:

- а. показниковий тип росту чисельності
- б. логістичний тип росту чисельності
- в. циклічний тип росту чисельності
- г. стабільний тип росту чисельності

66. Динаміка чисельності популяції, яка регулярно повторюється описується:

- а. показниковим типом
- б. логістичним типом
- в. циклічним типом
- г. стабільним типом

67. Оберіть найбільш точне визначення біоценозу:

- а. сукупність взаємодіючих між собою організмів, які населяють певну ділянку суші чи водойми
- б. сукупність рослинних організмів, що займають|позичають, посідають| певну територію
- в. всукупність абіотичних умов певної ділянки суші чи водойми
- г. сукупність тварин, які є ланками трофічного ланцюга

68. Поступовий розвиток біоценозів у напрямку зростаючої стабілізації системи називається:

- а. екологічною сукцесією
- б. екологічним континуумом
- в. ектоном
- г. клімаксом

69. Організми, які використовують для споживання готові органічні речовини представлені:

- а. продуцентами і деструкторами
- б. редуцентами і автотрофами

- в. автотрофами і консументами
- г. консументами і деструкторами

70. Зелені рослини, здатні використовувати сонячну енергію для утворення хімічних сполук називаються:

- а. хемотрофами
- б. редуцентами
- в. консументами I порядку
- г. автотрофами

71. Однорідні рослинні угруповання, які не залежать від складу рослинності і регулюються макрокліматом називаються:

- а. екосистемами
- б. біомами
- в. Біоцентрами
- г. консорціуми

72. Перший трофічний рівень представлений:

- а. консументами I порядку
- б. продуцентами
- в. редуцентами
- г. біоредукторами

73. Кінцева ланка трофічного ланцюга представлена:

- а. консументами III порядку
- б. консументами
- в. біоредукторами
- г. автотрофами

74. Які види є кращими індикаторами?

- а. стенотопні
- б. еврітопні
- в. автотрофи
- г. монофаги

75. Чи може сукцесія мати регресивний характер?

- а. так, переважно антропогенна за походженням
- б. так, це закономірне природне явище
- в. ні
- г. це можливо тільки як наслідок геологічних змін

76. Чи можуть окремі компоненти екосистеми існувати автономно?

- а. таке можливе тільки при певних умовах
- б. жодна частина екосистема не може існувати без іншої
- в. рівень підтримання екосистеми угрупованнями дає автономність її компонентам
- г. окремі компоненти, можуть бути автономними від інших в екосистемі

77. Як називається сукупність угруповань живих організмів екосистеми?

- а. біота
- б. біом
- в. біогеоценоз
- г. біомаса

78. Який із вказаних об'єктів ПЗФ є найвищою категорією заповідання? } =біосферний заповідник державний заповідник національний парк заказник загальнодержавного значення } 80. Яким чином фосфор з біомаси морських організмів може потрапити на суходіл?
- а. через ланцюг риба-іхтіофаги
 - б. фосфор не може потрапити на суходіл
 - в. через вилужування та поверхневий стік
 - г. внаслідок мінералізації
79. Який принцип в перетворенні та переміщенні речовин в біосфері є основоположним?
- а. принцип Ле Шательє
 - б. принцип циклічності
 - в. принцип однонаправленості
 - г. принцип узгодженості
80. Від чого залежить будова ланцюгів живлення?
- а. від ефективності асиміляції
 - б. від присутності в екосистемі консументів різних груп
 - в. від валової продукції
 - г. від вторинної продукції
81. Кінцева фаза природного розвитку екологічної системи, яка максимально відповідає екологічним характеристикам місцевості у певний період називається:
- а. сукцесією
 - б. клімаксом
 - в. екотопом
 - г. крайовим ефектом
82. Сапрофагами називаються тварини, що харчуються:
- а. рослинною їжею
 - б. тваринною їжею
 - в. відмерлими рештками живих організмів
 - г. кореневими частинами рослин
83. Біопродуктивність це -
- а. загальна кількість біомаси, що виробляється угрупованням або популяцією за одиницю часу на одиниці площі
 - б. темпи розвитку будь-якого організму, залежно від умов його місцеперебування
 - в. функціонування трофічного ланцюга екосистеми або ландшафту
 - г. загальна кількість енергії, яка засвоюється консументами угруповання
84. Загальна кількість енергії, утворена продуцентами певного угруповання, виражена в кДж×м²/рік називається:
- а. чиста продукція
 - б. валова продукція
 - в. біопродукція
 - г. вторинна продукція
85. Що означає стан гомеостазу екологічної системи?
- а. стан внутрішньої динамічної рівноваги
 - б. нерівноважний стан, викликаний|спричинений| зовнішніми впливами

- в. поступова зміна одних екосистем іншими під впливом зовнішніх чинників|
- г. синонім поняття "клімаксовий біогеоценоз"

86. У чому полягає принцип виключення|винятку| Г.Ф. Гаузе?

- а. два види не можуть займати один ареал, якщо їхні екологічні потреби ідентичні
- б. неможливий розвиток екосистем при надмірному техногенному тиску|тисненні|
- в. сукцесія| не може протікати в умовах дефіциту|нестачі| вологи або сонячної енергії
- г. екосистема не досягне клімаксного| стану в разі деструктивної сукцесії

87. Канали, якими постійно відбувається передача енергії з одного трофічного рівня на інший називаються:

- а. ланцюгами живлення
- б. пірамідами енергії
- в. кормовою мережею
- г. трофічною структурою

88. Графічним методом зображення трофічної структури біоценозів є:

- а. екологічні піраміди
- б. трофічні ланцюги
- в. екологічні гістограми
- г. криві живлення

89. Первинні хижаки утворюють:

- а. I трофічний рівень
- б. II трофічний рівень
- в. III трофічний рівень
- г. IV трофічний рівень

90. Горизонтальна структуризація живої оболонки Землі (біосфери) розпочинається з:

- а. екотону
- б. синузії
- в. екотопу
- г. біогеоценозу

91. Еволюційний процес, що відбувається в межах виду називається:

- а. макроеволюцією
- б. синеволоюцією
- в. мікроеволюцією
- г. коеволюцією

92. Етап розвитку органічного світу, на якому розумна людська діяльність є домінуючим чинником розвитку біосфери називається:

- а. ноосфера
- б. техногенез
- в. номогенез
- г. літосфера

93. Вчення про біосферологію розвинуте:

- а. В.І. Вернадським
- б. М.Ф. Реймерсом
- в. Ламарком
- г. Ю. Одумом

94. Сукупність живих організмів Землі утворює:
- живу речовину
 - біогеоценоз
 - біокосну речовину
 - біосферу
95. Верхня межа живої оболонки Землі (біосфери) зумовлена:
- низькими температурами, при яких порушується нормальний хід ферментативних процесів
 - нестачею кисню та вуглекислого газу
 - наявністю короткохвильового ультрафіолетового випромінювання
 - дефіцитом вологи у верхніх шарах атмосфери
96. Нижня межа живої оболонки Землі (біосфери) зумовлена:
- нестачею Оксигену
 - надвисокими температурами, при яких відбувається денатурація білка
 - надлишком вуглекислоти
 - надвисокими тисками глибин Землі
97. Максимум живої речовини біосфери локалізовано на межі:
- нижні шари тропосфери – земна кора – верхні шари гідросфери
 - верхні шари тропосфери – нижні шари стратосфери
 - нижні шари земної кори - верхні шари мантії – зона нафтоутворення
 - нижні шари гідросфери - верхні шари мантії
98. Найбіднішим таксономічним різноманіттям представлена жива речовина:
- теллуробіосфери
 - аеробіосфери
 - літобіосфери
 - гідробіосфери
99. Основою горизонтального зонування біосфери є:
- характер підстилаючої поверхні
 - річний радіаційний баланс та опади
 - вміст кисню та вуглекислого газу в атмосфері
 - мікрокліматичні особливості території
100. Оберіть вірно побудований ієрархічний ряд підсистем біосфери (за М.Ф. Реймерсом):
- біокомплекс → біогеоценоз → біогеографічне царство → біом → біосфера
 - асоціація → біогеоценоз → біом → біогеографічне царство → біосфера
 - біогеоценоз → екологічна група асоціацій → біом → біогеографічне царство → біосфера
 - біом → біоценотичний комплекс → екологічна група асоціацій → біогеоценоз → біосфера
101. Поглинання сонячної енергії в процесі фотосинтезу та її передача по кормових ланцюгах лежить в основі:
- концентраційної функції біосфери
 - енергетичної функції біосфери
 - транспортної функції біосфери
 - трофічної функції біосфери
102. Середовищевірна функція біосфери полягає у:

- а. перенесенні хімічних елементів між різними компонентами довкілля
 - б. мінералізації органічної речовини та розкладанні гірських порід
 - в. трансформації фізико-хімічних властивостей природних сфер Землі
 - г. вибіркового накопиченні окремих видів речовин
103. Термін "біосфера" вперше було вжито:
- а. Мебіусом
 - б. М.Ф. Реймерсом
 - в. Е. Зюссом
 - г. Ю. Одумом
104. Кругообіг Карбону на Землі є прикладом:
- а. косного процесу
 - б. біогенного процесу
 - в. біокосного процесу
 - г. радіоактивного розпаду
105. Ґрунт належить до:
- а. живої речовини
 - б. косної речовини
 - в. біогенної речовини
 - г. біокосної речовини
106. Вибіркове накопичення атомів окремих речовин, розсіяних у природі, лежить в основі:
- а. концентраційної функції біосфери
 - б. енергетичної функції біосфери
 - в. транспортної функції біосфери
 - г. середовищевірної функції біосфери
107. Деструктивна функція біосфери полягає у:
- а. мінералізації органічної речовини та розкладанні гірських порід
 - б. трансформації фізико-хімічних властивостей природних сфер Землі
 - в. перенесенні речовин проти сили тяжіння за горизонтальним вектором
 - г. вибіркового накопиченні окремих видів речовин
108. Концепція сталого розвитку:
- а. віддає перевагу захисту екологічного стану довкілля
 - б. віддає перевагу необхідності підвищення темпів економічного росту
 - в. передбачає різке зниження темпів економічного росту
 - г. передбачає гармонізацію екологічного стану довкілля і економічного розвитку
109. Комплексна дисципліна про навколишнє середовище, його якість та охорону – це:
- а. біоекологія
 - б. енвіронментологія
 - в. глобальна екологія
 - г. агроєкологія
110. Система поглядів, згідно з якою людина є центром всесвіту і його кінцевою метою називається:
- а. еоцентризмом
 - б. геоцентризмом

- в. біоцентризмом
- г. антропоцентризмом

111. Система поглядів, згідно з якою жива природа є основою світобудови, а біосфера – природне утворення, здатне до самоорганізації називається:

- а. геоцентризмом
- б. біоцентризмом
- в. антропоцентризмом
- г. екоцентризмом

112. Вид взаємовідношень між видами, внаслідок яких обидва види отримують користь від сумісного існування називають:

- а. алелопатією
- б. мімікрією
- в. симбіозом
- г. адаптацією

113. Детермінантами консорцій називають:

- а. види, що об'єднуються навколо центрального виду
- б. види навколо яких відбувається об'єднання інших видів
- в. всі автотрофні види консорції
- г. жодна відповідь не правильна

114. Ключовим фактором формування вертикальної структури біоценозів є:

- а. характер підстилаючої поверхні
- б. географічна широта місцевості
- в. видовий склад рослинних угруповань
- г. проникнення сонячного світла на окремі яруси рослинного угруповання

115. Які зоогеографічні (екологічні) правила вказують на вплив температури навколишнього середовища на розміри тіла (і частин тіла) у гомойотермних тварин:

- а. правило Алена
- б. правило Глогера
- в. правило Копа
- г. правило Гаузе

116. Екологічну групу рослин, що ростуть на засолених ґрунтах називають:

- а. псамофіти
- б. галофіти
- в. геліофіти
- г. психрофіти

117. Як називається ділянка абіотичного середовища, яку займає угруповання живих організмів:

- а. ареал
- б. біом
- в. екоотп
- г. біотоп

118. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов'язані обміном речовин, енергії та інформації – це:

- а. біогеоценоз
- б. ареал

- в. агроценоз
- г. біом

119. Біозабруднення водних об'єктів – це...

- а. надходження у водойми речовин із вираженою токсичною дією на гідробіонти
- б. надходження у водойми органічних та неорганічних сполук разом зі стоками сільсько-господарських і комунально-побутових підприємств
- в. зміна фізико-хімічних параметрів водойм, яка призводить до зменшення їх біологічного різноманіття
- г. надходження у водойми різних видів мікроорганізмів, рослин, тварин, невластивих водній екосистемі

120. Насиченість природної води і донних відкладів водойм та водотоків органічними речовинами, здатними розкладатися називається:

- а. евтрофікація
- б. сапробність
- в. нітрифікація
- г. буферність

121. Сукупність тварин, які живуть на дні морських і прісних водойм називають:

- а. бентос
- б. зообентос
- в. перифітон
- г. нектон

122. Яйця та личинки риб належать до групи:

- а. зоопланктон
- б. зообентос
- в. перифітон
- г. фітопланктон

123. Організми, що заселяють підводні об'єкти називаються:

- а. фітопланктон
- б. фітобентос
- в. перифітон
- г. зоопланктон

124. Синьозелені та діатомові водорості входять до групи:

- а. фітопланктон
- б. перифітон
- в. зообентос
- г. нейстон

125. Рослиноїдні тварини займають у ланцюгу живлення трофічний рівень:

- а. п'ятий
- б. перший
- в. другий
- г. четвертий

126. Продукція організмів кожного наступного трофічного рівня менша такої продукції попереднього рівня в середньому:

- а. в 5 разів
 - б. в 7 разів
 - в. в 10 разів
 - г. в 15 разів
127. Природне накопичення Нітрогену в ґрунті здійснюється за рахунок посівів:
- а. жита
 - б. пшениці
 - в. ячменю
 - г. бобових
128. Тварин, що живляться екскрементами називають:
- а. копрофагами
 - б. поліфагами
 - в. монофагами
 - г. олігофагами
129. Взаємне пристосування екологічно різних форм сумісно проживаючих організмів називають:
- а. адаптацією
 - б. стратифікацією
 - в. коадаптацією
 - г. мімікрією
130. Адаптація – це:
- а. вплив сонячної активності на організм
 - б. реакція організму на вплив соціального оточення
 - в. процес пристосування до умов середовища
 - г. нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі
131. Вкажіть, який з абіотичних чинників має вирішальне значення для переходу рослин у стан спокою:
- а. температура повітря
 - б. вологість ґрунту
 - в. рельєф місцевості
 - г. тривалість дня
132. Вкажіть консумента першого порядку в ланцюгу живлення:
- а. кінь
 - б. леопард
 - в. печінковий сисун
 - г. люцерна
133. Закон толерантності В.Шелфорда відображає:
- а. величину витривалості організму до певного екологічного фактору
 - б. відношення організму до сукупності екологічних факторів
 - в. сукупну дію екологічних факторів
 - г. комплементарну дію кліматичних факторів
134. В якій зоні спостерігається чітке зростання екологічних реакцій організму?
- а. песимуму
 - б. комфорту

- в. екологічної валентності
 - г. песимуму й оптимум
135. Який із запропонованих варіантів відповіді відображає хімічний взаємовплив організмів?
- а. коменсалізм
 - б. аменасалізм
 - в. алелопатія
 - г. паразитизм
136. Коменсалізм - це:
- а. форма співжиття особин різних видів, коли один організм виживає за рахунок витрат ресурсів іншого організму
 - б. форма співіснування, коли один організм виживає за рахунок іншого, не завдаючи при цьому йому шкоди
 - в. форма взаємоподавлення організмів
 - г. форма нейтральних взаємовідносин
137. Першим надорганізмовим рівнем організації живої матерії є: } =популяція Біом організм клітина }
140. Вікова структура популяції - це:
- а. закономірне співвідношення різних видів у межах певної території
 - б. співвідношення різних вікових груп особин у популяції
 - в. закономірне співвідношення особин, які розмножуються
 - г. розподіл особин прегнетативної і постгенеративної стадії у популяції
138. Чи можна створити стійкі угруповання з одновікових популяцій одного виду?
- а. ні, неможливо
 - б. можливо тільки за умови їх постійного контролю
 - в. існування популяції тільки одного виду на певній території неможливе
 - г. одновікові популяції властиві тільки агроценозам
139. Яке співвідношення статей властиве живим організмам у природних умовах?
- а. співвідношення статі - індивідуальна ознака виду
 - б. 1♂:3 ♀
 - в. 3♂:1♀
 - г. один до декількох
140. Під статевою структурою популяції розуміють:
- а. співвідношення особин різної статі у популяції
 - б. розподіл особин популяцій різних видів по статі
 - в. розподіл видів по градієнту умов
 - г. закономірне співвідношення різних видів у межах певної території
141. Ким і коли був запропонований термін біоценоз?
- а. К. Мебіусом у 1877 році
 - б. В.Сукачовим у 1947 році
 - в. А.Тенслі у 1927 році
 - г. В.Вернадським у 1925 році
142. Відповідно до структуризації біогеоценозу В.М. Сукачова, сукупність однорідних кліматичних умов називається:
- а. едафотоп
 - б. кліматоп

- в. біотоп
- г. гідротоп

143. Відповідно до структуризації біогеоценозу В.М. Сукачова, сукупність однорідних ґрунтових умов середовища називається:

- а. едафотоп
- б. кліматоп
- в. біотоп
- г. гідротоп

144. Який компонент біоценозу прийнятий за основу класифікації угруповань?

- а. фітоценоз
- б. мікробоценоз
- в. зооценоз
- г. мікоценоз

145. Найвищим рангом у класифікації угруповань є:

- а. асоціація
- б. синюзія
- в. біоценотичний тип
- г. формація

146. Які з нижче перелічених груп організмів можуть утворювати другий трофічний рівень?

- а. первинні консументи
- б. вторинні консументи
- в. первинні продуценти
- г. первинні деструктори

147. Які з нижче перелічених груп організмів можуть утворювати третій трофічний рівень?

- а. первинні консументи
- б. вторинні консументи
- в. первинні продуценти
- г. первинні деструктори

148. Які з нижче перелічених груп організмів можуть утворювати четвертий трофічний рівень?

- а. вторинні консументи
- б. третинні консументи
- в. первинні продуценти
- г. первинні деструктори

149. Які з нижче перелічених організмів утворюють основу ґрунтових редуцентів?

- а. дощові черви
- б. двопарноногі багатоніжки
- в. ногохвістки
- г. гриби

150. Які з нижче перелічених екологічних груп організмів утворюють найнижчий ярус лісового біогеоценозу?

- а. геліофіти
- б. сціофіти
- в. геліофоби
- г. гемерофіли

151. Як називається ділянка розташована на межі двох угруповань?
- а. екотон
 - б. екотоп
 - в. екотип
 - г. еконіша
152. Що зумовлює багатий видовий склад екотонних угруповань?
- а. явище крайового ефекту
 - б. неоднорідність екологічних умов
 - в. різноміття біотичних взаємовідносин
 - г. екотону не властива підвищена чисельність видів
153. Чим відрізняються угруповання одного типу від іншого?
- а. набором видів рослин
 - б. набором видів тварин
 - в. кількістю видів мікроорганізмів
 - г. видовим різноманіттям
154. У яких організмів більш яскраво проявляється екологічна ніша?
- а. тваринних
 - б. рослинних
 - в. мікроорганізмів
 - г. грибів
155. Як називають випадкові зміни кількісних показників, що виникають в угрупованнях?
- а. флуктуація
 - б. сукцесія
 - в. екологічний баланс
 - г. сукцесійні серії
156. Який із запропонованих варіантів відповіді максимально відповідає поняттю "сукцесійні серії"?
- а. послідовні зміни в угрупованнях під дією антропогенних чинників
 - б. послідовні зміни стану біоценозів під дією природних чинників
 - в. зміни, які не пов'язані з історичним розвитком угруповання
 - г. послідовні зміни одного угруповання іншим
157. За яких умов можлива первинна сукцесія?
- а. при появі вільних територій
 - б. за наявності ділянок раніше незайнятих рослинністю
 - в. при різкій зміні кліматичних умов
 - г. при появі нових біотичних умов
158. Які біоценози називаються корінними?
- а. антропогенно порушені угруповання
 - б. угруповання, які історично сформувалися на певній території під впливом однорідних умов
 - в. угруповання помірної зони
 - г. штучно сформовані угруповання
159. При яких умовах можливе повернення порушених угруповань до корінних?

- а. після припинення дії деструктивного чинника
- б. при антропогенному відновленні порушеної екосистеми
- в. спонтанно, без виражених передумов
- г. повернення порушених угруповань до корінних неможливе

160. Двомембранна органела, присутня у більшості клітин еукаріот, яку називають "клітинною електростанцією" тому, що вона перетворює молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ через процес відомий як окисне фосфорилування:

- а. мітохондрія
- б. ендоплазматичний ретикулум
- в. Апарат Гольджі
- г. немає правильної відповіді

161. У рослинній клітині відсутні:

- а. пероксисоми;
- б. ріст шляхом ділення клітин;
- в. клітинний центр;
- г. ріст шляхом розтягування.

162. Рослинній клітині не притаманний:

- а. біосинтез;
- б. хемосинтез;
- в. фотосинтез;
- г. біокаталіз.

163. У рослинній клітині відсутні:

- а. олеосоми;
- б. лейкопласти;
- в. етіопласти;
- г. лейкоцити.

164. У складі мембран не зустрічаються:

- а. вуглеводи;
- б. ферменти;
- в. глікопротеїди;
- г. моноцукри.

165. Рідкий стан бішару мембран забезпечують:

- а. фосфоліпіди;
- б. ненасичені жирні кислоти;
- в. тригліцериди;
- г. насичені жирні кислоти.

166. Мембрани виконують такі функції (знайти помилку):

- а. морфогенетичні;
- б. енергетичні;
- в. електричні;
- г. рецепторно-регуляторні.

167. Протиінфекційний бар'єр клітинної стінки залежить від:

- а. геміцелюлози;
- б. екстенсину;

- в. суберину;
 - г. лектину.
168. Знайти правильний перелік безбарвних пластид:
- а. етіопласт, лейкопласт, пропластида;
 - б. апопласт, пропластида, етіопласт;
 - в. лейкоцит, етіопласт, гранулопласт;
 - г. пропластида, лейкопласт, тонопласт.
169. Знайти правильний перелік безбарвних пластид:
- а. гранулопласти, етіопласти, пропластиди;
 - б. протеїнопласти, пропластиди, етіопласти;
 - в. лейкоцити, етіопласти, олеопласти;
 - г. пропластиди, лейкопласти, амінопласти.
170. У меристемах трапляються пластиди
- а. тонопласт, протеїнопласт;
 - б. апопласт, пропластида;
 - в. лейкопласт, хромопласт;
 - г. пропластида, лейкопласт.
171. У кореневищах трапляються пластиди
- а. хлоропласт;
 - б. апопласт;
 - в. лейкопласт;
 - г. тонопласт.
172. Правильний шлях взаємоперетворення пластид такий
- а. хромопласт у протеїнопласт;
 - б. апопласт у хлоропласт;
 - в. лейкопласт у етіопласт;
 - г. пропластида у лейкопласт.
173. Знайти правильний шлях взаємоперетворення пластид
- а. амілопласт у пропластиду;
 - б. етіопласт у хлоропласт;
 - в. лейкопласт у апопласт;
 - г. протеїнопласт у лейкопласт.
174. Знайти правильний перелік структур хлоропласта
- а. зовнішня й внутрішня мембрани, строма, кристи;
 - б. тилакоїди строми, тилакоїди гран, везикули, матрикс;
 - в. тилакоїди строми й гран, зовнішня й внутрішня мембрани, строма;
 - г. міжмембранний простір, тонопласт, тилакоїди, матрикс.
175. У хромопластах наявні такі пігменти
- а. хлорофіли;
 - б. каротини;
 - в. антоціани;
 - г. меланіни.
176. Рослинні мікротільця – це:

- а. нуклеосоми;
- б. глюкосоми;
- в. олеосоми;
- г. центросоми.

177. Пероксисоми – знаходяться в

- а. листках;
- б. сім'ядолях;
- в. сім'ябруньках;
- г. кореневищах.

178. Гліоксисоми – наявні в

- а. листках;
- б. сім'ядолях;
- в. бульбах;
- г. кореневищах.

179. Структурні компоненти вакуолі

- а. апопласт, вакуолярний сік;
- б. тонопласт, клітинний сік;
- в. етіопласт, строма;
- г. симпласт, вакуолярний сік.

180. рН вакуолярного соку здебільшого має значення

- а. 1-2 одиниць;
- б. 3-4 одиниць;
- в. 5-6 одиниць;
- г. 7-8 одиниць.

181. Вакуолі виконують таку функцію:

- а. осмотичну;
- б. регуляторну;
- в. морфогенетичну;
- г. електрофізіологічну.

182. Функцію автотрофного утворення АТФ у рослинній клітині виконують:

- а. мікротільця;
- б. апарат Гольджі;
- в. мітохондрії;
- г. хлоропласти.

183. Функцію перетворення жирних кислот у цукри в рослинній клітині виконують:

- а. гліоксисоми;
- б. апарат Гольджі;
- в. олеосоми;
- г. олеопласти.

184. Функцію росту розтягуванням в рослинній клітині виконують:

- а. плазмалема;
- б. вакуолі;
- в. цитоскелет;
- г. ендоплазматична сітка.

185. Знайдіть компонент матриксу стінки клітини рослин
- целюлоза;
 - пектин;
 - суберин;
 - кутин.
186. Знайдіть інкрустуючі компоненти оболонки клітини рослин
- целюлоза;
 - пектин;
 - суберин;
 - кутин.
187. До білків клітинної стінки рослин належить:
- екстенсин;
 - пепсин;
 - колаген;
 - тубулін.
188. Оболонки сусідніх клітин рослин скріплюються:
- геміцелюлозою;
 - лігніном;
 - суберином;
 - пектином.
189. Водонепроникність клітинної стінки рослин залежить від:
- целюлози і геміцелюлози;
 - пектинових речовин;
 - суберину і лігніну;
 - лектину і екстенсину.
190. Катіонообмінну здатність клітинних стінок рослин забезпечують
- целюлоза і геміцелюлоза;
 - кутин і віск;
 - суберин і лігнін;
 - лектин і екстенсин.
191. Єдина система клітинних стінок називається
- апопласт;
 - б) тонопласт;
 - в) протопласт;
 - г) симпласт.
192. Функції вегетативного розмноження, фотосинтезу, резервну, опорну та провідну виконують
- стебла;
 - листки;
 - корені;
 - бруньки.
193. Функції вегетативного розмноження, повітряного живлення, запасну, газообміну і транспірації виконують

- а. стебла;
 - б. листки;
 - в. корені;
 - г. бруньки.
194. Складається зі стеблової (конус наростання) й листової (луски) частин
- а. цибулина;
 - б. брунька;
 - в. бульба;
 - г. сімябрунька.
195. Орган покритонасінних рослин, який утворюється після запліднення із зав'язі
- а. насінний зачаток;
 - б. насіння;
 - в. плід;
 - г. квітка.
196. Забезпечують різнонаправленні потоки речовин. Мова йде про
- а. хлоренхіму;
 - б. аеренхіму;
 - в. ендодерму;
 - г. флоему.
197. Способи живлення рослин (знайти помилку):
- а. автотрофне живлення;
 - б. абсорбційне живлення;
 - в. ґрунтове живлення;
 - г. гетеротрофне живлення.
198. Які функціональні системи рослин мають дифузний характер?
- а. рухова система;
 - б. система дихання;
 - в. росту і розвитку;
 - г. транспортування речовин.
199. Знайдіть функціональну систему рослин.
- а. травна система;
 - б. опорно-рухова;
 - в. нервова система;
 - г. видільна система.
200. Закон про те, що організми з широким діапазоном толерантності щодо всіх екологічних факторів найбільш поширені належить:
- а. Пригожин 1876
 - б. Е. Геккель 1866
 - в. М. Реймерс 1907
 - г. Ю. Одум 1907
201. Основоположник вчення про бісферу:
- а. М. Голубець
 - б. Ю. Шеляг-Сосонко

- в. Б. Гаврилишин
- г. В. Вернадський

202. Розділ екології, який вивчає вплив факторів неживої природи на організми називається:
- а. біоценологія
 - б. біогеоценологія
 - в. демекологія
 - г. аутекологія
203. Яка екологічна мережа має також назву "Смарагдова екологічна мережа"?
- а. Панєвропейська екологічна мережа
 - б. Еконет
 - в. Emerald
 - г. Natura 2000
204. Яка документ був прийнятий на Конференції ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро?
- а. Документ щодо охорони басейнових екосистем річки Дунай
 - б. програму дій на 21 століття "Agenda 21"
 - в. програма ООН щодо навколишнього середовища
 - г. програма щодо запобігання нелегальною торгівлею тваринами
205. До якого розділу екології можна віднести вчення про рослинні угруповання?
- а. аутекології
 - б. демекології
 - в. синекології
 - г. Біосферології
206. Які з форм охорони природи відносяться до локального рівня?
- а. заповідники
 - б. урочища
 - в. заказники
 - г. пам'ятки природи
207. Що не є причиною кліматичних змін?
- а. збільшення викидів CO₂ в атмосферу
 - б. використання викопного палива
 - в. танення льодовиків
 - г. поширення генетично модифікованих продуктів
208. Що відбулося в червні 1992 року?
- а. засновано Римський клуб
 - б. проведено Стокгольмську конференцію
 - в. прийнята декларація "Прав тварин"
 - г. проведено конференцію "Сталого розвитку"
209. Який принцип не характерний для систем, які вивчає екологія?
- а. емерджентність
 - б. ієрархічність
 - в. відкритість
 - г. закритість
210. В якому році і ким був запропонований термін "популяція":

- а. К. Шрьотер 1902
- б. В. Йогансен 1903
- в. М. Реймерс 1907
- г. Ю. Одум 1907

211. Яким проблемам присвячена праця Донелла Медоуз і Денніс Медоуз "Межі зростання":

- а. генетично-модифікованим продуктам
- б. населення людей на Землі
- в. зникненню біорізноманіття
- г. рекреаційному навантаженню

212. Який розділ екології вивчає взаємодію особин різних видів між собою і середовищем їх існування в межах локальної екосистеми:

- а. аутокологія
- б. демекологія
- в. синекологія
- г. Біосферологія

213. Яка з екологічних мереж базується на Бернській конвенції:

- а. Панєвропейська екологічна мережа
- б. Європейська екологічна мережа
- в. Emerald
- г. Natura 2000

214. Над якою працею працювали Донелла Медоуз і Денніс Медоуз:

- а. програма "ЮНЕП"
- б. "Agenda 21"
- в. Всесвітня декларація з прав тварин
- г. доповідь "Межі зростання"

215. Картахенський протокол присвячений:

- а. збереженню рідкісних видів
- б. генетично-модифікованим організмам
- в. зміні клімату
- г. захороненню відходів

216. Які форми охорони природи виділяють на локальному рівні

- а. заповідні урочища
- б. національні парки
- в. природні заповідники
- г. регіональні ландшафтні парки

217. Яка різниця між популяцією та ценопопуляцією:

- а. різниці немає
- б. популяція складається з ценопопуляцій
- в. ценопопуляція складається з популяцій
- г. ценопопуляція – це популяція в межах фітоценозу

218. Який із зазначених об'єктів є біосферним резерватом:

- а. Східні Карпати
- б. Галицький національний парк

- в. Дністровський каньйон
- г. Заповідник Горгани

219. Які з рівнів організації живого найчастіше вивчає аутокологія?

- а. клітинний
- б. популяційний
- в. організмний
- г. тканинний

220. Відношення прегенеративних до генеративних особин в популяції це:

- а. індекс заміщення
- б. індекс генерування
- в. індекс відновлення
- г. індекс виживання

221. Формула $se+r+j+im+v$ менше ніж $g_1+g_2+g_3+ss+s$ описує:

- а. динаміку смертності
- б. динаміку виживання
- в. лівобічні вікові спектри в популяції
- г. правобічні вікові спектри в популяції

222. Нормальна повночленна популяція це:

- а. немає правильної відповіді
- б. популяція, у якій народжуваність переважає над вимиранням
- в. популяція у якій співвідношення статей є однаковим
- г. популяція, яка складається з особин усіх вікових станів називається

223. Формула $N_{ab}/(N_a+N_b-N_{ab})$ описує:

- а. Коефіцієнт Жаккара
- б. Індекс Соренсена
- в. Коефіцієнт генерування
- г. Індекс відновлення

224. Структуру рослинних угруповань вивчає підрозділ який називається

- а. синтаксономія
- б. синдинаміка
- в. синморфологія
- г. немає правильної відповіді

225. Група, що включає в себе предкову форму та всіх нащадків називається:

- а. Немає правильної відповіді
- б. Поліфілетична
- в. Монофілетична група
- г. Парафілетична

226. Чотири класи екосистем по відношенню до їх продуктивності виділив:

- а. Whittaker
- б. Urban
- в. WWF
- г. Cronquist

227. Бета-різноманіття це:

- а. різноманіття, яке показує загальну кількість видів для всіх екосистем
 - б. різноманіття, яке показує загальну кількість унікальних видів для порівнюваних екосистем
 - в. різноманіття, яке показує загальну кількість видів унікальних видів для однієї екосистеми
 - г. нема правильної відповіді
228. Формула "видове багатство/середня вирівняність видів в угрупованні" описує:
- а. Індекс відновлення
 - б. Індекс Соренсена
 - в. Індекс Віттекера
 - г. Індекс життєздатності
229. За яким принципом обирають кінцеву кладограму (філогенетичне дерево):
- а. за принципом толерантності
 - б. за принципом емерджентності
 - в. за принципом парсимонії
 - г. за принципом ієрархічності
230. Лінійно-кумулятивна модель розвитку характерна для:
- а. неklasичних наук
 - б. постнеklasичних наук
 - в. класичних наук
 - г. жодної правильної відповіді
231. Злобін Юліан Андрійович розробив:
- а. аналіз структури популяцій
 - б. аналіз життєвості популяцій
 - в. аналіз динаміки популяцій
 - г. аналіз стратегій популяцій
232. Сукупність властивостей, ознак і зв'язків, що забезпечують притаманну популяції здатність підтримувати рівень системної організації, необхідний для відновлення, розселення та еволюції це:
- а. буферність популяції
 - б. комплексність популяції
 - в. життєздатність популяції
 - г. стратегія популяції
233. Формула " $v+g_1+g_2+g_3+ss+s$ " описує:
- а. молоді особини
 - б. дорослі особини
 - в. старіючі особини
 - г. генеративні особини
234. Регресивна популяція це:
- а. Популяція, яка складається з молодих прегенеративних особин
 - б. Популяція, яка складається зі старих постгенеративних особин
 - в. Популяція, яка складається з особин усіх вікових груп
 - г. нема правильної відповіді
235. Наука про самоорганізуючі та саморегулюючі системи це:

- а. екологія
- б. системологія
- в. синергетика
- г. немає правильної відповіді

236. Плезіоморфна ознака:

- а. наявна як у кореневого виду, так і у його нащадків
- б. наявна тільки у пізніх нащадків
- в. характерна для монофілетичної групи і при цьому є відмінною ознакою від інших споріднених груп.
- г. нема правильної відповіді

237. Відношення генеративних до дорослих особин називається:

- а. коефіцієнтом генерування
- б. коефіцієнтом відновлення
- в. коефіцієнтом спорідненості
- г. коефіцієнтом життєздатності

238. Карл Поппер...

- а. вніс принцип емерджентності
- б. вніс принцип мінімуму речовин і енергії
- в. вніс принцип фальсифікації
- г. вніс принцип обмеженості біологічних систем

239. Як називається розділ екології, який досліджує глобальну екосистему Землі:

- а. аутокологія
- б. демекологія
- в. синекологія
- г. біосферологія

240. Водорозчинні вітаміни:

- а. Накопичуються в тканинах, їх дефіцит зустрічається дуже часто
- б. Більш токсичні, ніж жиророзчинні
- в. За функціями схожі на стероїдні гормони
- г. Майже не накопичуються, малотоксичні, їх дефіцит зустрічається часто

241. Вітамін D є:

- а. Жиророзчинним, входить до складу родопсину, посилює синтез глікопротеїнів в мембранах клітин
- б. Водорозчинним, входить до складу ферментів оксидаз і дегідрогеназ
- в. Водорозчинним, бере участь в реакціях перетворення нуклеотидів
- г. Жиророзчинним, бере участь у синтезі гормону, що регулює обмін кальцію і фосфору

242. При нестачі вітаміну B1 в організмі розвивається захворювання:

- а. Цинга
- б. Бері-бері
- в. Пелагра
- г. Куряча сліпота

243. Хітин – це: =Азотовмісний полісахарид Азотовмісний моносахарид Інша назва целюлози Група ліпідів } 247. Олігосахариди являють собою органічні сполуки:

- а. Не здатні до гідролізу
- б. Гідролізуються з утворенням від двох до десяти амінокислот
- в. Гідролізуються з утворенням від двох до десяти моносахаридних залишків
- г. Гідролізуються з утворенням спирту і жирних кислот

244. У процес гліколізу можуть включатись всі моносахариди, окрім:

- а. Глюкози
- б. Галактози
- в. Фруктози
- г. Рибози

245. Місцем локалізації ансамблю ферментів, що забезпечують спряження окислення з фосфорилуванням є:

- а. Мітохондрії
- б. Лізосоми
- в. Пероксисоми
- г. Рибосоми

246. Пентозофосфатний шлях відбувається у:

- а. Цитозолі
- б. Ядрі
- в. Лізосомах
- г. Комплексі Гольджі

247. До складних білків належать:

- а. Альбуміни
- б. Гемоглобін
- в. Холестерол
- г. Актиноміцин

248. Які зв'язки стабілізують третинну структуру білків ?

- а. Водневі
- б. Пептидні
- в. Глікозильні
- г. Гідрофобні

249. До позитивно-заряджених амінокислот належать:

- а. Аланін
- б. Лізин
- в. Глутамінова кислота
- г. Триптофан

250. Стеаринова кислота містить атомів вуглецю:

- а. 16
- б. 17
- в. 18
- г. 19

251. Які жири є важливим компонентом деяких статевих гормонів, гормонів кори наднирників?

- а. Фосфоліпіди
- б. Жири

- в. Воски
- г. Стероїди

252. Що таке ізоелектрична точка?

- а. Здатність білків розсіювати промені світла
- б. Значення рН при якому сумарний заряд в молекулі дорівнює нулю
- в. Здатність проявляти і кислотні і лужні властивості
- г. Наявність гідрофобної і гідрофільної ділянок

253. Здатність молекул білка з'єднуватися з іншими речовинами і переносити їх в клітині чи організмі лежить в основі функції:

- а. Транспортної
- б. Каталітичної
- в. Сигнальної
- г. Енергетичної

254. Яка із зазначених властивостей не характерна для більшості білків:

- а. Денатурація
- б. Термостабільність
- в. Амфотерність
- г. Здатність утворювати колоїдні розчини

255. Спільними властивостями ферментів і неорганічних каталізаторів є:

- а. Термолабільність
- б. Каталіз лише термодинамічно можливих реакцій
- в. Специфічність дії
- г. Незалежність від кількості субстрату

256. Активатором пепсину є:

- а. Жовчні кислоти
- б. Ентерокіназа
- в. HCl
- г. НАДФ

257. До ліпідів належать:

- а. Трипсин
- б. Фосфатидилхолін
- в. Глікоген
- г. Глюкагон

258. Трипсин забезпечує розщеплення

- а. Вуглеводів
- б. Ліпідів
- в. Білків
- г. ДНК

259. До складу РНК не входить:

- а. Тимін
- б. Аденін
- в. Гуанін
- г. Урацил

260. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює:
- а. Тиміну
 - б. Гуаніну
 - в. Цитозину
 - г. Ксантину
261. З якою сполукою цитозин з'єднується водневими зв'язками?
- а. Аденін
 - б. Гуанін
 - в. Урацил
 - г. Гіпоксантин
262. Скільки водневих зв'язків утворюється між аденіном і тиміном?
- а. 2
 - б. 5
 - в. 3
 - г. 10
263. Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном?
- а. 2
 - б. 3
 - в. 5
 - г. 15
264. Глутамат синтезується шляхом амінування
- а. Альфа-кетоглутарату
 - б. Оксалоацетату
 - в. Пірувату
 - г. Сукцинату
265. ДНК еукаріотів відрізняється від прокаріотичної
- а. Зв'язаністю з білками гістонами
 - б. Принципом комплементарності
 - в. Одноланцюговістю
 - г. Наявністю азотистої основи урацилу
266. Реалізацію спадкової інформації в клітині завершує процес:
- а. Трансляції
 - б. Транскрипції
 - в. Репарації
 - г. Реплікації
267. Нуклеїнові кислоти – лінійні полімери, в яких нуклеотидні залишки з'єднані між собою за допомогою:
- а. Водневих зв'язків
 - б. Іонних зв'язків
 - в. 3'-5'-фосфодієфірних зв'язків
 - г. Глікозидних зв'язків
268. До жиророзчинних вітамінів належить:

- а. С
- б. РР
- в. К
- г. В1

269. До негенетичних взаємодій вірусів належать:

- а. Інтерференція
- б. Перекомбінація генів
- в. Трансформація
- г. Рекомбінація

270. Кубічний тип симетрії характерний для капсидів:

- а. Вірусу натуральної віспи
- б. Вірусу сказу
- в. Вірусу тютюнової мозаїки
- г. Вірусу герпесу

271. Яке з тверджень про віруси є правильним:

- а. До складу віріону входить ДНК і РНК
- б. Носієм генетичної інформації у вірусів є тільки ДНК
- в. Віріон містить або РНК, або ДНК
- г. Носієм генетичної інформації у вірусів є тільки ДНК

272. Віруси, які уражають бактерії, називаються

- а. Фагами
- б. Онковірусами
- в. Ретровірусами
- г. РНК-геномними вірусами

273. Для будови позаклітинної форми вірусів (віріона) характерно:

- а. Наявність ядра
- б. Кубічний або спіральний тип симетрії
- в. Наявність третинних оболонок
- г. Відсутність білкової оболонки

274. Віруси отримують енергію для біосинетичних процесів

- а. Шляхом фотосинтезу
- б. Шляхом анаеробного дихання
- в. Використовуючи ресурси клітини
- г. Використовуючи власні запасні речовини

275. До складу складних вірусів не входить

- а. Хітин
- б. Білок
- в. Нуклеїнова кислота
- г. Ліпіди

276. Фермент зворотна транскриптаза виявлений у

- а. Вірусу грипу
- б. Вірусу герпесу
- в. Ретровірусів
- г. Вірусу сказу

277. Віруси проникають у клітину
- Через іонні канали
 - За участю пермеаз
 - Шляхом рецепторного ендоцитозу
 - Шляхом утворення пор у клітинній мембрані
278. Ураження рослин викликає:
- Вірус грипу
 - ВІЛ
 - Вірус сказу
 - Вірус тютюнової мозаїки
279. Ознакою неживого у вірусів є
- Наявність ядра
 - Наявність цитоплазми
 - Неклітинна будова
 - Відсутність джгутиків
280. Потрапляючи в організм, віруси розмножуються в
- Міжклітинній рідині
 - У цитоплазмі клітини
 - У мітохондріях клітини
 - У вакуолях клітини
281. Пріони - це
- Патогенні гриби
 - Патогенні агенти білкової природи
 - Патогенні віруси
 - Патогенні бактерії
282. Стійкий імунітет не формується після таких вірусних захворювань
- Вітрянка
 - Краснуха
 - Кір
 - ВІЛ
283. Яка з перелічених хвороб є вірусною?
- Гонорея
 - Поліомієліт
 - Холера
 - Базедова хвороба
284. За структурою віруси – це
- Особливий тип клітин
 - Прокаріоти
 - Еукаріоти
 - Молекула нуклеїнової кислоти з'єднана з білком
285. Віруси не мають
- Геному
 - Метаболізму

- в. Білків
 - г. Нуклеїнових кислот
286. Які з перелічених захворювань не є вірусними?
- а. Свинка
 - б. Ангіна
 - в. Грип
 - г. Кір
287. Хронічні інфекції викликає збудник
- а. Вітрянки
 - б. Гепатиту Б
 - в. Грипу
 - г. Кору
288. Що з переліченого не можна використовувати для профілактики вірусних захворювань?
- а. Щеплення
 - б. Імуностимулятори
 - в. Загартовування
 - г. Антигени
289. Білкова оболонка вірусів називається
- а. Капсид
 - б. Суперкапсид
 - в. Глікопротеїн
 - г. Віріон
290. Яке з наведених тверджень є неправильним?
- а. Вірус – це неклітинна форма життя
 - б. Віруси розмножуються шляхом поділу
 - в. Віруси розмножуються у чутливих клітинах
 - г. Віруси не ростуть
291. В яких з перелічених об'єктів чи середовищ віруси не культивуються?
- а. Культури клітин
 - б. Миші
 - в. Курячі ембріони
 - г. Складні живильні середовища
292. Повітряно-крапельним шляхом передаються усі віруси, окрім збудників
- а. Гепатиту Б
 - б. Грипу
 - в. Вітрянки
 - г. Паротиту
293. Щорічно епідемії спричинює збудник
- а. Сказу
 - б. Грипу
 - в. Цукрового діабету
 - г. Базедової хвороби
294. До складу вірусу входять всі макромолекули, окрім

- а. Нуклеїнові кислоти
 - б. Білки
 - в. Ліпіди
 - г. Органічні кислоти
295. Утворення пухлин можуть викликати
- а. Віруси грипу
 - б. Ретровіруси
 - в. РНК-геномні віруси
 - г. Риновіруси
296. Стійкість вірусів до хімічних противірусних препаратів пов'язана з
- а. Виникненням мутацій
 - б. Синтезом вірусів специфічних вуглеводів
 - в. Здатністю до аглютинації
 - г. Здатністю до агрегації
297. При роботі з ґрунтом та наявності поранень у шкірі можна заразитися збудником
- а. Коклюшу
 - б. ВІЛ
 - в. Сказу
 - г. Правця
298. До складу клітинної стінки бактерій входить
- а. Муреїн
 - б. Хітин
 - в. Глікоген
 - г. Целюлоза
299. Грам-негативні та грам-позитивні бактерії відрізняються за
- а. Наявністю ядра
 - б. Будовою клітинної стінки
 - в. Будовою плазматичної мембрани
 - г. Наявністю капсули
300. Джгутики у бактерій виконують роль
- а. Фактора розмноження
 - б. Орган живлення
 - в. Орган захисту
 - г. Орган руху
301. Антибіотики - це
- а. Препарати проти вірусів
 - б. Біодобавки
 - в. Імуностимулятори
 - г. Препарати проти бактерій
302. Антибіотики здатні продукувати
- а. Пеніцил
 - б. Дріжджі
 - в. Кишкова паличка
 - г. Хлорела

303. Виробництво вина ґрунтується на процесі
- Молочно-кислого бродіння
 - Спиртового бродіння
 - Масляно-кислого бродіння
 - Фотосинтезу
304. Асиміляцію атмосферного азоту здійснюють
- Зелені водорості
 - Мохи
 - Бульбочкові бактерії
 - Лишайники
305. Бактерії гниття
- Асимілюють атмосферний азот
 - Розкладають відмерлі рештки тварин та рослин
 - Є джерелом неорганічних речовин
 - Мають зелений колір
306. До об'єктів мікробіології належать
- Сфагнум
 - Конюшина
 - Хламідомонада
 - Білий гриб
307. До цвілевих грибів відноситься
- Мукор
 - Анабена
 - Дріжджі
 - Збудник тифу
308. Молочно-кислі бактерії беруть участь у
- Виробництві пива
 - Виробництві хліба
 - Виробництві йогуртів
 - Виробництві оцту
309. Синтез органічних речовин з використанням енергії неорганічних речовин називається
- Фотосинтезом
 - Циклом Кребса
 - Циклом Кальвіна
 - Хемосинтезом
310. До методів стерилізації належить
- Пастеризація
 - Реінкарнація
 - Реплікація
 - Транскрипція
311. До патогенних організмів, які передаються із забрудненою водою, належать
- Збудник туберкульозу
 - Збудник холери

- в. Збудник грипу
- г. Збудник вітрянки

312. Які з перелічених хвороб є бактеріальними?

- а. Гонорея
- б. Поліомієліт
- в. Цукровий діабет
- г. Базедова хвороба

313. Який вуглевод використовується як основне джерело енергії для гетеротрофних мікроорганізмів?

- а. Глікоген
- б. Целюлоза
- в. Глюкоза
- г. Ксилоза

314. Бактерії розмножуються, як правило,

- а. Мейозом
- б. Бінарним поділом
- в. Мітозом
- г. Цистами

315. Несприятливі умови бактерії переживають у формі

- а. Вегетативних клітин
- б. Генеративних клітин
- в. Спор
- г. Хламідій

316. Плазматична мембрана бактерій

- а. Відрізняється за будовою від плазматичної мембрани еукаріотів
- б. Складається з вуглеводів
- в. Не містить ліпідів
- г. Представлена ліпідним бішаром із зануреними у нього білками

317. До органел прокаріотичної клітини належать

- а. Мітохондрії
- б. Рибосоми
- в. Ядро
- г. Лізосоми

318. Патогенні для людини мікроорганізми найкраще розвиваються при температурі

- а. 65°C
- б. 37°C
- в. 0°C
- г. 15°C

319. До патогенних мікроорганізмів належить

- а. Хлорела
- б. Хламідомонада
- в. Хламідія
- г. Хризантема

320. Космічною водорістю називають
- а. Ульвокс
 - б. Хлорелу
 - в. Анабену
 - г. Кишкову паличку
321. "Цвітіння води" - це
- а. Масове розмноження синьо-зелених водоростей
 - б. Масове розмноження водяних квіткових рослин
 - в. Масове осідання тополиного пуху на водойми
 - г. Розлив нафти у водойми
322. Для стерилізації приміщень найчастіше використовують
- а. Фільтрування
 - б. Пастеризацію
 - в. Ультрафіолет
 - г. Кип'ятіння
323. Бактерії здатні використовувати у біосинтетичних процесах енергію окислення таких неорганічних речовин
- а. Хлору
 - б. Феруму
 - в. Гелію
 - г. Кадмію
324. Індикатором забрудненості води є
- а. Молочно-кислі бактерії
 - б. Збудник дифтерії
 - в. Кишкова паличка
 - г. Сінна паличка
325. Мінімальні розміри мікроорганізмів, достатні для підтримання клітинної структури і забезпечення метаболізму:
- а. 50-60 нм
 - б. 0,5-10 мкм
 - в. 120-150 нм
 - г. 5-10 нм
326. Для хімічної стерилізації, як правило, застосовують:
- а. Мембранні фільтри
 - б. Ультрафіолет
 - в. Етиловий спирт
 - г. Озонування
327. Симбіонтами лишайників є...
- а. Гриби і мохи
 - б. Гриби і водорості
 - в. Водорості і мохи
 - г. Мохи та інфузорії
328. Внутрішньоклітинним паразитом є...

- а. Фітофтора
 - б. Ентомофтора
 - в. Сапролегнія
 - г. Синхітрій
329. Гриби, що живляться виключно відмерлою органікою, називаються...
- а. Облігатними паразитами
 - б. Факультативними паразитами
 - в. Облігатними сапротрофами
 - г. Факультативними сапротрофами
330. Вегетативне тіло Базидіомікозових грибів представлено...
- а. Таломом
 - б. Міцелієм
 - в. Плазмодієм
 - г. Окремими клітинами
331. Шапкові гриби належать до відділу...
- а. Оомікозові гриби (Oomycota)
 - б. Базидіомікозові гриби (Basidiomycota)
 - в. Хітридіомікозові гриби (Chytridiomycota)
 - г. Зигомікозові гриби (Zygomycota)
332. Предками вищих рослин були:
- а. Бурі водорості
 - б. Зелені водорості
 - в. Червоні водорості
 - г. Діатомові водорості
333. Велика кількість тичинок і маточок характерна для родини...
- а. Губоцвіті (Lamiaceae)
 - б. Хрестоцвіті (Brassicaceae)
 - в. Пасльонові (Solanaceae)
 - г. Розові (Rosaceae)
334. Як називають зовнішню оболонку мікроспори Голонасінних:
- а. епідерма
 - б. екзина
 - в. інтина
 - г. екзодерма
335. Який вид сосни занесений до Червоної книги України:
- а. сосна кедрова
 - б. сосна гірська
 - в. сосна жовта
 - г. сосна звичайна
336. Першими наземними рослинами були представники відділу:
- а. Polypodiophyta
 - б. Lycopodiophyta
 - в. Rhyniophyta
 - г. Pinophyta

337. Наука, що вивчає відділ Мохоподібні, називається:
- а. ліхенологія
 - б. бріологія
 - в. птеридологія
 - г. мохологія
338. Для родини Хрестоцвіті характерні такі типи плодів:
- а. стручок, стручечок
 - б. ягода, коробочка, стручок
 - в. біб, коробочка, листянка
 - г. стручок, качан, коренеплід
339. Для роду Шипшина характерними ознаками є:
- а. парноперисті листки, плід ягода
 - б. трійчастолопатеві листки, плід ягода
 - в. тричі-перисторозсічені листки, плід двосім'янка
 - г. непарноперисті листки, плід збірний горішок
340. До родини Бобові (Fabaceae) належить:
- а. гірчак звичайний (*Polygonum aviculare*)
 - б. буряк звичайний (*Beta vulgaris*)
 - в. конюшина лучна (*Trifolium pratense*)
 - г. морква дика (*Daucus carota*)
341. Для роду горошок (*Vicia*) характерна наявність:
- а. актиноморфних п'ятичленних квіток і човникоподібного віночка
 - б. зигоморфних п'ятичленних квіток, метеликоподібного віночка
 - в. зигоморфних тричленних квіток, метеликоподібного віночка
 - г. актиноморфних тричленних квіток, човникоподібного віночка
342. Для картоплі характерна наявність алкалоїду:
- а. нікотину
 - б. соланіну
 - в. скополіну
 - г. атропіну
343. У представників родини Складноцвіті (Asteraceae) тип плоду:
- а. коробочка
 - б. зернівка
 - в. листянка
 - г. сім'янка
344. Для родини Лілійні властиві ознаки:
- а. зигоморфна подвійна оцвітина, наявність цибулини
 - б. зигоморфна проста оцвітина, наявність кореневища
 - в. актиноморфна проста оцвітина, наявність цибулини
 - г. актиноморфна подвійна оцвітина, наявність кореневища
345. У Синьо-зелених водоростей (Cyanophyta) наявні такі органели:
- а. хлоропласти
 - б. рибосоми

- в. мітохондрії
 - г. ядро
346. Вегетативне тіло грибів називають:
- а. гриб
 - б. талом
 - в. міцелій
 - г. плазмодій
347. У водоростей кокоїдним називають наступний тип структури вегетативного тіла:
- а. одноклітинна водорість із джгутиками, стигмою і скоротливими вакуолями
 - б. багатоклітинна водорість у вигляді розгалуженого кущика
 - в. одноклітинна нерухома водорість з щільною оболонкою
 - г. багатоклітинна нитчаста водорість
348. Жовті фотосинтетичні пігменти водоростей належать до групи:
- а. хлорофіли
 - б. ксантофіли
 - в. фікобіліни
 - г. фікоціаніни
349. Який відділ водоростей належить до прокаріотів:
- а. Зелені водорості (Chlorophyta)
 - б. Бурі водорості (Phaeophyta)
 - в. Жовто-зелені водорості (Xanthophyta)
 - г. Синьо-зелені водорості (Cyanophyta)
350. До відділу Аскомікотові гриби (Ascomycota) належить рід:
- а. Болетус (Boletus)
 - б. Фітофтора (Phytophthora)
 - в. Ріжки (Claviceps)
 - г. Ольпідій (Olpidium)
351. Клітини з кремнієвим панциром характерні для відділу:
- а. Діатомові водорості (Bacillariophyta)
 - б. Бурі водорості (Phaeophyta)
 - в. Червоні водорості (Rhodophyta)
 - г. Жовто-зелені водорості (Xanthophyta)
352. Екологічна система до складу якої входять усі популяції певного угруповання і перебувають між собою в екологічних зв'язках називається:
- а. моноцен
 - б. демоцен
 - в. плеоцен
 - г. поліцен
353. Оберіть вірно побудований ієрархічний ряд організмів систем у біосфері:
- а. організм → популяція → біом → біоценоз → біосфера
 - б. організм → популяція → вид → біоценоз → біом → біосфера
 - в. популяція → вид → біом → біогеоценотичний комплекс → біосфера
 - г. організм → популяція → біом → вид → біосфера

354. Системний підхід в екології заснований:
- а. Л. фон Бергаланфі
 - б. А. Лоткою
 - в. Дж. Хакслі
 - г. Е. Геккелем
355. Яке із запропонованих визначень не відповідає терміну "екологічна толерантність"?
- а. стійкість живих організмів до дії факторів середовища
 - б. діапазон між екологічним мінімумом і максимумом
 - в. екологічна валентність виду, зумовлена його пристосувальною здатністю
 - г. життєва форма, яка визначається систематичним положенням виду.
356. Глибоководні живі організми можна віднести до групи:
- а. евритермних еврибатних
 - б. евритермних стенобатних
 - в. стенотермних стенобатних
 - г. стенотермних еврибатних
357. У відповідності до класифікації екологічних факторів Мончадського зміна пір року належить до групи:
- а. первинно періодичних
 - б. вторинно періодичних
 - в. умовно важливих
 - г. другорядних
358. Діапазон умов, у межах яких може існувати вид за відсутності конкурентного середовища називається:
- а. фундаментальною екологічною нішею
 - б. реалізованою екологічною нішею
 - в. функціональною екологічною нішею
 - г. постконкурентною екологічною нішею
359. До абіотичних екологічних чинників відносяться:
- а. ґрунтова волога, повітря і підстилаючи гірські породи
 - б. фітоценози, що визначають хід біологічної продуктивності
 - в. ґрунти, включаючи ґрунтових мікроорганізмів і ґрунтову вологу
 - г. сонячна радіація і продуценти, що використовують її для виробництва біомаси
360. Біотичний потенціал популяції відображає:
- а. експоненціальна крива
 - б. логістична крива
 - в. s-подібна крива
 - г. синусоїда
361. Стратегія розвитку, при якій відбір спрямований на імовірність виживання окремих особин це:
- а. r - стратегія
 - б. T - стратегія
 - в. K - стратегія
 - г. L – стратегія
362. Яка із зазначених характеристик не відноситься до популяцій:

- а. дискретна форма існування
- б. атрибут живої матерії
- в. нездатність до самопідтримки
- г. сукупність особин одного виду

363. Група особин деякої популяції, яка не має змоги розмножуватись на даній території називається:

- а. локальна популяція
- б. елементарна популяція
- в. ценопопуляція
- г. псевдопопуляція

364. Популяція, в якій виразно виявляється відмінність життєвих вимог у різних фазах життєвого циклу, а окремі особини займають різне місце у природі називається:

- а. геміпопуляція
- б. ценопопуляція
- в. елементарна популяція
- г. псевдопопуляція

365. Поступовий розвиток біоценозів у напрямку зростаючої стабілізації системи називається:

- а. екологічною сукцесією
- б. екологічним континуумом
- в. екотоном
- г. клімаксом

366. Організми, які використовують для споживання готові органічні речовини представлені:

- а. продуцентами і деструкторами
- б. редуцентами і автотрофами
- в. автотрофами і консументами
- г. консументами і деструкторами

367. Однорідні рослинні угруповання, які не залежать від складу рослинності і регулюються макрокліматом називаються:

- а. екосистемами
- б. біомами
- в. синузіями
- г. консорціями

368. Кінцева відносно стійка фаза природного розвитку екосистеми, яка максимально відповідає екологічним характеристикам місцевості у певний період називається:

- а. сукцесією
- б. клімаксом
- в. екотоном
- г. крайовим ефектом

369. Що таке біологічна продуктивність?

- а. загальна кількість біомаси, що виробляється угрупованням або популяцією за одиницю часу на одиниці площі
- б. темпи розвитку будь-якого організму, залежно від умов його місцеперебування
- в. функціонування трофічного ланцюга екосистеми або ландшафту
- г. загальна кількість енергії, яка засвоюється консументами угруповання

370. У чому полягає принцип виключення Г.Ф. Гаузе?
- а. два види не можуть займати один ареал, якщо їхні екологічні потреби ідентичні
 - б. неможливий розвиток екосистем при надмірному техногенному тиску
 - в. sukcesія не може протікати в умовах дефіциту вологи або сонячної енергії
 - г. екосистема не досягне клімаксного стану в разі деструктивної sukcesії
371. Горизонтальна структуризація біосфери розпочинається з:
- а. біому
 - б. синузії
 - в. біогеоценотичного комплексу
 - г. біогеоценозу
372. Верхня межа біосфери зумовлена:
- а. низькими температурами, при яких порушується нормальний хід ферментативних процесів
 - б. нестачею кисню та вуглекислого газу
 - в. наявністю короткохвильового ультрафіолетового випромінювання
 - г. дефіцитом вологи у верхніх шарах атмосфери
373. Нижня межа біосфери зумовлена:
- а. нестачею оксисену
 - б. надвисокими температурами, при яких відбувається денатурація білка
 - в. надлишком вуглекислоти
 - г. надвисокими тисками глибин Землі
374. Відкриття збудника туберкульозу належить:
- а. І. Мечникову
 - б. А. Флемінгу
 - в. Р. Коху
 - г. Д. Заболотному
375. Для стерилізації бактеріологічних петель, як правило, застосовують:
- а. Автоклавування
 - б. Фламбування
 - в. Протирання спиртом
 - г. Пастеризацію
376. Стафілококи – це:
- а. Бактерії, які внаслідок поділу клітин у одній площині утворюють різної довжини ланцюжки
 - б. Коки, що мають форму правильної кулі
 - в. Подвійні коки
 - г. Скупчення коків у вигляді грон винограду
377. Психрофіли – це:
- а. Мікроорганізми, що розвиваються при 0-20вС
 - б. Мікроорганізми, що розвиваються при 25-37МС
 - в. Мікроорганізми, що розвиваються при 35-45МС
 - г. Мікроорганізми, що розвиваються при 45-65МС
378. Основною характеристикою lag-фази є:

- а. Загальна кількість клітин мікроорганізмів у культурі перестає збільшуватись. Кількість нових клітин дорівнює кількості відмерлих
 - б. Висока швидкість відмирання клітин, зумовлена істотним погіршенням якості живильного середовища
 - в. Триває від початку посіву до моменту, коли мікроорганізми починають активно розмножуватись. У цій фазі кількість клітин не змінюється, в цей період вони адаптуються до нових умов, в які їх помістили
 - г. Триває від початку посіву до етапу відмирання клітин
379. Як джерело енергії оцтово-кислі бактерії використовують:
- а. Етанол
 - б. Оцтову кислоту
 - в. Молочну кислоту
 - г. Глюкозу
380. Літотрофами називаються:
- а. Мікроорганізми, для яких донорами електронів є неорганічні речовини
 - б. Мікроорганізми, для яких джерелом енергії є органічні речовини
 - в. Мікроорганізми, які здатні самостійно синтезувати фактори росту
 - г. Мікроорганізми, які здійснюють кілька типів живлення
381. Ауксотрофними називаються:
- а. Мікроорганізми, для яких донорами електронів є неорганічні речовини
 - б. Мікроорганізми, які здатні самостійно синтезувати фактори росту
 - в. Мікроорганізми, які здійснюють кілька типів живлення
 - г. Мікроорганізми, які нездатні до росту на середовищі, в якому відсутній певний фактор росту і який треба додавати в середовище
382. Механізм антибіотичної дії пеніциліну полягає у:
- а. Інгібуванні реплікації ДНК через зв'язування з бактеріальною ДНК-полімеразою
 - б. Специфічному зв'язуванні зі стеринними компонентами плазматичної мембрани бактерій і збільшенні її проникності
 - в. Інгібуванні утворення клітинної стінки шляхом блокування утворення поперечних зшивок у пептидоглікані
 - г. Блокуванні біосинтезу білка шляхом зв'язування з 30S субодиницею рибосом бактерій
383. До спірохет належить:
- а. Збудник гонореї
 - б. Збудник правця
 - в. Збудник сифілісу
 - г. Збудник туберкульозу
384. Структурною одиницею пептидоглікану є
- а. N-ацетилглюкозамін
 - б. N-ацетилмуранова кислота
 - в. N-ацетилглюкозамін та N-ацетилмуранова кислота, з'єднані $\beta(1,4)$ -зв'язком
 - г. N-ацетилглюкозамін та рибітолтейхоєва кислота
385. В утворенні швейцарського сиру беруть участь
- а. Пропіоновокислі бактерії
 - б. Молочнокислі бактерії

- в. Маслянокислі бактерії
 - г. Пекарські дріжджі
386. Патогенними мікроорганізмами є
- а. *Azotobacter chroococum*
 - б. *Treponema pallidum*
 - в. *Saccharomyces cerevisiae*
 - г. *Bacillus subtilis*
387. Хто відкрив явище хемосинтезу?
- а. Л. Пастер
 - б. М. Гамалія
 - в. С. Виноградський
 - г. М. Беєрік
388. Хто відкрив антибіотики?
- а. Ф. д'Еррель
 - б. Л. Пастер
 - в. Р. Кох
 - г. А. Флемінг
389. До метаморфозів кореня відносимо:
- а. цибулини
 - б. кореневі бульби
 - в. лусочки
 - г. кореневище
390. Флоема та ксилема утворюють:
- а. радіальний пучок
 - б. зону ділення
 - в. зону розтягування
 - г. міжвузля
391. Безлисте стебло, яке завершується квіткою називається:
- а. соломину
 - б. початок
 - в. верхівкове
 - г. стрілка
392. За напрямком росту стебла бувають:
- а. лежачі
 - б. стоячі
 - в. виткі
 - г. підперті
393. Якою тканиною оточені судинно-волокнисті пучки в стовбурах?
- а. провідною
 - б. покривною
 - в. видільною
 - г. механічною
394. Ризодерма – це...:

- а. поверхневий шар первинної кори без корневих волосків
 - б. поверхневий шар вторинної кори з корневими волосками
 - в. поверхневий шар первинної кори з корневими волосками
 - г. шар клітин, яким починається центральний циліндр
395. Вкажіть характерну ознаку всіх видів водоростей:
- а. одноклітинність
 - б. розмноження спорами
 - в. здатність до фотосинтезу
 - г. наявність червоних та бурих пігментів
396. Вкажіть чим може бути представлене тіло водоростей:
- а. ризоїдом
 - б. коренем та пагоном
 - в. міцелієм
 - г. сланню
397. Вкажіть, що називається улотриксом:
- а. морська бура водорість, зі сланню, що нагадує листки
 - б. одноклітинна зелена водорість
 - в. червона водорість
 - г. ниткоподібна зелена водорість з ризоїдом
398. Визначте, як називається та частина гриба, яку людина вживає в їжу:
- а. плодове тіло
 - б. грибниця
 - в. міцелій
 - г. мікориза
399. Назвіть, з чого складається вегетативне тіло гриба:
- а. гіфів
 - б. тканин, подібних до рослинних
 - в. фотосинтезуючих клітин
 - г. тканин, подібних до тваринних
400. Як називається тіло лишайника:
- а. міцелій
 - б. слань
 - в. стебло
 - г. мікориза
401. Вкажіть, на які групи поділяються лишайники за формою тіла:
- а. накипні
 - б. листоваті
 - в. кущисті
 - г. усі відповіді вірні
402. Зазначте назву грибного компонента лишайника:
- а. грибниця;
 - б. мікобіонт;
 - в. фікобіонт;
 - г. міцелій;

403. Назвіть царство живих організмів, до якого належать водорості:
- а. Рослини
 - б. Гриби
 - в. Тварини
 - г. Дроб'янки
404. Вкажіть водорість, яка може поглинати з води розчинені органічні речовини, а тому використовується у біологічному очищенні забруднених вод:
- а. меридіан
 - б. хламідомонада
 - в. улотрикс
 - г. цистозейра
405. Вкажіть назву екологічної групи водоростей, котрі мають дрібні розміри і знаходяться у завислому стані в товщі води:
- а. едафітон
 - б. планктон
 - в. бентос
 - г. аерофітон
406. Мікориза – це взаємовигідне співіснування:
- а. міцелію грибів з коренями вищих рослин
 - б. міцелію нижчих грибів з зеленими водоростями
 - в. бульбочкових бактерій з коренями бобових рослин
 - г. синьо-зелених і зелених водоростей та грибів
407. Яку фізіологічну функцію виконують у листках рослин продихи?
- а. захист від пошкодження
 - б. захист від впливу токсикантів
 - в. накопичення поживних речовин
 - г. газообмін та транспірація
408. За яку з перерахованих нижче функцій відповідає такий структурний компонент листка, як флоема?
- а. захист листка і сповільнення процесу втрати води
 - б. надходження повітря з атмосфери в листок
 - в. транспорт води зі стебла в листок
 - г. транспорт поживних речовин з листка в інші частини рослини
409. Продихи на листках розміщені на :
- а. завжди на нижній поверхні
 - б. завжди на верхній поверхні
 - в. лише на нижній або верхній поверхні
 - г. як на нижній, так і на верхній поверхні залежно від виду рослини
410. Стебло рослин - це...:
- а. основа рослини, яка складається із стеблової частини, бруньок і листків
 - б. частина рослин, яка повністю розміщена над ґрунтом
 - в. осьова частина пагона
 - г. частина кореневища
411. Головним пагоном називають :

- а. стовбур дерева і скелетну гілку куща
 - б. пагін, який розвивається з верхівкової бруньки
 - в. пагін, який розвивається з бічної бруньки
 - г. перший видовжений пагін рослини
412. Вкажіть назву вегетативного тіла гриба:
- а. заросток
 - б. спорангій
 - в. грибниця
 - г. мікориза
413. Вкажіть, що називають мікоризою:
- а. взаємовигідне співжиття грибниці з азот фіксуючими бактеріями;
 - б. взаємовигідне співжиття кореня рослин з грибницею;
 - в. паразитування гриба на коренях рослини, що призводить до її захворювань і загибелі;
 - г. сірі або білі плівки на продуктах, утворені цвілевими грибами;
414. Назвіть способи розмноження грибів:
- а. статевий
 - б. нестатевий
 - в. вегетативний
 - г. усі вище наведені варіанти вірні
415. Зазначте назву рослинного компонента лишайника:
- а. мікобіонт
 - б. фікобіонт
 - в. міцелій
 - г. мікориза
416. Назвіть утвори, якими лишайники розмножуються:
- а. спори
 - б. іридії
 - в. насіння
 - г. яйцеклітини
417. Вкажіть, де у шапкових грибів розвиваються спори:
- а. у нижній частині ніжки
 - б. у верхній частині шапки
 - в. у верхній частині шапки
 - г. у шпарках між пластинками
418. Ефемерами називаються:
- а. однорічні рослини, які до настання засухи відцвітають і дають насіння
 - б. багаторічні рослини, які до настання засухи відцвітають і дають насіння
 - в. однорічні рослини, які до настання засухи відцвітають, дають насіння, запасують поживні речовини
 - г. однорічні і багаторічні рослини, які до початку засухи дають насіння
419. Рослину, з якої беруть живець для щеплення називають:
- а. підщепою
 - б. прищепою

- в. перещепою
 - г. живцем
420. Органами вегетативного розмноження є:
- а. листок, бульба
 - б. цибулина, кореневище
 - в. листок, бульба, цибулина, кореневище
 - г. корінь
421. Видами нестатевого розмноження є:
- а. спорове, вегетативне;
 - б. вегетативне;
 - в. спорове;
 - г. ізогамія;
422. До дворічних рослин відносяться:
- а. жито
 - б. пшениця
 - в. соняшник
 - г. капуста
423. Ріст – це:
- а. збільшення маси та розмірів тіла
 - б. формування організму, збільшення маси та розмірів тіла
 - в. збільшення розмірів
 - г. формування організму
424. Регуляторами росту рослин є:
- а. гормони, вітаміни
 - б. ферменти, гормони
 - в. гормони, вітаміни, ферменти
 - г. ферменти
425. Рослини, які самостійно створюють органічну речовину з вуглекислоти, води і мінеральних солей за рахунок сонячної радіації або хімічних перетворень називаються:
- а. гетеротрофними
 - б. автотрофними
 - в. міксотрофними
 - г. паразитарними
426. Рослини, які нездатні самостійно синтезувати органічну речовину, а використовують для живлення готові органічні сполуки називаються:
- а. гетеротрофними
 - б. автотрофними
 - в. міксотрофними
 - г. паразитарними
427. За способом живлення гриби належать до:
- а. автотрофних організмів
 - б. гетеротрофних організмів
 - в. міксотрофних організмів
 - г. хемотрофних організмів

428. Що таке зоологія?

- а. наука про будову, функції й розвиток клітин тварин і рослин, а також одноклітинних організмів і бактерій
- б. наука, яка вивчає рослин, гриби та водорості
- в. наука, яка вивчає взаємодії живих організмів
- г. наука, яка вивчає будову і життєдіяльність тварин, їх історичний та індивідуальний розвиток, класифікацію

429. Об'єктом вивчення зоології є:

- а. тварини
- б. рослинний світ
- в. окремі тварини та тваринний світ у цілому
- г. тваринний світ

430. Підберіть правильні слова: ... (1) – одна із форм існування живої матерії на Землі. Вона є цілісною біологічною системою, здатною до росту, розмноження і саморегулювання. Ці організми - ... (2), які здатні використовувати лише готові органічні сполуки і не можуть синтезувати їх з органічної речовини. Більшості властива підвищена активність, здатність до пересування в просторі:

- а. 1. тварини; 2. хижаки
- б. 1. бактерії; 2. міксотрофи
- в. 1. гриби; 2. гетеротрофи
- г. 1. тварини; 2. гетеротрофи

431. Зоогеографія – це:

- а. наука, що досліджує поширення тварин по Землі і виявляє історичні закономірності формування фауни в різних районах
- б. наука, що вивчає історичні закономірності формування фауни в різних районах
- в. наука, що досліджує поширення тварин по Землі
- г. наука, що досліджує поширення тварин по Землі

432. Палеозоологія – наука яка вивчає:

- а. закономірні поведінки тварин
- б. екологію популяцій і є тісно пов'язана з філогенією
- в. тваринний світ минулих часів
- г. антропогенний вплив людини на тваринний світ

433. Що вивчає етіологія?

- а. будову тваринного організму
- б. поведінку тварин
- в. гельмінтів
- г. поширення одноклітинних

434. Складну інстинктивну поведінку риб під час розмноження називають:

- а. загартування
- б. нерест
- в. спадковість
- г. анабіоз

435. Основна ознака типу членистоногих:

- а. тіло, розчленоване на відділи
 - б. запас поживних речовин у вигляді глікогену
 - в. пересування на чотирьох кінцівках
 - г. мешкання виключно у повітряному середовищі
436. Хордові належить до:
- а. царства Рослини
 - б. царства Тварини
 - в. царства Гриби
 - г. є окремим царством
437. Бокову лінію, як специфічний орган чуття, мають:
- а. птахи
 - б. плазуни
 - в. риби
 - г. рептилії
438. Що забезпечує теплокровність ссавців:
- а. наявність легкого скелету
 - б. наявність шерстяного покриву
 - в. чотирьохкамерне серце
 - г. трубчастий тип нервової системи
439. Зябра ракоподібних, трахеї комах, легені і трахеї павукоподібних – це органи:
- а. травлення
 - б. чуття
 - в. дихання
 - г. виділення
440. У риб серце:
- а. однокамерне
 - б. двокамерне;
 - в. трикамерне;
 - г. чотирьохкамерне.
441. Запасні речовини у тваринній клітині відкладаються у вигляді:
- а. крохмалю
 - б. цукру
 - в. глікогену
 - г. білку
442. Реакція багатоклітинної тварини на роздратування називається:
- а. таксис
 - б. рефлекс
 - в. мутація
 - г. адаптація
443. Дощовий черв'як належить до представників типу:
- а. кільчасті черви
 - б. плоскі черви
 - в. круглі черви
 - г. нематоди

444. Кровоносна система у членистоногих:

- а. незамкнена
- б. замкнена
- в. змішана
- г. відсутня

445. Сегментація тіла членистоногих:

- а. гомономна
- б. гетерономна
- в. поперечна
- г. повздожжня

446. Видозмінені метанефридії є органами виділення у:

- а. ракоподібних
- б. хеліцерових
- в. багатоніжок
- г. павукоподібних

447. Ротовий апарат сисного типу характерний для:

- а. метеликів
- б. бджіл
- в. тарганів
- г. комарів

448. У представників Амфібій серце :

- а. двокамерне
- б. трикамерне
- в. чотирикамерне
- г. однокамерне

449. Які органи у жаб з'єднуються між собою за допомогою двох потиличних виступів:

- а. череп з хребтом
- б. череп з вісцеральним органом
- в. тулуб з кінцівками
- г. верхня щелепа з черепом

450. Хроматофори - це..:

- а. пігментні клітини
- б. органи слуху
- в. органи зору
- г. органи виділення

451. Система дихання у Рептилій представлена :

- а. легеньми
- б. шкірою
- в. легеньми і шкірою
- г. складно розвиненою системою трахей;

452. У Земноводних личинки дихають :

- а. зябрами
- б. легеньми

- в. шкірою
 - г. легенями і шкірою
453. Визначте, з допомогою яких органел не рухаються найпростіші:
- а. джгутиків
 - б. війок
 - в. м'язів
 - г. псевдоподій
454. Укажіть, через що виводяться продукти розпаду в найпростіших:
- а. скоротливу вакуолю
 - б. травну вакуолю
 - в. вічко
 - г. джгутик
455. У одноклітинних відомі такі органи руху:
- а. джгутики, ніжки, війки;
 - б. війки, псевдоподії, джгутики;
 - в. не мають органів руху.
 - г. серед наведених немає правильної відповіді
456. Організм в якому відбувається статеве розмноження паразита називається:
- а. остаточний хазяїн
 - б. проміжний хазяїн
 - в. вихідний хазяїн
 - г. постійний хазяїн
457. Які з представників типу найпростіші паразитують у крові?
- а. лямблія
 - б. лейшманія
 - в. трихомонада
 - г. малярійний плазмодій
458. Як називається чергування статевого та нестатевого способів розмноження?
- а. онтогенез
 - б. метагенез
 - в. овогенез
 - г. сперматогенез
459. Найпростіші, які живляться органічними рештками:
- а. сапрофаги
 - б. хроматофори
 - в. оліготрофи
 - г. гетеротрофи
460. Як називається вторинна порожнина тіла?
- а. схізоцель
 - б. целом
 - в. перитон
 - г. схізоцелом;
461. Як називаються жалкі клітини кишковопорожнинних?:

- а. целомодукти
- б. кнідоцити
- в. щупальця
- г. кнідоцелі

462. Серце у ланцетника:

- а. відсутнє
- б. трикамерне
- в. однокамерне
- г. двокамерне

463. Пізнання методів і явищ шляхом їх порівняння, встановлення подібності та відмінності. Про що іде мова?

- а. описовий метод
- б. порівняльний метод
- в. експериментальний метод
- г. моделювання

464. Хто зробив великі вкладення в історичний метод, тим самим збільшивши його популярність?

- а. Мебіус
- б. Гіпократ
- в. Чарльз Дарвін
- г. Ернест Геккель

465. Експериментальний метод - це :

- а. метод, при якому дослідник не втручається в досліджувані явища
- б. метод, при якому дослідник порівнює різні організми
- в. метод, при якому дослідник втручається в хід процесів чи явищ, вносить певні зміни
- г. такий метод є сумішшю усіх попередніх методів

466. Що вивчає морфологія?

- а. зовнішню і внутрішню будову тваринного організму
- б. взаємовідносини між тваринами, їхній вплив на навколишнє середовище
- в. походження тварин
- г. поведінку тварин

467. Який внесок зробив Геккель у вивчення анатомії?

- а. написав книгу "Морфологічні закономірності еволюції"
- б. ввів термін "анатомія"
- в. написав трактат про частини тварин
- г. створив біогенетичний закон

468. Розділ біології, покликаний створити єдину струнку систему живого світу на основі виділення системи біологічних таксонів і відповідних назв, вибудованих за певними правилами (номенклатура) – це:

- а. ботаніка
- б. фізіологія
- в. анатомія
- г. систематика

469. Клітинний рот:

- а. Перистом
 - б. Цитостом
 - в. Фагоцитом
 - г. Пароцитом
470. Екологічними проблемами біосферно-біогеоценотичного рівня організації життя є:
- а. збільшення частки мутацій у генофондах
 - б. зниження адаптаційних можливостей
 - в. погіршення екологічних показників популяцій
 - г. збільшення кількості антропоценозів
471. Керуючою системою організмового рівня є:
- а. геном
 - б. енотип
 - в. каріотип
 - г. генофонд
472. Походження еукаріотичних клітин пояснюється гіпотезою:
- а. паразитичною
 - б. симбіотичною
 - в. консументичною
 - г. інвагінаційною
473. Основоположником клітинної теорії вважається:
- а. Р. Вірхов
 - б. Т. Шван
 - в. К. Ліней
 - г. Ж-Б. Ламарк
474. До прокаріотичних організмів відносять:
- а. бактерії
 - б. рослини
 - в. гриби
 - г. віруси
475. Першими на Землі з'явилися живі істоти:
- а. аеробні гетеротрофи
 - б. анаеробні гетеротрофи
 - в. автотрофи
 - г. міксотрофи
476. Для тварин, на відміну від рослин, характерним є процес:
- а. дихання
 - б. посту
 - в. обміну речовин
 - г. гетеротрофного живлення
477. Для прокаріотів, на відміну від еукаріотів, характерним є наявність:
- а. клітинних стінок
 - б. простого поділу клітини
 - в. спадкового апарату
 - г. рибосом

478. Еукаріоти відрізняються від прокаріотів:
- а. наявністю мембранних органел
 - б. відсутністю немембранних органел
 - в. наявністю аеробного дихання
 - г. відсутністю джгутиків
479. На електронній мікрофотографії клітини видно мембрани і вільні рибосоми. Ніяких інших внутрішньоклітинних структур не виявлено. До яких клітинних форм можна її віднести?
- а. найпростіші
 - б. еукаріоти
 - в. віруси
 - г. прокаріоти
480. До еукаріотичних організмів не відносяться:
- а. бактерії
 - б. рослини
 - в. тварини
 - г. гриби
481. Яке з тверджень є одним із положень клітинної теорії?
- а. форма ядра подібна до форми клітини
 - б. кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту
 - в. на клітинному рівні проявляються всі основні риси життя
 - г. кожна клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу
482. Для рослин, на відміну від тварин, характерним є процес:
- а. онтогенезу
 - б. метаболізму
 - в. автотрофного живлення
 - г. руху
483. Для прокаріотів, на відміну від еукаріотів, характерним є відсутність:
- а. мембранних органел
 - б. молекул ДНК
 - в. рибосом
 - г. процесу дихання
484. Який процес є головним для тварин, що забезпечує енергетичний обмін?
- а. хемосинтез
 - б. фотосинтез
 - в. асиміляція
 - г. дихання
485. Якщо у результаті ендотермічного процесу відбувається синтез речовин, характерних для клітини, то це:
- а. асиміляція
 - б. дисиміляція
 - в. обмін речовин
 - г. катаболізм
486. Вміст білків у біологічних мембранах становить близько:

- а. 50%
- б. 90 %
- в. 30%
- г. 5%

487. Просторове розмежування клітини внутрішніми мембранами на відсіки називається:

- а. сепаратизація
- б. компартментація
- в. цитоліз
- г. лізис

488. Процес дифузії розчинника (H₂O) через напівпроникну мембрану за концентраційним градієнтом носить назву:

- а. ендоцитозу
- б. екзоцитозу
- в. простої дифузії
- г. осмосу

489. Вид транспорту, який відбувається за участю компонентів мембран (канали і переносники) за градієнтом концентрацій носить назву:

- а. ендоцитозу
- б. екзоцитозу
- в. полегшеної дифузії
- г. осмосу

490. Макромолекули та їх агрегати проникають у клітину шляхом:

- а. ендоцитозу
- б. екзоцитозу
- в. простої дифузії
- г. осмосу

491. Згідно рідинно-мозаїчної моделі клітинні мембрани складаються з:

- а. ліпідного бішару та вбудованих у нього молекул білків
- б. ліпідного моношару та вбудованих у нього молекул білків
- в. білкового бішару та вбудованих у нього молекул ліпідів
- г. білкового бішару та ліпідного бішару

492. Ядерна оболонка безпосередньо з'єднується з ..?

- а. з плазматичною мембраною
- б. з мембраною вакуолей
- в. з системою трубочок і міхурців комплексу Гольджі
- г. з канальцями ендоплазматичної сітки

493. Цитоплазматична спадковість забезпечується у

- а. рибосомах
- б. ендоплазматичній сітці
- в. комплексі Гольджі
- г. мітохондріях

494. В ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?

- а. ядерця
- б. нуклеосоми
- в. полісоми
- г. мікрофібрили

495. З чого побудована нуклеосома?

- а. з РНК
- б. з ліпідів
- в. з полісахаридів
- г. з молекул білків гістонів

496. Ядра клітин обробили препаратом, який зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зазнають змін?

- а. мітохондрії
- б. ядерна оболонка
- в. рибосоми
- г. хромосоми

497. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірних хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

- а. інтерфаза
- б. телофаза
- в. анафаза
- г. профаза

498. На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?

- а. анафаза
- б. профаза
- в. метафаза
- г. інтерфаза

499. Як називається період життєвого циклу клітини, на якому відбувається синтез ДНК?

- а. пресинтетичний період інтерфази
- б. синтетичний період інтерфази
- в. премітотичний період інтерфази
- г. мітоз

500. Групи мембранних білків, які розташовані в одному місці, пов'язані між собою і виконують спільну функцію носять назву:

- а. протеїни
- б. реєстри
- в. протеокомплекси
- г. кластери

501. Функціональна спеціалізація різних частин клітини є можливою завдяки:

- а. сепаратизації
- б. компартментації
- в. цитолізу
- г. лізису

502. Цитоплазма еукаріотичних клітин складається з:

- а. цитозолю, органел, включень
 - б. цитогелю, органел, включень
 - в. цитозолю, органел
 - г. цитозолю, включень
503. Вода, як основна частина цитозолю має наступні біологічно важливі властивості. Вірно все, крім:
- а. розчинник для речовин у клітині
 - б. сприяє пересуванню речовин у розчиненому стані
 - в. ефективний термостабілізатор
 - г. забезпечує клітину енергією
504. Складовою частиною цитоскелета є:
- а. цитозоль
 - б. цитоматрикс
 - в. мікрофіламенти
 - г. неорганічні солі
505. До функцій цитоскелету не належить:
- а. підтримка об'єму і форми клітини
 - б. зміна форми клітини
 - в. пересування органел і транспорт везикул
 - г. контроль процесів метаболізму
506. Рух цитоплазми у клітині називається:
- а. цитоплазмоз
 - б. цитоплазмоліз
 - в. циклоз
 - г. цитоклазматоз
507. Рибосоми – це органели, які складаються з субодиниць:
- а. однієї
 - б. двох
 - в. трьох
 - г. чотирьох
508. З якою з органел клітини безпосередньо з'єднана ядерна оболонка?
- а. з плазматичною мембраною
 - б. з мембраною вакуолей
 - в. з системою трубочок і міхурців комплексу Гольджі
 - г. з каналцями ендоплазматичної сітки
509. В яких органелах забезпечується цитоплазматична спадковість?
- а. у рибосомах
 - б. в ендоплазматичній сітці
 - в. у комплексі Гольджі
 - г. у мітохондріях
510. "Порядок денний на XXI століття" прийнято:
- а. на Конференції ООН у червні у Ріо-де-Жанейро
 - б. у рамках Стокгольмської конвенції у травні 2004 року

- в. на Рамсарській конференції у 1989 року
- г. на Роттердамському саміті у вересні 1989 року

511. Об'єктом вивчення екології є:

- а. навколишнє середовище
- б. екосистема
- в. угруповання живих організмів
- г. живі організми

512. Методологічною основою біоекології є такий метод дослідження:

- а. синтезу
- б. порівняння
- в. експерименту
- г. дедукції

513. Якому з основних підходів відповідає таке визначення "Популяція – сукупність особин одного виду, які заселяють територію конкретної екосистеми":

- а. ценотипічному
- б. фенотипічному
- в. генетичному
- г. плеотипічному

514. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов'язані обміном речовин і енергії – це:

- а. біогеоценоз
- б. екосистема
- в. агроценоз
- г. сукцесія

515. Вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей це:

- а. екологічна експертиза
- б. екологічний аудит
- в. екологічна перевірка
- г. екологічний менеджмент

516. документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України це:

- а. екологічна експертиза
- б. екологічний аудит
- в. екологічна перевірка
- г. екологічний менеджмент

517. Частина загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність із планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізу екологічної політики це:

- а. екологічна експертиза
- б. екологічний аудит
- в. екологічна перевірка
- г. екологічний менеджмент

518. Комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення це:

- а. екологічна експертиза
- б. екологічний аудит
- в. екологічний моніторинг
- г. екологічний менеджмент

519. Спостереження за станом кліматичної системи (атмосфера — океан — літосфера — кріосфера — біота) та оцінка і прогнозування можливих змін клімату називаються:

- а. науковим моніторингом
- б. оперативним моніторингом
- в. кліматичним моніторингом
- г. фоновим моніторингом

520. Спостереження за природними процесами і явищами на рівні біосфери, а також через з'ясування глобальних змін фонових показників у природі називаються:

- а. географічним моніторингом
- б. оперативним моніторингом
- в. біосферним моніторингом
- г. фоновим моніторингом

521. Екологічна безпека є невід'ємною складовою:

- а. національної безпеки кожної держави
- б. безпеки життєдіяльності
- в. економічної безпеки
- г. військової безпеки

522. Екологічна система до складу якої входять усі популяції певного угруповання називається:

- а. поліцен
- б. моноцен
- в. демоцен
- г. плеоцен

523. Найпростішою живою системою до складу якої входять поодинокий організм та його безпосереднє оточення (середовище) називається:

- а. поліцен
- б. моноцен
- в. демоцен
- г. плеоцен

524. Біологічна система, що складається з популяції — одновидової групи особин — та її середовища називається:

- а. поліцен
- б. моноцен
- в. демоцен
- г. плеоцен

525. Науковий напрям, що розвивається на стику біоекології і наук про Землю називається:

- а. геоecologia
- б. демекologia
- в. техноеcologia
- г. біосферология

526. Гуманітарна галузь екології, яка вивчає шляхи оптимізації відносин людського суспільства і природи називається:

- а. геоecologia
- б. соціология
- в. техноеcologia
- г. соціоеcologia

527. Розділ екології, який вивчає джерела і можливий вплив технологічної діяльності на довкілля називається:

- а. геоecologia
- б. соціология
- в. техноеcologia
- г. соціоеcologia

528. Розділ екології, який вивчає взаємозв'язки та взаємодію у часі й просторі двох систем — міської (її соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністративної підсистем) і природної називається:

- а. геоecologia
- б. урбоеcologia
- в. техноеcologia
- г. соціоеcologia

529. Етап розвитку органічного світу, на якому розумна людська діяльність є домінуючим фактором розвитку біосфери називається:

- а. ноосфера
- б. техносфера
- в. номогенез
- г. техногенез

530. Розділ прикладної екології, який займається вивченням обсягів, механізмів і наслідків впливу на довкілля різних галузей і об'єктів антропогенної діяльності називається:

- а. геоecologiaю
- б. урбоеcologiaю
- в. техноеcologiaю
- г. біоеcologiaю

531. Комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біосферу, в цілому, та кругообіг в ній речовини й енергії називається:

- а. глобальною екологією
- б. синекологією
- в. біогеоценологією
- г. демекологією

532. Яке з нижче зазначених тверджень є законом Баррі Коммонера?

- а. все повинно кудись подітися
- б. природа знає краще
- в. ніщо не дається задарма
- г. усі перелічені

533. Пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник не втручається у перебіг природних процесів і явищ називається:

- а. дедукція
- б. індукція
- в. експеримент
- г. спостереження

534. Методологічною основою функціональної екології є метод:

- а. порівняння
- б. моделювання
- в. експерименту
- г. аналізу

535. В основі класифікації екологічних факторів Ніколсона-Шведтфегера лежить:

- а. специфіка впливу на структурно-функціональні параметри екосистем
- б. періодичність появи
- в. генезис
- г. важливість для забезпечення життєздатності виду

536. Яке із запропонованих визначень не відповідає терміну "екологічна толерантність":

- а. стійкість живих організмів до дії факторів середовища
- б. діапазон між екологічним мінімумом і максимумом
- в. екологічна валентність виду, зумовлена його пристосувальною здатністю
- г. життєва форма, яка визначається систематичним положенням виду

537. Едафічні фактори середовища існування належать до:

- а. біотичних
- б. абіотичних
- в. антропогенних
- г. біогенних

538. Як співвідносяться між собою поняття біогеоценоз і екосистема:

- а. біогеоценоз є окремим випадком екосистеми
- б. біогеоценоз - екосистема в межах конкретного фітоценозу
- в. екосистема є окремим випадком біогеоценозу
- г. як синоніми

539. Конкуренція належать до:

- а. біотичних факторів
- б. абіотичних
- в. антропогенних
- г. біогенних

540. Паразитизм належать до:

- а. антропогенних факторів
- б. біотичних факторів

- в. абіотичних факторів
 - г. біогенних факторів
541. Вирубка лісів належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. біотичних факторів
 - в. абіотичних факторів
 - г. біогенних факторів
542. Аменсалізм належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. біотичних факторів
 - в. абіотичних факторів
 - г. антропічних факторів
543. Коменсалізм належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. абіотичних факторів
 - в. антропічних факторів
 - г. біотичних факторів
544. Мутуалізм належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. абіотичних факторів
 - в. антропічних факторів
 - г. біотичних факторів
545. Фактори, зумовлені діяльністю людини називаються:
- а. антропогенними
 - б. абіотичними
 - в. біотичними
 - г. синергетичними
546. Неконтрольований збір рослин належать до:
- а. антропогенних факторів
 - б. абіотичних факторів
 - в. непрямих факторів
 - г. біотичних факторів
547. Руйнування ґрунту або гірських порід водним потоком, вітром, або, льодом це:
- а. абразія
 - б. ерозія
 - в. селі
 - г. дефляція
548. Перелік видів діяльності і об'єктів, що являють собою підвищену екобезпеку надано в:
- а. Конституції України
 - б. Постанові КМУ
 - в. ЗУ "Про основи національної безпеки України"
 - г. ЗУ "Про охорону НПС"
549. Державні органи, які здійснюють керівництво природокористування поділяються на:

- а. загальної та спеціальної компетенції
- б. первинні та вторинні
- в. адміністративні та цивільні
- г. усі перелічені

550. До державних органів загальної компетенції належать:

- а. Верховна Рада України
- б. Президент України
- в. Кабінет Міністрів України
- г. усі перелічені

551. До органів державної влади спеціальної компетенції належать:

- а. Верховна Рада України
- б. Президент України
- в. Кабінет Міністрів України
- г. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

552. До державних органів спеціальної компетенції належать:

- а. Верховна Рада України
- б. Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція)
- в. Президент України
- г. Кабінет Міністрів України

553. Які є види використання природних ресурсів?

- а. загальне використання
- б. спеціальне використання
- в. загальне і спеціальне використання
- г. безкоштовне використанн

554. Заходи економіко-правового регулювання у галузі природокористування та охорони довкілля поділяються на декілька груп:

- а. економічні санкції
- б. економічні стимули
- в. економічні гарантії.
- г. усі перелічені

555. Спеціальні засоби та заходи, що створюють належні фінансові умови для відповідного екологічно збалансованого управління (наприклад, екологічне страхування, екологічний аудит) це:

- а. економічні санкції
- б. економічні стимули
- в. економічні гарантії.
- г. усі перелічені

556. Податкові, кредитні та інші пільги, метою яких є заохочення господарюючих суб'єктів до раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля:

- а. економічні санкції
- б. економічні стимули
- в. економічні гарантії.
- г. усі перелічені

557. Примусові заходи фінансового характеру, які застосовуються у зв'язку з порушенням або невиконанням суб'єктами господарської діяльності або громадянами встановлених екологічних вимог

- а. економічні санкції
- б. економічні стимули
- в. економічні гарантії.
- г. екологічний аудит, екологічне страхування

558. До числа економічних гарантій належать:

- а. економічні санкції
- б. економічні стимули
- в. податкові пільги
- г. екологічний аудит

559. Яким нормативно-правовим актом регулюються відносини в галузі охорони і використання атмосферного повітря в Україні?

- а. Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- б. Законом України "Про екологічну експертизу"
- в. Законом України "Про охорону атмосферного повітря"
- г. Законом України "Про екологічний аудит"

560. В якому році вступив у дію Кіотський протокол?:

- а. 2002 рік
- б. 2005 рік
- в. 2007 рік
- г. 2017 рік

561. На які групи розділений комплекс природоохоронних заходів:

- а. екологічні нормативи
- б. ресурсогосподарські нормативи і правила
- в. нормативи використання вторинних ресурсів
- г. всі вище перераховані

562. Як називається група екологічних нормативів, яка встановлена для конкретних та унікальних об'єктів, ситуацій?

- а. оперативними
- б. перспективними.
- в. індивідуальними
- г. стабільними

563. Як називається забруднення, що полягає у впливі на склад і структуру популяцій живих організмів:

- а. інгредієнтне
- б. параметричне
- в. біоценотичне
- г. стадіально - декструкційне

564. Як називається забруднення пов'язане із зміною якісних параметрів навколишнього середовища?

- а. інгредієнтне
- б. параметричне

- в. біоценотичне
- г. стаціонально-деструкційне

565. Які допустимі межі сили звуку?:

- а. 30 дБ
- б. 45-85 дБ
- в. 100-125 дБ
- г. 130-140 дБ

566. До якого із типу забруднення відновиться світлове?

- а. фізичне
- б. теплове
- в. біологічне
- г. хімічне

567. Надходження у водні об'єкти шкідливих домішок неорганічного та органічного походження спричинює:

- а. хімічне забруднення
- б. фізичне забруднення
- в. біологічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

568. Біологічне забруднення водного середовища – це...

- а. надходження у водойми речовин із вираженою токсичною дією на гідробіоти
- б. надходження у водойми органічних сполук разом зі стоками сільсько-господарських і комунально-побутових підприємств;
- в. зміна фізико-хімічних параметрів водойм, яка призводить до зменшення їх біологічного різноманіття;
- г. надходження у водойми різних видів мікроорганізмів, рослин, тварин, невластивих водній екосистемі

569. Здатність водних організмів жити у воді, яка містить різну кількість органічних речовин

- а. сапробність
- б. евтрофікація
- в. буферність
- г. кислотність

570. Гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини – це ...

- а. максимальна концентрація речовини у навколишньому середовищі, за якої не спостерігається прямиї або опосередкований вплив на організм людини
- б. концентрація речовини, яка спричинює загибель половини піддослідних лабораторних тварин
- в. максимальна концентрація речовини, яка не спричинює летальний вплив на організм людини
- г. максимальна концентрація речовини, яка не спричинює незворотних змін у функціональній і структурній організації екологічних систем

571. Для нормування впливу підприємств на водойми використовують показник:

- а. ГДВ
- б. ГДС
- в. ГДЕН
- г. еквітокс

572. Пункти спостереження за станом поверхневих вод поділяються на:
- а. дві категорії
 - б. три категорії
 - в. чотири категорії
 - г. шість категорій
573. На водотоках при наявності організованого скиду зворотних вод встановлюють:
- а. 1 створ пункту спостереження
 - б. два і більше
 - в. не більше двох
 - г. жодного
574. На водотоках при відсутності організованого скиду зворотних вод встановлюють:
- а. 1 створ пункту спостереження
 - б. два і більше
 - в. не більше двох
 - г. жодного
575. При неоднорідному хімічному складі води у створі кількість вертикалей повинна складати:
- а. одна на стрижні водотоку
 - б. одна на середині водотоку
 - в. не менше двох
 - г. не менше трьох
576. При однорідному хімічному складі води кількість вертикалей у створі пункту спостереження повинна складати:
- а. одна на стрижні водотоку
 - б. одна на середині водотоку
 - в. не менше двох
 - г. не менше трьох
577. Кількість горизонтів на вертикалі створу пункту спостереження - ...
- а. одна на стрижні водотоку
 - б. одна на середині водотоку
 - в. залежить від глибини водойми
 - г. залежить від інтенсивності водообміну
578. Гідрохімічну інформацію про озера і водосховища збирають:
- а. 4 рази на рік;
 - б. 2 рази на рік;
 - в. 1 раз на рік;
 - г. 5-6 разів на рік.
579. Система спостережень за фізико-океанографічними та гідродинамічними факторами, які спричиняють поширення та перерозподіл забруднювачів у морському середовищі називається:
- а. фізичним моніторингом океану
 - б. екологічним моніторингом океану
 - в. геохімічним моніторингом морського середовища
 - г. гідрологічним моніторингом морського середовища
580. Спостереження за якістю морської води у прибережних районах, які мають важливе народногосподарське значення проводять у пунктах:

- а. I категорії
- б. II категорії
- в. III категорії
- г. IV категорії

581. Сукупність донних тварин, які живуть на дні або у донних відкладах морських і прісних водойм називають:

- а. зоопланктон
- б. зообентос
- в. перифітон
- г. нектон

582. Крилоногі молюски, ракоподібні, кишковопорожнинні, яйця та личинки риб належать до групи:

- а. зоопланктон
- б. зообентос
- в. перифітон
- г. нектон

583. Сукупність водних рослин і тварин, що заселяють підводні об'єкти утворюють групу:

- а. фітопланктон
- б. фітобентос
- в. перифітон
- г. зоопланктон

584. Синьозелені, діатомові та деякі групи зелених водоростей входять до групи:

- а. фітопланктон
- б. зообентос
- в. перифітон
- г. нектон

585. Вусоногі ракоподібні, двостулкові молюски, водорості, кільчасті черви належать до групи:

- а. фітопланктон
- б. зообентос
- в. перифітон
- г. нектон

586. У відсотковому відношенні повітряна оболонка Землі утворена:

- а. O₂ (78,08%) > N₂ (20,95%) > CO₂ (0,93) > Ar (0,03) та ін.
- б. O₂ (78,08%) > CO₂ (20,95%) > N₂ (0,93) > Ar (0,03) та ін.
- в. N₂ (78,08%) > O₂ (25,95%) > Ar (0,67) > CO₂ (0,03) та ін.
- г. N₂ (78,08%) > CO₂ (20,95%) > Ar (0,93) > O₂ (0,03) та ін.

587. Функцію регулярного відбору проб повітря з метою подальшого лабораторного аналізу та безперервної реєстрації забруднювачів виконують:

- а. маршрутні пости спостереження
- б. підфакельні пости спостереження
- в. стаціонарні пости спостереження
- г. мігруючі пости спостереження

588. Пости спостереження, які використовуються для відбору проб повітря під димовим факелом називаються:

- а. маршрутними
- б. підфакельними;
- в. стаціонарними
- г. тимчасові

589. Пости спостереження, які встановлюються у місцях де недоцільно встановлювати стаціонарні пости спостереження називаються:

- а. маршрутними
- б. підфакельними;
- в. стаціонарними
- г. тимчасові

590. Характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлена для попередження рефлекторних реакцій людини при короткотривалому впливі атмосферних домішок позначається як:

- а. ГДКм.р.
- б. ГДКс.д.
- в. ГДВ
- г. ГДС

591. Надходження у водойми шкідливих домішок органічного походження спричинює: хімічне забруднення;

- а. хімічне забруднення
- б. біологічне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

592. Фоновим називають створ пункту спостереження, розміщений:

- а. нижче джерела забруднення
- б. на водотоках, які знаходяться у межах природно-заповідних територій
- в. вище джерела забруднення
- г. вище від місця водозабору

593. Надходження у водойми шкідливих домішок неорганічного походження спричинює: хімічне забруднення;

- а. хімічне забруднення
- б. біологічне забруднення
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

594. Характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлена для попередження загальнотоксичної, мутагенної та канцерогенної дії позначається як:

- а. ГДКм.р.
- б. ГДКс.д.
- в. ГДВ
- г. ГДС

595. Характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлена для робочої зони позначається як:

- а. ГДКм.р.
- б. ГДКр.з.

- в. ГДВ
- г. ГДС

596. Скільки виділяють класів забруднюючих речовин?

- а. 1
- б. 3
- в. 4
- г. 7

597. Високонебезпечні забруднюючі речовини належать до класу:

- а. 1
- б. 3
- в. 2
- г. 7

598. Надзвичайно небезпечні забруднюючі речовини належать до класу:

- а. 1
- б. 3
- в. 2
- г. 4

599. Помірно небезпечні забруднюючі речовини належать до класу:

- а. 1
- б. 3
- в. 2
- г. 4

600. Малонебезпечні забруднюючі речовини належать до класу:

- а. 1
- б. 3
- в. 2
- г. 4

601. Виникнення кислотних опадів зумовлене потраплянням в атмосферне повітря:

- а. парів органічних кислот
- б. вуглекислого газу і метану
- в. оксидів сульфуру і нітрогену
- г. вуглекислого газу

602. Групу парникових газів утворюють:

- а. вуглекислий газ, метан й галовуглеводи
- б. інертні гази атмосфери
- в. оксид сульфуру (IV) і сірководень
- г. оксиди нітрогену

603. Процес руйнування озону в атмосфері максимально ініціюється:

- а. бромпохідними, тетрахлоридом карбону і хлором
- б. оксидами сульфуру і нітрогену
- в. важкими металами й ароматичними сполуками
- г. метаном та діоксидом карбону

604. Порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх природними особливостями і продуктивністю, виражена у балах, називається:

- а. меліорацією
- б. бонітуруванням
- в. ранжуванням
- г. біоіндикацією

605. Втрата або істотне зменшення ґрунтами їх родючості і погіршення їх окремих властивостей під впливом несприятливих чи природних чи антропогенних чинників називається:

- а. деградацією
- б. дефляцією
- в. аридезацією
- г. гдзертифікацією

606. Видування й перевідкладення пилюватих чи дрібно піщаних часток ґрунту називається:

- а. дефляцією
- б. аридезацією
- в. вилуговуванням
- г. ерозією

607. Ґрунтовий моніторинг, періодичність спостережень при якому складає 1 раз на 10 років називається:

- а. перспективним
- б. віддаленим
- в. оперативним
- г. базовим

608. Ґрунтовий моніторинг забезпечує, що постійне спостереження за найбільш динамічними показниками (рухомі форми поживних елементів, рН, фізичний стан ґрунту, вміст рухомих форм важких металів) називається:

- а. перспективним
- б. віддаленим
- в. оперативним
- г. базовим

609. Щорічні режимні спостереження проводяться при:

- а. перспективному ґрунтовому моніторингу
- б. віддаленому ґрунтовому моніторингу
- в. оперативному ґрунтовому моніторингу
- г. кризовому ґрунтовому моніторингу

610. Ґрунтовий моніторинг, періодичність спостережень при якому складає 1 раз на 5-10 років називається:

- а. перспективним
- б. віддаленим
- в. оперативним
- г. базовим

611. Головною ознакою, яка відрізняє ґрунти від гірських порід є:

- а. біотичне походження
- б. родючість

- в. буферність
- г. гранулометричний склад

612. Радіоактивні елементи та ізотопи земної кори належать до:

- а. природних джерел опромінення
- б. штучних джерел опромінення
- в. комбінованих джерел
- г. антропогенних джерел

613. За допомогою мережі пунктів спостереження, яка охоплює всю територію країни, проводять:

- а. науковий радіоекологічний моніторинг
- б. кризовий радіоекологічний моніторинг
- в. базовий радіоекологічний моніторинг
- г. оперативний радіоекологічний моніторинг

614. Радіоекологічний моніторинг, який реалізують координуючі структури на базі науково-дослідних закладів (підрозділів АН України), які розробляють методи та програми радіологічних досліджень це:

- а. науковий радіоекологічний моніторинг
- б. кризовий радіоекологічний моніторинг
- в. базовий радіоекологічний моніторинг
- г. оперативний радіоекологічний моніторинг

615. Система радіологічного моніторингу формується на основі діяльності територіальних служб спостереження і контролю радіоекологічних параметрів навколишнього середовища на територіях, де виникли несприятливі радіологічні ситуації це:

- а. науковий радіоекологічний моніторинг
- б. кризовий радіоекологічний моніторинг
- в. базовий радіоекологічний моніторинг
- г. оперативний радіоекологічний моніторинг

616. Науковий радіоекологічний моніторинг здійснюють:

- а. Міністерство екології та його управління на місця
- б. підрозділи НАН України
- в. МОЗ України
- г. обласні екоінспекції

617. Система спостережень і контролю за станом потенційно небезпечних радіаційних об'єктів (зокрема АЕС та об'єкту "Укриття") забезпечується функціонуванням:

- а. ядерно-радіаційного моніторингу
- б. радіогеохімічного моніторингу
- в. радіогідрогеологічного моніторингу
- г. оперативного радіологічного моніторингу

618. Європейська система підтримки при реагуванні на ядерні аварії реалізується через систему:

- а. GAMMA
- б. TACIS
- в. RODOS
- г. FOTON

619. Виявлення значних перевищень рівнів радіаційного фону на підконтрольних територіях, оповіщення відповідальних осіб про такі перевищення і забезпечення їх інформацією, необхідною для проведення захисних заходів є завданням системи:

- а. GAMMA
- б. TACIS
- в. RODOS
- г. FOTON

620. Перевищення природного рівня вмісту радіонуклідів у навколишньому середовищі спричинює:

- а. радіаційне забруднення
- б. електромагнітне забруднення
- в. інгредієнтне забруднення
- г. радіоактивне забруднення

621. Форма фізичного забруднення, викликана дією іонізуючого випромінювання, називається:

- а. радіаційне забруднення
- б. електромагнітне забруднення
- в. інгредієнтне забруднення
- г. радіоактивне забруднення

622. Виявлення наявних у довкіллі забруднювачів на основі зміни забарвлення, форми чи розмірів вегетативних органів рослин називається:

- а. біотестуванням
- б. фітомеліорацією
- в. фітоіндикацією
- г. біоремедіацією

623. Оцінка стану навколишнього середовища за реакцією біологічних систем різного рівня у природних умовах їх існування називається:

- а. біотестуванням
- б. біоіндикацією
- в. біоремедіацією
- г. екодіагностикою

624. Рослина, за ознаками ушкодження якої можна отримати інформацію про кількість забруднюючої речовини у довкіллі називається:

- а. рослиною-індикатором
- б. рослиною-монітором
- в. біотестором
- г. рослиною-фільтром

625. Вищою індикаторною цінністю для оцінки природних екологічних умов (глибини залягання ґрунтових вод, кислотності і хімічного складу ґрунту тощо) володіють:

- а. види-стенобіонти
- б. види-еврібіонти
- в. види-ендеміки
- г. види-релікти

626. Оперативний моніторинг навколишнього середовища на основі спостережень за станом і поведінкою біологічних об'єктів називається:

- а. біотестуванням
- б. біоіндикацією
- в. біоремедіацією
- г. екодіагностикою

627. Рослина, у якої ознаки ушкодження виявляються при впливі фітотоксичної концентрації забруднюючих речовин або їх суміші:

- а. рослиною-індикатором
- б. рослиною-монітором
- в. біотестором
- г. рослиною-фільтром

628. Система спостережень за планетарними процесами і явищами називається:

- а. імпактним моніторингом
- б. регіональним моніторингом
- в. глобальним моніторингом
- г. немає правильної відповіді

629. Спостереження за територіями, які піддаються антропогенному впливу, що зумовлює небезпечні або критичні наслідки називається:

- а. фоновим моніторингом
- б. біосферним моніторингом
- в. регіональним моніторингом
- г. імпактним моніторингом

630. Вивчення критичних забруднень на локальних територіях проводять на:

- а. локальному рівні моніторингу
- б. регіональному рівні моніторингу
- в. фоновому рівні глобального моніторингу
- г. немає правильної відповіді

631. Спостереження за кліматичними, едафічними, гідрологічними й орографічними умовами середовища належать до програми:

- а. абіотичної складової фонового моніторингу
- б. біотичної складової фонового моніторингу
- в. біогеохімічного моніторингу
- г. геофізичного моніторингу

632. Контроль стану навколишнього природного середовища за допомогою живих організмів це:

- а. науковий моніторинг
- б. біологічний моніторинг
- в. геомоніторинг
- г. немає правильної відповіді

633. Науковий радіоекологічний моніторинг здійснюють:

- а. обласні екоінспекції
- б. МОЗ України
- в. підрозділи НАН України
- г. немає правильної відповіді

634. Система спостережень за біотичною складовою екосистем та її реакцією на антропогенний вплив називається:

- а. біологічним моніторингом
- б. біотестуванням
- в. біогеофізичним моніторингом
- г. біоіндикацією

635. Який із нижче перелічених показників не може бути визначеним із застосуванням гравіметричного аналізу:

- а. запиленість атмосферного повітря
- б. зависі у водному середовищі
- в. карбонати ґрунту
- г. немає правильної відповіді

636. Метод кількісного хімічного аналізу, який базується на точному вимірюванні маси певної речовини після її виділення з розчину чи суміші називається:

- а. гравіметричним
- б. титрометричним
- в. волюметричним
- г. хроматографічним

637. Ландшафт складається з таких категорій:

- а. геокомплексів
- б. біоценозів
- в. екоотопів
- г. фацій

638. Поняття "екологічна система" вперше введено у науку:

- а. А. Тенслі
- б. Е. Геккелем
- в. Л.Г. Раменським
- г. В.І. Вернадським

639. Екологічна ніша це:

- а. позиція виду у співтоваристві і в співвідношенні з іншими видами і середовищем перебування
- б. територія переважного незаселеного якогось виду
- в. територія, в межах якої здійснюється конкурентна боротьба між видами
- г. асоціація рослинності, що займає певне положення в просторі, що відрізняється від суміжних асоціацій

640. Екосистема являє собою:

- а. моноцентричну модель
- б. поліцентричну модель
- в. симетричну модель
- г. радіальну модель

641. Часова динаміка ландшафтів представлена:

- а. циклічною
- б. періодичною
- в. флуктуаційною
- г. усі правильні

642. Умови середовища, в яких вид може існувати і навіть процвітати при відсутності конкуренції це
- а. Фундаментальна ніша
 - б. екотон
 - в. континуум
 - г. реалізована ніша
643. Частина фундаментальної ніші, яку вид здатний відстояти від конкурентів за їх наявності.
- а. біоцентр
 - б. екотон
 - в. континуум
 - г. реалізована ніша
644. Послідовне розташування компонентів по вертикалі (за ярусами) це:
- а. вертикальна структура ландшафту
 - б. горизонтальна структура ландшафту
 - в. екотон
 - г. континуум
645. Упорядковане просторове розташування морфологічних одиниць у межах ландшафту більш високого рангу:
- а. вертикальна структура ландшафту
 - б. горизонтальна структура ландшафту
 - в. екотон
 - г. континуум
646. Найпростіший ПТК, який займає елемент мезоформи рельєфу (одну грань) або його частину це:
- а. біоцентр
 - б. підурочище
 - в. біотоп
 - г. реалізована ніша
647. За своїм походженням фації поділяються на:
- а. циклічні
 - б. періодичні
 - в. вертикальні і горизонтальні
 - г. природні (корінні) та антропогенні (похідні)
648. Складна морфологічна одиниця ландшафту, яка утворюється з урочищ і фацій, з одним типом комплексів мезоформ рельєфу, однорідною геологічною основою, місцевим кліматом, із переважанням одного підтипу (типу) ґрунтів і рослинності це:
- а. біоцентр
 - б. урочище
 - в. фація
 - г. місцевість
649. Основним об'єктом польового ландшафтного картування як на рівнинах, так і в горах є:
- а. біоцентр
 - б. урочище

- в. екотоп
- г. місцевість

650. Під поняттям "емерджентність системи" розуміють: } здатність системи підтримувати стабільність відкритість системи =набуття системою нових якостей дестабілізацію системи } 655. Системний підхід у науці заснований: } =Л. фон Берталанфі А. Лоткою Дж. Хакслі Е. Геккелем }

656. Пасивний метод наукового дослідження, при якому дослідник не втручається у перебіг природних процесів і явищ називається: } синтез моделювання експеримент =спостереження }

657. Видовжений ареал, представлений геотопами з природною, або близькою до неї рослинністю, вздовж якого відбуваються біотичні міграції між окремими біоцентрами це:

- а. урочище
- б. біокоридор
- в. фація
- г. реалізована ніша

651. Лінійний ареал, зайнятий геотопами з природною, або близькою до неї рослинністю, який відгалужується від біоцентра або біокоридора і виконує функцію поширення їх дії на прилеглі агро - чи урбоугіддя це:

- а. урочище
- б. біокоридор
- в. інтерактивний елемент
- г. реалізована ніша

652. Група - суміжних геотопів з природною рослинністю, які виконують функції збереження генофонду ландшафту, сприятливого впливу на прилеглі геотопи з культурною рослинністю (рілля), або без неї (місто), естетичної привабливості території це:

- а. урочище
- б. біокоридор
- в. фація
- г. біоцентр

653. Термін "екотон" вперше було вжито:

- а. В.І. Вернадським
- б. Клементсом
- в. Е. Зюссом
- г. Ю. Одумом

654. Предметом ландшафтної екології є:

- а. екосистема
- б. геосистема
- в. біотоп
- г. біогеоценоз

655. Межі між геосистемами можна розділити:

- а. за морфологічною вираженістю
- б. за рівнем забруднення повітря
- в. за рівнем забруднення ґрунтових вод
- г. за рівнем забруднення ґрунтів

656. Метод наукового дослідження, при якому дослідник втручається у перебіг природних процесів і явищ називається: } синтез аналіз =експеримент спостереження } 664. Однорідні елементарні поверхні рельєфу називаються:

- а. морфотипи
- б. геотопи
- в. екоклони
- г. екотопи

657. Який з термінів є найбільш широким за змістом:

- а. геокомпонент
- б. геомаса
- в. геогоризонт
- г. геоелемент

658. Сукупність у геосистемах механізмів знешкодження забруднень або виведення їх з кругообігу і з геосистеми взагалі, називається:

- а. стійкістю
- б. циркуляцією
- в. забрудненням
- г. самоочищенням

659. Термін "геосистема" впровадив у науковий вжиток:

- а. В.Б. Сочава
- б. Мебіус
- в. К. Тролль
- г. І. Зонефельдом

660. Ділянка земної поверхні у складі географічної оболонки, яка характеризується відносною цілісністю свого складу називається:

- а. геосистема
- б. природно-територіальний комплекс
- в. синузія
- г. екосистема

661. Збагачення водойм біогенними елементами, що супроводжується підвищенням продуктивності водойми це:

- а. евтрофікація
- б. нітрифікація
- в. фізичне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

662. Забруднення водойм домішками неорганічного та органічного походження називається:

- а. радіоактивне
- б. фізичне
- в. хімічне
- г. біотехногенне

663. Температура, прозорість, радіоактивність природних вод належать до групи:

- а. біохімічних показників
- б. гідрохімічних показників
- в. гідрофізичних показників
- г. гідробіологічних показників

664. Концентрація забруднюючої речовини в повітрі, яка не справляє на людину опосередкованої шкідливої дії при цілодобовому вдиханні це:

- а. ГДКс.д.
- б. ГДКм.р.
- в. ГДК
- г. ГДВ

665. Концентрація забруднювача в повітрі (населених місць), що не викликає рефlectorних реакцій в організмі людини це:

- а. ГДКс.д.
- б. ГДКм.р.
- в. ГДК
- г. ГДВ

666. Відвали шахтних порід у формі конусів називаються:

- а. териконами
- б. суфозіями
- в. скверами
- г. угіддями

667. До першого еколого-фітоценотичного поясу в урбоекосистемі належить:

- а. приміські ліси, луки, болота, водойми
- б. міські парки та лісопарки, лугопарки, гідропарки, великі зелені масиви різного призначення
- в. сади та сквери
- г. вуличні посадки, насадження промислових підприємств.

668. До другого еколого-фітоценотичного поясу в урбоекосистемі належить:

- а. приміські ліси, луки, болота, водойми
- б. міські парки та лісопарки, лугопарки, гідропарки, великі зелені масиви різного призначення
- в. сади та сквери
- г. вуличні посадки, насадження промислових підприємств.

669. До третього еколого-фітоценотичного поясу в урбоекосистемі належить:

- а. приміські ліси, луки, болота, водойми
- б. міські парки та лісопарки, лугопарки, гідропарки, великі зелені масиви різного призначення
- в. сади та сквери
- г. вуличні посадки, насадження промислових підприємств.

670. До четвертого еколого-фітоценотичного поясу в урбоекосистемі належить:

- а. приміські ліси, луки, болота, водойми
- б. міські парки та лісопарки, лугопарки, гідропарки, великі зелені масиви різного призначення
- в. сади та сквери
- г. вуличні посадки, насадження промислових підприємств.

671. Гемеробія це:

- а. виділення однотипних рослинних угруповань, які утворюють еколого-фітоценотичні зони чи пояси або еоклини
- б. рівень окультурення біогеоценозів
- в. еколого-фітоценотичні пояси
- г. вуличні посадки, насадження промислових підприємств.

672. Мертва підстилкова поверхня міст належить до класу гемеробії:
- а. першого та другого класів гемеробії (агемеробні та олігогемеробні)
 - б. третього класу гемеробії (мезогемеробні)
 - в. четвертого класу гемеробії (еугемеробні)
 - г. п'ятого та шостого класів гемеробії (полі- та метагемеробні)
673. Ліси, луки із раціональним веденням господарства, заповідні території міст належить до класу гемеробії:
- а. першого та другого класів гемеробії (агемеробні та олігогемеробні)
 - б. третього класу гемеробії (мезогемеробні)
 - в. четвертого класу гемеробії (еугемеробні)
 - г. п'ятого та шостого класів гемеробії (полі- та метагемеробні)
674. Парки, лісопарки, лугопарки належить до класу гемеробії:
- а. першого та другого класів гемеробії (агемеробні та олігогемеробні)
 - б. третього класу гемеробії (мезогемеробні)
 - в. четвертого класу гемеробії (еугемеробні)
 - г. п'ятого та шостого класів гемеробії (полі- та метагемеробні)
675. Культурфітоценози, сади, газони, квітники належить до класу гемеробії:
- а. першого та другого класів гемеробії (агемеробні та олігогемеробні)
 - б. третього класу гемеробії (мезогемеробні)
 - в. четвертого класу гемеробії (еугемеробні)
 - г. п'ятого та шостого класів гемеробії (полі- та метагемеробні)
676. Рослини пристосовані до посушливих умов місцезростань урбоекосистем називаються:
- а. гігрофіти|грунту|
 - б. ксерофіти|
 - в. мезофіти|вияву|
 - г. мезогігрофіти
677. Видалення крупнозернистих забруднюючих речовин на ґратах належать до методів очистки стічних вод:
- а. механічних
 - б. хімічних
 - в. біологічних
 - г. фізико-хімічних
678. Електродіаліз, гідроліз належать до методів очистки стічних вод:
- а. біологічних
 - б. механічних
 - в. хімічних
 - г. фізико-хімічних
679. Для оброблення господарсько-побутових стічних вод населених пунктів застосовують методи очистки стічних вод:
- а. механічні
 - б. біологічні
 - в. реагентні
 - г. немає правильної відповіді
680. До фізико-хімічних методів очищення стічних вод належать:

- а. екстракція
- б. флотація
- в. нейтралізація
- г. аеротенк

681. Сукупність інженерних споруд, устаткування та санітарних засобів, що забезпечує збирання та виведення за межі населених пунктів і промислових підприємств забруднених стічних вод, а також їхнє очищення та знешкодження перед використанням чи скиданням у водойму це:

- а. каналізація
- б. флотація
- в. матантенк
- г. аеротенк

682. Споруда для штучного біологічного очищення стічних вод за допомогою активного мулу (бактерії-мініралізатори та нижчі організми) і продування повітрям (аерації) це:

- а. каналізація
- б. флотація
- в. матантенк
- г. аеротенк

683. Штучний резервуар великої ємності (до декількох тис. м³) для біологічної переробки (так званого метанового зброджування за допомогою бактерій-мініралізаторів та інших мікроорганізмів) органічного осаду стічних вод без доступу повітря це:

- а. каналізація
- б. флотація
- в. матантенк
- г. аеротенк

684. Агрегація за допомогою реагентів — коагулянтів і флокулянтів належать до методів очистки стічних вод:

- а. біологічних
- б. механічних
- в. хімічних
- г. фізико-хімічних

685. До реагентних методів очистки стічних вод відносять:

- а. нейтралізацію кислот і лугів, переведення йонів у малорозчинний стан
- б. фільтрування
- в. відстоювання
- г. немає правильної відповіді

686. Відстоювання належать до методів очистки стічних вод:

- а. біологічних
- б. механічних
- в. хімічних
- г. фізико-хімічних

687. Фільтрування належать до методів очистки стічних вод:

- а. біологічних
- б. механічних
- в. хімічних
- г. фізико-хімічних

688. Методи, що пов'язані з дією електричного струму на водні розчини належать до:
- а. біологічних
 - б. механічних
 - в. хімічних
 - г. фізико-хімічних
689. Озонування належать до методів очистки стічних вод:
- а. біологічних
 - б. механічних
 - в. немає правильної відповіді
 - г. фізико-хімічних
690. Хлорування належать до методів очистки стічних вод:
- а. біологічних
 - б. механічних
 - в. немає правильної відповіді
 - г. фізико-хімічних
691. Сукупність інженерних споруд, в яких стічні води очищаються від забруднювальних речовин, називаються:
- а. каналізацією
 - б. флотацією
 - в. очисними спорудами
 - г. немає правильної відповіді
692. Напрямок екології, який займається дослідженням, прогнозуванням та використанням рослинних систем для покращення геофізичних, геохімічних, біотичних, просторових та естетичних характеристик навколишнього середовища:
- а. фітомеліорація
 - б. фітоіндикація
 - в. екологічний моніторинг
 - г. екологічний менеджмент
693. Вид, який знайшов поблизу людських поселень особливо сприятливі для себе умови життя і сформував у створеному людиною штучному або напівприродному середовищі стійкі та життєздатні популяції називається:
- а. реліктом
 - б. ендеміком
 - в. синантропом
 - г. немає правильної відповіді
694. Види, які існували на території до створення міста називається:
- а. реліктовими
 - б. адвентивними
 - в. синантропами
 - г. немає правильної відповіді
695. Розподіл території міста на частини з різною господарською спеціалізацією, називається:
- а. природним зонуванням
 - б. ландшафтним аналізом території

- в. функціональним зонуванням
- г. немає правильної відповіді

696. Мінімальна чисельність населення для визначення статусу міста в Україні становить:

- а. 2500
- б. 4000
- в. 10000
- г. 5000

697. Одним з найважливіших факторів, що визначають інтенсивність процесу урбанізації є:

- а. забруднення навколишнього середовища
- б. економічний розвиток країни
- в. інтенсифікація сільського господарства
- г. техногенне навантаження

698. Територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів називається:

- а. селітебна зона
- б. санітарно-захисна зона
- в. санітарна зона
- г. немає правильної відповіді

699. Найвищим рівнем урбанізації характеризуються:

- а. країни, що розвиваються
- б. розвинені країни
- в. країни Центральної Африки
- г. країни пострадянського простору

700. Ґрунти, створювані людиною у процесі рекультивациі тих або інших об'єктів або господарського освоєння ділянок у міських умовах, які характеризуються відсутністю чітко виражених горизонтів та підвищеною щільністю називаються:

- а. чорноземи
- б. техноземи
- в. терикони
- г. немає правильної відповіді

701. Надходження у водойми шкідливих домішок неорганічного та органічного походження спричинює:

- а. радіоактивне забруднення
- б. фізичне забруднення
- в. біологічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

702. Горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків це:

- а. вугілля
- б. зола
- в. доменний газ
- г. кокс

703. Розтоплена або затверділа маса різних домішок, золи і флюсів, що є побічним продуктом металургійних процесів і використовується для виготовлення в'язучих матеріалів це:

- а. вугілля
- б. залізна руда
- в. шлаки
- г. кокс

704. Вид твердого палива, яке одержують нагріванням кам'яного вугілля, торфу тощо до високих температур без доступу повітря це:

- а. вугілля
- б. зола
- в. шлаки
- г. кокс

705. Сировиною для отримання коксу є:

- а. вугілля
- б. зола
- в. шлаки
- г. нафта

706. Концентрація забруднювача в повітрі, котра не справляє на людину опосередкованої шкідливої дії при цілодобовому вдиханні це:

- а. ГДКм.р.
- б. ГДКр.з.
- в. ГДКс.д.
- г. ГДК

707. Концентрація забруднювача в повітрі, що не викликає рефлекторних реакцій в організмі людини це:

- а. ГДКс.д.
- б. ГДКм.р.
- в. ГДК
- г. ГДВ

708. Відвали шахтних порід або порід збагачення у формі конусів називаються:

- а. териконами
- б. суфозіями
- в. скверами
- г. угіддями

709. Концентрація речовини у воді водного об'єкта, що сформувалася під впливом усіх домішок, за винятком впливу даного джерела, відносно якого визначається ця концентрація:

- а. фонові концентрація
- б. гранично допустима концентрація
- в. відносна концентрація
- г. комбінована концентрація

710. Маса речовини у зворотній воді, тимчасово допустима до відведення у водний об'єкт при поетапному досягненні ГДС:

- а. аварійний скид
- б. гранично допустимий вплив
- в. залповий скид
- г. тимчасово-допустимий скид

711. Наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей це:

- а. радіоактивне забруднення
- б. фізичне забруднення
- в. біологічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

712. Підвищення вмісту механічних домішок, властиве в основному поверхневим видам забруднень це:

- а. механічне забруднення
- б. фізичне забруднення
- в. біологічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

713. Створює зміну природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частки), так і органічної природи (нафта і нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево активну речовину, пестициди):

- а. механічне забруднення
- б. фізичне забруднення
- в. хімічне забруднення
- г. біотехногенне забруднення

714. Випуск у водойми підігрітих вод підприємств, теплових і атомних ЕС створює:

- а. механічне забруднення
- б. теплове забруднення
- в. біотехногенне забруднення
- г. хімічне забруднення

715. Небезпечними є викиди з труб ТЕС в атмосферу:

- а. окислів сірки й азоту
- б. фтор та його сполуки
- в. вуглекислого газу
- г. фреонів

716. Відходи нафтопереробки:

- а. бензин та мастила
- б. мазут
- в. нафтошлами та кислі гудони
- г. кокс

717. Маслянистий залишок нафти після відбирання із неї світлих дистилатів — бензину, гасу, газойлю:

- а. шлак
- б. мазут
- в. гудон
- г. кокс

718. Видалення крупнозернистих забруднюючих речовин на ґратах, відстоювання та фільтрування належать до методів очистки стічних вод:

- а. механічних
- б. хімічних

- в. фізико-хімічних
- г. біологічних

719. Електродіаліз, електрохімічне окиснення і гідроліз належать до методів очистки стічних вод:

- а. механічних
- б. хімічних
- в. фізико-хімічних
- г. біологічних

720. Для оброблення господарсько-побутових стічних вод населених пунктів, а також промислових підприємств застосовують методи очистки стічних вод:

- а. механічні
- б. хімічні
- в. фізико-хімічні
- г. біологічні

721. До фізико-хімічних методів очистки стічних вод належать:

- а. флотація
- б. нейтралізація
- в. екстракція
- г. метантенк

722. Режим роботи метантенку:

- а. аеробний
- б. анаеробний
- в. мезофільний
- г. мезофобний

723. Локальне очисне устаткування, що застосовується на стадії проектування та будівництва комплексних систем локального очищення побутових і господарських стічних вод:

- а. септик
- б. метантенк
- в. аеротенк
- г. відстійник

724. Сукупність повноважень конкретних суб'єктів по володінню, користуванню та розпорядженню природними ресурсами, що їй належать:

- а. об'єктивне право власності на природні ресурси;
- б. суб'єктивне право власності на природні ресурси;
- в. право природокористування
- г. природоохоронне право

725. Об'єктом права власності можуть бути:

- а. абсолютно всі природні об'єкти;
- б. тільки ті об'єкти які є відносно стабільними;
- в. тільки ті, що підлягають індивідуалізації.
- г. національні парки

726. Згідно з Конституцією України існують такі форми права власності на природні ресурси:

- а. державна, колективна, приватна
- б. державна, комунальна, приватна

- в. загальнодержавна, приватна, власність народу України
 - г. власність народу України, державна, комунальна, приватна
727. У приватній власності за чинним законодавством можуть знаходитися:
- а. земельні ділянки сільськогосподарського призначення
 - б. замкнені природні водойми загальною площею до 3 гектарів
 - в. підземні сховища нафти та продукти її переробки
 - г. будь – які об'єкти тваринного світу, в тому числі занесені до Червоної книги.
728. Які повноваження мають суб'єкти права власності на природні ресурси:
- а. право на володіння;
 - б. факультативне право;
 - в. право розпорядження.
 - г. Право першої шлюбної ночі
729. Виключним правом власника є:
- а. володіння
 - б. користування
 - в. розпорядження
 - г. всі перераховані
730. Право власності на природні ресурси, яке не передбачено законодавством України:
- а. приватна
 - б. державна
 - в. колективна
 - г. комунальна
731. Об'єктивне право власності на природні ресурси, це система норм:
- а. адміністративного законодавства
 - б. аграрного законодавства
 - в. водного законодавства
 - г. всі перераховані
732. Суб'єктивне право власності на природні ресурси засвідчується:
- а. сертифікатом
 - б. державним актом на право власності
 - в. рішенням правління акціонерного товариства, с.-г. кооперативу
 - г. содовим рішенням
733. Не може бути змістом права власності на природні ресурси:
- а. право володіння
 - б. право користування
 - в. право розпорядження
 - г. право управління
734. Методи забезпечення права власності на природні ресурси:
- а. цивільно-правові
 - б. методи переконання і примусу
 - в. заохочення (подяка, цінний подарунок тощо)
 - г. нетрадиційні методи
735. Форми охорони права власності на природні ресурси:

- а. нормативно-регулятивна
- б. дотримання технологічної дисципліни
- в. збереження майна власника
- г. цивільно-правова

736. Україна за межами її території:

- а. може мати земельні ділянки на праві державної власності
- б. не може мати земельних ділянок
- в. може тільки орендувати земельні ділянки
- г. може володіти виключно островами та береговою лінією

737. Право власності на природні ресурси припиняється:

- а. внаслідок укладення договору дарування;
- б. внаслідок конфіскації;
- в. внаслідок складання заповіту
- г. всі перераховані вище

738. Право природокористування це:

- а. засоби та методи використання природних ресурсів суб'єктами екологічного права
- б. процес раціонального використання людиною природних ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів
- в. спосіб раціонального використання суб'єктами екологічного права об'єктів довкілля тільки для особистих потреб
- г. все перераховане вище

739. Ознаками спеціального природокористування є:

- а. здійснюється на підставі спеціальних дозволів
- б. здійснюється безоплатно
- в. здійснюється без закріплення природних ресурсів за окремими особами
- г. гарантується всім громадянам без виключення

740. Залежно від мети природокористування розрізняють:

- а. наукове
- б. строкове
- в. спеціальне
- г. всі перераховані вище

741. Ознаками загального природокористування є:

- а. здійснюється на підставі спеціальних дозволів
- б. здійснюється безоплатно
- в. здійснюється без закріплення природних ресурсів за окремими особами
- г. гарантується всім громадянам без виключення

742. Залежно від об'єкта природокористування розрізняють:

- а. наукове
- б. строкове
- в. землекористування
- г. всі перераховані вище

743. Об'єктивне право природокористування:

- а. сукупність прав і обов'язків щодо використання об'єктів природокористування
- б. сукупність прав і обов'язків щодо виникнення права природокористування

- в. сукупність прав і обов'язків щодо захисту порушеного суб'єктивного права природокористування
- г. всі перераховані вище

744. Суб'єктивне право природокористування:

- а. норми, які визначають підстави виникнення, зміни права природокористування
- б. сукупність повноважень окремої особи щодо використання, відтворення природних ресурсів
- в. сукупність прав і обов'язків щодо використання об'єктів природокористування
- г. сукупність прав і обов'язків щодо захисту порушеного суб'єктивного права природокористування

745. Принципи права природокористування:

- а. стабільність права природокористування
- б. безоплатність будь – якого природокористування
- в. дотримання правил протипожежної безпеки
- г. отримання матеріальної вигоди

746. Суб'єкти права спеціального природокористування

- а. громадяни України при досягненні повної цивільної дієздатності
- б. громадяни України при досягненні 16 років
- в. громадяни, частково обмежені в право дієздатності
- г. тільки громадяни України при досягненні повноліття.

747. Об'єкти загального природокористування:

- а. землі с.-г. призначення
- б. садові земельні ділянки
- в. міські парки
- г. всі перераховані вище

748. Об'єкти спеціального природокористування:

- а. землі особистого підсобного господарства
- б. шляхи
- в. парки
- г. гербарії

749. Суб'єкти права загального природокористування:

- а. тільки громадяни України при отриманні повної дієздатності
- б. фізичні особи при досягненні 16 років та юридичні особи
- в. всі фізичні особи, в тому числі громадяни, частково обмежені в дієздатності
- г. пенсіонери та діти

750. Обов'язки природокористувача (власника) :

- а. своєчасно вносити плату за використання природних ресурсів
- б. дотримуватись правил протипожежної безпеки та санітарних норм
- в. зберігати майно власника
- г. проводити санітарні заходи, щодо об'єктів флори та фауни

751. Підстави виникнення права природокористування:

- а. видання рішення (постанови) компетентних державних органів
- б. прийняття відповідного закону

- в. укладання цивільної угоди
- г. на підставі рішення місцевої влади

752. Припинення права природокористування:

- а. видання рішення (постанови) компетентних державних органів
- б. прийняття відповідного закону
- в. укладання цивільної угоди
- г. закінчення строку користування

753. Закріплені чинним законодавством, а також потенційно можливі заходи економічного регулювання відносин у галузі екології можна підрозділити на декілька груп:

- а. економічні санкції
- б. екологічні стимули
- в. економічні гарантії
- г. всі перераховані вище

754. Заходи фінансового характеру в галузі екологічного права називають:

- а. штрафними санкціями
- б. правовою відповідальністю
- в. видача заробітної плати
- г. немає правильної відповіді

755. Економічні санкції за своєю юридичною природою мають:

- а. штрафний характер
- б. кримінальний характер
- в. податковий характер
- г. цивільний характер

756. До економічних стимулів необхідно віднести:

- а. податкові пільги
- б. штрафні санкції
- в. пенсійні пільги
- г. податкові стягнення

757. Заходи, які дозволяють створити адекватні фінансові умови в сфері охорони довкілля це:

- а. економічні санкції
- б. екологічні стимули
- в. економічні врегулювання
- г. пенсійні реформи

758. До числа економічних гарантій належать:

- а. всі перераховані нижче
- б. екологічний аудит
- в. екологічна експертиза
- г. екологічний моніторинг

759. Структура зборів, а також процедура їх внесення регулюються:

- а. Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- б. Земельним кодексом
- в. Конституцією України
- г. Всі перераховані вище

760. При дотриманні лімітів використання природних ресурсів плата:
- а. відноситься на витрати виробництва
 - б. стягується з прибутку
 - в. стягується за рахунок продукції або майна підприємства
 - г. із конфіскованого майна
761. Нормативи плати за використання природних ресурсів мають визначатися з урахуванням:
- а. поширеності природних ресурсів
 - б. місцезнаходження переробки і утилізації відходів
 - в. можливості відтворення
 - г. всі перераховані вище
762. За нецільове використання коштів, що надходять від земельного податку у відповідний бюджет, фінансовими органами нараховується штраф у розмірі:
- а. 170 грн.
 - б. 100 неоподатованим мінімумів доходів громадян
 - в. 100 % використаних сум
 - г. 150 % від отриманих прибутків
763. Кошти від плати за землю використовуються виключно для:
- а. фінансування заходів з раціонального використання земель
 - б. підвищення родючості ґрунтів
 - в. ремонтування шляхів
 - г. будівництво санітарних споруд
764. При понадлімітному використанні та зниженні якості природних ресурсів збори стягуються з:
- а. плата відноситься на витрати виробництва
 - б. плата стягується з прибутку
 - в. з державного бюджету
 - г. з місцевого бюджету
765. Збори за забруднення навколишнього природного середовища, які стягуються за аварійне, наднормативне забруднення відносяться до:
- а. обов'язкових зборів
 - б. фіксованих зборів
 - в. штрафних зборів
 - г. народних зборів
766. Встановлення лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин, що це призводить до забруднення природних ресурсів державного значення і територій інших областей проводиться:
- а. КМУ
 - б. Мінприроди України
 - в. Верховною Радою АРК, обласними, міськими радами за поданням Мінприроди.
 - г. все перераховані вище
767. За понадлімітні обсяги викидів, скидів і розміщення відходів збір за забруднення НПС обчислюється:
- а. в 2-кратному розмірі
 - б. в 5-ти кратному розмірі
 - в. в 10-ти кратному розмірі
 - г. в 20-кратному розмірі

768. Збори за забруднення НПС до місцевих фондів охорони НПС платники (крім розташованих у містах загальнодержавного значення) перераховують у розмірах:

- а. 10 %
- б. 20 %
- в. 50 %
- г. 70 %

769. Платники збору, розташовані у містах Києві і Севастополі, збори за забруднення НПС перераховують до Державного фонду охорони НПС, що утворюються у складі Держбюджету України, на окремий рахунок у розмірі:

- а. 10%
- б. 20 %
- в. 30 %
- г. 50 %

770. Порядок встановлення нормативів збору за погіршення якості природних ресурсів визначається:

- а. мінприроди України
- б. КМУ
- в. органами місцевого самоврядування
- г. президентом України

771. За якісними показниками стан довкілля можна представити такими рівнями:

- а. чисте, сприятливе, безпечне
- б. найвищий, середній, чистий
- в. небезпечне, безпечне
- г. всі перераховані вище

772. До ознак безпечного навколишнього природного середовища відноситься:

- а. стабільність здорового навколишнього середовища
- б. якість природного ресурсу
- в. лімітування антропогенного навантаження
- г. велике число зборів за порушення ПЗ

773. Які нормативи екологічної безпеки Ви знаєте:

- а. гранично дозволений викид
- б. гранично дозволена концентрація
- в. гранично дозволений рівень радіаційного впливу
- г. все перераховані вище нормативи

774. До яких екологічних факторів належить клімат, опади?

- а. абіотичні
- б. біотичні
- в. антропогенні
- г. едафічні

775. Вплив хижака на жертву належить до:

- а. біотичного фактору
- б. абіотичного фактору
- в. антропогенного фактору
- г. кліматичного фактору

776. Пристосування організмів до умов середовища – це:

- а. адаптація
- б. реакція
- в. конкуренція
- г. симбіоз

777. Вкажіть, які фактори належать до абіотичних:

- а. фітоценози
- б. ґрунт, що включає ґрунтові організми
- в. ґрунтова волога, повітря
- г. гідробіонти

778. Взаємодія, яка зводиться до того, що один організм споживає ресурс, який міг би бути доступним для іншого організму, називається:

- а. симбіоз
- б. конкуренція
- в. коменсалізм
- г. паразитизм

779. До біотичного фактору відноситься:

- а. коменсалізм
- б. температура
- в. ґрунт
- г. світло

780. Види, які здатні жити в місцях з найрізноманітнішими умовами середовища, називають:

- а. стенотопними
- б. мезотрофними
- в. гігрофітними
- г. евритопними

781. Види, що можуть жити лише в місцях із специфічними, дуже обмеженими умовами середовища, називають:

- а. стенотопними
- б. мезотрофними
- в. гігрофітними
- г. евритопними

782. Взаємовпливи живих організмів один на одного належать до:

- а. біотичного фактору
- б. абіотичного фактору
- в. антропогенного фактору
- г. кліматичного фактору

783. Залежно від переважного місця перебування живі організми водних екосистем поділяються на такі екологічні групи:

- а. планктон, нектон, бентос
- б. нейстон, планктон, едофон
- в. едафон, нектон, бентос
- г. плейстон, бентос, едафон

784. Водні організми, які живуть у товщі води, здатні протистояти силі течії і самостійно переміщатися на значні відстані – це:

- а. нектон
- б. планктон
- в. бентос
- г. нейстон

785. Сукупність організмів, які населяють товщу води і пасивно переносяться течіями, називають:

- а. нектон
- б. планктон
- в. бентос
- г. петрофіти

786. Організми, що мешкають на дні водойм, називають:

- а. нектон
- б. планктон
- в. бентос
- г. нейстон

787. Представники нектону:

- а. одноклітинні водорості
- б. деякі найпростіші
- в. сифонофори
- г. риби

788. До планктону належать:

- а. деякі найпростіші
- б. риби
- в. черепахи
- г. дельфіни

789. Організми, які постійно живуть у водному середовищі, називаються:

- а. мезофіти
- б. педобіонти
- в. аеробіонти
- г. гідробіонти

790. Окунь належить до:

- а. планктону
- б. нектону
- в. нейстону
- г. бентосу

791. Рослини, пристосовані до зростання на ґрунтах з високим вмістом легкорозчинних солей:

- а. нітрофіли
- б. галофіти
- в. хазмофіти
- г. псаммофіти

792. Рослини, що ростуть на кам'янистих подрібнених субстратах називаються:

- а. нітрофіли
 - б. галофіти
 - в. хазмофіти
 - г. псаммофіти
793. Рослини, що ростуть на ґрунтах з недостатнім зволоженням – це:
- а. мезофіти
 - б. гігрофіти
 - в. гідрофіти
 - г. ксерофіти
794. Екологічні групи рослин за відношенням до вологи ґрунту:
- а. гігрофіти, мезофіти, ксерофіти
 - б. галофіти, геліофіти, гігрофіти
 - в. ксерофіти, мезофіти, геліофіти
 - г. мезофіти, сціофіти, ксерофіти
795. Екологічні групи рослин по відношенню до освітлення:
- а. мезофіти, геліофіти
 - б. геліофіти, сціофіти
 - в. сціофіти, ксерофіти
 - г. гігрофіти, геліофіти
796. За вимогами до родючості ґрунтів рослини поділяються на:
- а. мезотрофи, геліофіти, оліготрофи
 - б. еутрофи, мезотрофи, оліготрофи
 - в. ксерофіти, еутрофи, гігрофіти
 - г. гігрофіти, ксерофіти, мезофіти
797. Рослини, що добре ростуть на ґрунтах, багатих на кальцій, називаються:
- а. кальцефіли
 - б. кальцефоби
 - в. нітрофіли
 - г. геліофіти
798. До якої екологічної групи тварин мешканців ґрунту відноситься кріт:
- а. макрофауна
 - б. мезофауна
 - в. мікрофауна
 - г. мегафауна
799. Рослини незасолених ґрунтів, неадаптовані до підвищеної концентрації солей у ґрунтах – це:
- а. галофіти
 - б. глікофіти
 - в. нітрофіли
 - г. базифіли
800. Рослини, особливо вимогливі до підвищеного вмісту азоту в ґрунті, називають:
- а. нітрофіли
 - б. базифіли
 - в. нейтрофіли
 - г. галофіти

801. Рослини, які надають перевагу умовам лужних ґрунтів – це:
- а. базифіти
 - б. нейтрофіли
 - в. кальцефіли
 - г. мезофіти
802. Рослини, які пристосувалися до ґрунтів з кислою реакцією ґрунтового розчину, називаються:
- а. нейтрофіли
 - б. ацидофіли
 - в. нітрофіли
 - г. базифіли
803. Тварини, які постійно живуть у ґрунті:
- а. геобіонти
 - б. геофіли
 - в. геоксени
 - г. галофіти
804. Тварини, які мешкають у ґрунті протягом певного етапу життєвого циклу:
- а. геобіонти
 - б. геофіли
 - в. геоксени
 - г. галофіти
805. Тварини, які тимчасово переховуються у ґрунті:
- а. геобіонти
 - б. геофіли
 - в. геоксени
 - г. галофіти
806. Що властиво для оліготрофних рослин?
- а. потребують невеликої кількості мінеральних речовин
 - б. потребують великої кількості мінеральних речовин
 - в. потребують помірної кількості мінеральних речовин
 - г. потребують помірної кількості вологи
807. Розповсюдження насіння, плодів і спор рослин повітряними течіями – це:
- а. гідохорія
 - б. зоохорія
 - в. анемохорія
 - г. автохорія
808. Як називаються організми, що пасивно переносяться потоками повітря?
- а. плейстон
 - б. анемохорія
 - в. аеропланктон
 - г. нектон
809. Знайдіть помилку в твердженні "газовий склад повітря такий":
- а. азоту – 78,09 %
 - б. кисню – 20,96 %

- в. вуглекислого газу – 0,3 %
- г. інертних газів – 0,9 %.

810. Такий тип взаємозв'язків між організмами різних видів, за якого один із них використовує іншого, його житло, залишки їжі чи продукти життєдіяльності, не завдаючи йому помітної шкоди, називають:

- а. коменсалізм
- б. мутуалізм
- в. паразитизм
- г. нейтралізм

811. Рослини, що ростуть на ґрунтах середньої родючості:

- а. еутрофи
- б. мезотрофи
- в. оліготрофи
- г. ксерофіти

812. До нектону не належать:

- а. акула
- б. дельфін
- в. риби
- г. корали

813. Ґрунтові організми розміром від 4 до 80 мм – це:

- а. мікрофауна
- б. мезофауна
- в. макрофауна
- г. мегафауна

814. Визначте явище, коли організм одного виду оселяється в організмі іншого виду та завдає йому шкоди:

- а. мутуалізм
- б. коменсалізм
- в. паразитизм
- г. конкуренція

815. Евригалінні види водойм – це:

- а. організми, що здатні адаптуватись до широкого спектру солоності води
- б. організми, що живуть в умовах дуже незначних змін солоності води
- в. організми, що витримують сильний ступінь дефіциту кисню
- г. організми, які витримують лише слабкий ступінь забруднення

816. Тварини, які живляться рослинною їжею називаються:

- а. фітофаги
- б. зоофаги
- в. сапрофаги
- г. псамофіти

817. Сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють певну ділянку суші або водоймища і характеризуються певними відносинами між собою – це:

- а. біоценоз
- б. біотоп

- в. популяція
- г. вид

818. Як називається ділянка абіотичного середовища, яку займає угруповання живих організмів:

- а. біоценоз
- б. біотоп
- в. біогеоценоз
- г. популяція

819. Сукупність методів і прийомів досліджень для кількісної оцінки токсичності й небезпеки шкідливих речовин:

- а. екологічна токсикологія
- б. моніторинг
- в. екологічний менеджмент
- г. токсикометрія

820. Наука, яка структурно вивчає шляхи надходження та міграцію токсикантів у довкіллі, закономірності їх впливу на світ живої природи, а також визначає характер змін у живих організмах на екосистемному рівні:

- а. екологічний моніторинг
- б. екотоксикологія
- в. демекологія
- г. ландшафтна екологія

821. Хімічні сполуки, які навіть в невеликій кількості володіють високою персистентністю і кумуляцією; можуть спричиняти мутагенну, тератогенну і канцерогенну дію на живі організми:

- а. супертоксиканти
- б. токсиканти
- в. полютанти
- г. канцерогени

822. Чужорідна для біосфери хімічна речовина, що природно не синтезується і не може асимілюватись організмами, внаслідок чого не бере участь у природному кругообігу речовин, а тому вільно накопичується у компонентах довкілля:

- а. супертоксикант
- б. токсикант
- в. ксенобіотик
- г. забруднююча речовина

823. До ксенобіотиків належить (вірно все крім):

- а. пластмаса
- б. препарати побутової хімії
- в. пестициди
- г. важкі метали

824. До ксенобіотиків не належить:

- а. лікарські засоби
- б. препарати побутової хімії
- в. оксиди азоту
- г. пестициди

825. Дія, яка передбачає безпосереднє ураження організмів певної (або декількох) популяцій екотоксикантами (або їх сукупністю) відповідного ксенобіотичного профілю середовища називаються:

- а. прямою
- б. опосередкованою
- в. змішаною
- г. гострою

826. Дія токсикантів, яка проявляється, зазвичай, внаслідок дії ксенобіотичного профілю на біотичні або абіотичні елементи, коли умови і ресурси середовища перестають бути оптимальними для існування популяції називається:

- а. прямою
- б. опосередкованою
- в. змішаною
- г. гострою

827. Якщо токсиканти здатні спричиняти одночасно як пряму, так і опосередковану дію то йдеться про:

- а. пряму дію
- б. опосередковану дію
- в. змішану дію
- г. гостру дію

828. Більшість токсикантів здатні спричиняти одночасно: пряму дію опосередковану дію =змішану дію гостру дію } 837. При інтоксикації організму виділяють періоди (вірно все крім):

- а. контакту з речовиною
- б. прихований
- в. отруєння
- г. період одужання

829. Залежно від тривалості взаємодії хімічної речовини і організму інтоксикації можуть бути:

- а. гострими і хронічними
- б. прямими і опосередкованими
- в. опосередкованими і змішаними
- г. прямими і хронічними

830. Інтоксикація, що розвивається в результаті одноразової або повторної дії речовини протягом обмеженого періоду часу (зазвичай не більше доби):

- а. гостра
- б. хронічна
- в. опосередкована
- г. пряма

831. Інтоксикація, що розвивається поступово, при тривалій дії отруту:

- а. гостра
- б. хронічна
- в. опосередкована
- г. пряма

832. За походженням токсиканти класифікують:

- а. біологічні та синтетичні
 - б. рідкі, газоподібні, тверді
 - в. суспензії, емульсії, аерозолі
 - г. тератогенні, канцерогенні
833. За агрегатним станом токсиканти класифікують:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. рідкі, газоподібні, тверді
 - в. суспензії, емульсії, аерозолі
 - г. тератогенні, канцерогенні
834. За способом використання людиною токсиканти класифікують:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. інгредієнти хімічного синтезу та спеціальних видів виробництв; пестициди; ліки і косметика; харчові добавки тощо
 - в. суспензії, емульсії, аерозолі
 - г. тератогенні, канцерогенні
835. За хімічним складом токсиканти поділяються на:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. аерозолі, емульсії
 - в. суспензії, емульсії
 - г. оксиди, кислоти, луги, солі, важкі метали, органічні речовини
836. За дисперсним станом токсиканти класифікують:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. рідкі, газоподібні, тверді
 - в. суспензії, емульсії, аерозолі
 - г. тератогенні, канцерогенні
837. За рівнем токсичності токсиканти класифікують:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. інгредієнти хімічного синтезу та спеціальних видів виробництв; пестициди; ліки і косметика; харчові добавки тощо
 - в. практично не токсичні, злегка токсичні, мало токсичні, сильно токсичні, надзвичайно токсичні, супертоксичні
 - г. тератогенні, канцерогенні
838. За хімічним складом токсиканти класифікують:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. рідкі, газоподібні, тверді
 - в. суспензії, емульсії, аерозолі
 - г. оксиди, кислоти, луги, солі, важкі метали, органічні речовини
839. За проявом дії токсиканти класифікують:
- а. біологічні та синтетичні
 - б. фізіологічні, психо-фізіологічні, цитогенетичні, мутагенні, тератогенні, канцерогенні
 - в. рідкі, газоподібні, тверді
 - г. суспензії, емульсії, аерозолі
840. За характером впливу токсиканти класифікують:

- а. біологічні та синтетичні
 - б. інгредієнти хімічного синтезу та спеціальних видів виробництв; пестициди
 - в. психотропної дії, нервово-паралітичної дії, шкірно-резорбтивної дії
 - г. тератогенні, канцерогенні
841. За проявом дії токсиканти класифікують (вірно все крім):
- а. фізіологічні
 - б. психо-фізіологічні
 - в. цитогенетичні
 - г. синтетичні
842. За характером впливу токсиканти класифікують (вірно все крім):
- а. психотропної дії
 - б. нервово-паралітичної дії
 - в. шкірно-резорбтивної дії
 - г. супертоксичної дії
843. За агрегатним станом токсиканти класифікують (вірно все крім):
- а. рідкі,
 - б. газоподібні
 - в. суспензії
 - г. тверді
844. Властивість хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми:
- а. токсичність
 - б. канцерогенність
 - в. мутагенність
 - г. тератогенність
845. Речовини, при впливі яких токсичний ефект істотно залежить від фактору часу називаються:
- а. психотропної дії
 - б. концентраційні
 - в. хроноконцентраційні
 - г. супертоксичної дії
846. Речовини, дія яких залежить переважно від концентрації, а не від часу називаються:
- а. психотропної дії
 - б. концентраційні
 - в. хроноконцентраційні
 - г. супертоксичної дії
847. Фосген, ацетон і отрути, що блокують ферментні системи належать до:
- а. малонебезпечних
 - б. концентраційних
 - в. хроноконцентраційних
 - г. немає правильної відповіді
848. Синильна кислота (HCN), летючі наркотики, кокаїн належать до:
- а. малонебезпечних
 - б. концентраційних

- в. хроноконцентраційних
- г. немає правильної відповіді

849. Залежність між концентрацією шкідливої речовини, часом її впливу і токсичним ефектом при надходженні через дихальні шляхи отримала кількісне вираження у вигляді:

- а. формули Габера
- б. формули Беренса
- в. формури Кербера
- г. немає правильної відповіді

850. Параметри (критерії) токсикометрії, які визначаються безпосередньо в експерименті, називаються називаються:

- а. первинними
- б. вторинними
- в. лабораторними
- г. немає правильної відповіді

851. Концентрація речовини, що викликає загибель 50% піддослідних тварин (миші, щури) при двох-, чотиригодинному інгаляційному впливі та подальшому 14-ти денному терміні спостереження:

- а. середня смертельна концентрація в повітрі
- б. середня смертельна доза
- в. поріг гострої токсичної дії
- г. немає правильної відповіді

852. Концентрація речовини, що викликає загибель 50% піддослідних тварин (миші, щури) при двох-, чотиригодинному інгаляційному впливі та подальшому 14-ти денному терміні спостереження:

- а. CL50
- б. CL100
- в. DL50
- г. немає правильної відповіді

853. Доза речовини, що викликає загибель 50% піддослідних тварин при одноразовому введенні в шлунок, черевну порожнину та подальшому 14-ти денному терміні спостереження:

- а. середня смертельна концентрація в повітрі
- б. середня смертельна доза
- в. поріг гострої токсичної дії
- г. немає правильної відповіді

854. Доза речовини, що викликає загибель 50% піддослідних тварин при одноразовому введенні в шлунок, черевну порожнину та подальшому 14-ти денному терміні спостереження:

- а. CL50
- б. CL100
- в. DL50
- г. немає правильної відповіді

855. Концентрація, що викликає загибель всіх досліджених тварин:

- а. CL50
- б. CL100
- в. DL50
- г. немає правильної відповіді

856. Доза, що викликає загибель всіх досліджених тварин:
- а. CL50
 - б. CL100
 - в. DL100
 - г. немає правильної відповіді
857. Не є статистично значимими і можуть використовуватися як додаткові орієнтовні величини:
- а. CL50
 - б. DL50
 - в. CL100, DL100
 - г. немає правильної відповіді
858. Не є статистично значимими і можуть використовуватися як додаткові орієнтовні величини:
- а. CL50
 - б. CL0, DL0
 - в. DL50
 - г. немає правильної відповіді
859. Максимальна концентрація, що не призводить до загибелі тварин:
- а. KL0
 - б. CL0
 - в. DL0
 - г. немає правильної відповіді
860. Мінімальна концентрація (доза) речовини, що викликає при однократному двох-чотиригодинному інгаляційному або однократному внутрішньо-шлунковому впливі зміни обумовлених показників життєдіяльності організму, що виходять за межі фізіологічних відхилень:
- а. поріг гострої токсичної дії
 - б. поріг хронічної токсичної дії
 - в. поріг специфічної (вибіркової) дії
 - г. немає правильної відповіді
861. Мінімальна концентрація (доза) речовини, що викликає при безперервному фіксованому за тривалістю впливі (чотири-шість місяців) зміну обумовлених показників життєдіяльності організму, що виходять за межі фізіологічних відхилень:
- а. поріг гострої токсичної дії
 - б. поріг хронічної токсичної дії
 - в. поріг специфічної (вибіркової) дії
 - г. немає правильної відповіді
862. Мінімальна концентрація (доза) речовини, що викликає зміни біологічних функцій окремих органів і систем організму, що виходять за межі пристосувальних фізіологічних реакцій в умовах гострих та хронічних впливів:
- а. поріг гострої токсичної дії
 - б. поріг хронічної токсичної дії
 - в. поріг специфічної (вибіркової) дії
 - г. немає правильної відповіді
863. Відношення середньої смертельної концентрації (дози) до порогу гострої дії речовини:
- а. зона хронічної дії
 - б. зона гострої дії

- в. поріг специфічної (вибіркової) дії
- г. немає правильної відповіді

864. Відношенням порогу гострої дії до порогу хронічної дії токсиканта:

- а. зона хронічної дії
- б. зона гострої дії
- в. поріг специфічної (вибіркової) дії
- г. немає правильної відповіді

865. Відношення порога однократної дії, встановленого за інтегральними показниками, до порога гострої дії по специфічних (системних, органних, рецепторних) показниках:

- а. зона хронічної дії
- б. зона гострої дії
- в. зона специфічної дії
- г. немає правильної відповіді

866. Відношення середньої смертельної концентрації (дозы) до граничної концентрації (дозы) при хронічному впливі:

- а. зона біологічної дії
- б. зона гострої дії
- в. поріг специфічної (вибіркової) дії
- г. немає правильної відповіді

867. Кербер розробив метод обчислення:

- а. CL50
- б. CL0
- в. DL50
- г. DL0

868. Максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму або маси, яка при щоденному впливі протягом необмеженого часу не викликає будь-яких змін в організмі людини і несприятливих спадкових змін у потомства:

- а. ГДК
- б. ЛОШ
- в. ТДК
- г. немає правильної відповіді

869. Гранично допустима середня добова концентрація хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць, яка при вдиханні протягом невизначено тривалого періоду (все життя) не викликає прямого або опосередкованого шкідливого впливу на організм людини:

- а. ГДКсд
- б. ГДКмр
- в. ГДКрз
- г. ТДК

870. Гранично допустима максимальна разова концентрація хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць, яка при вдиханні протягом 30 хв. не викликає рефлекторних реакцій в організмі людини:

- а. ГДКсд
- б. ГДКмр
- в. ГДКрз
- г. ТДК

871. Гранично допустима концентрація хімічних речовин в повітрі робочої зони, яка за щоденного 8-годинного перебування на роботі (не більш як 41 година на тиждень) протягом усього робочого стажу не може спричинити захворювань чи відхилень у стані здоров'я людей для нинішнього та наступного покоління:

- а. ГДКсд
- б. ГДКмр
- в. ГДКрз
- г. ТДК

872. У випадках, коли значення ГДК в літературі відсутні (не визначені і (або) не затверджені), в більшості практичних ситуацій допускається користування значеннями:

- а. ОБРВ
- б. ЛОШ
- в. ТДК
- г. немає правильної відповіді

873. Відношення сумарної дози отрути, що викликає певний ефект (частіше смертельний) у 50% піддослідних тварин при багаторазовому добовому введенні, до величини дози, що викликає той же ефект при одноразовому впливі:

- а. коефіцієнт кумуляції
- б. ступінь кумуляції
- в. ступінь депонування
- г. немає правильної відповіді

874. Величина, зворотна інтенсивності кумуляції: чим вона менше, тим кумуляція більше:

- а. коефіцієнт кумуляції
- б. ступінь кумуляції
- в. ефект депонування
- г. немає правильної відповіді

875. Коли компоненти діють на одну і ту ж систему рецепторів таким чином, що один компонент може бути замінений іншим без зміни виду токсичної дії, а загальний ефект є простою сумою окремих впливів:

- а. сумація
- б. незалежна дія
- в. синергізм
- г. антагонізм

876. Коли результат впливу кожного фактору (речовини) не залежить від дії будь-якого іншого фактору (речовини), тобто компоненти діють на різні ланки в механізмі взаємодії отрути і організму таким чином, що провокують ефекти, не пов'язані один з одним:

- а. сумація
- б. незалежна дія
- в. синергізм
- г. антагонізм

877. Посилення ефекту спільного впливу; ефект більше, ніж сумація:

- а. сумація
- б. незалежна дія
- в. синергізм
- г. антагонізм

878. Ослаблення ефекту спільного впливу; ефект менше адитивного:
- а. сумація
 - б. незалежна дія
 - в. синергізм
 - г. антагонізм
879. Езерин значно знижує дію атропіну, тобто є його протиотрутою (спостерігається явище):
- а. сумації
 - б. незалежної дії
 - в. синергізму
 - г. антагонізму
880. Алкоголь значно підвищує небезпеку отруєння аніліном (спостерігається явище):
- а. сумації
 - б. незалежної дії
 - в. синергізму
 - г. антагонізму
881. Якщо при комбінованій дії токсичних речовин спостерігається ефект адитивності (сумації), їх зміст регламентується формулою:
- а. Авер'янова
 - б. Кербера
 - в. Габера
 - г. немає правильної відповіді
882. Визначається ймовірністю екстремальної шкоди – смерті індивідуума від деякої причини, що розраховується для всієї тривалості його життя або для одного року:
- а. індивідуальний ризик
 - б. колективний ризик
 - в. екологічний ризик
 - г. немає правильної відповіді
883. Визначають за кількістю смертей від деякої причини, що діє протягом певного інтервалу часу на певну кількість людей:
- а. індивідуальний ризик
 - б. колективний ризик
 - в. екологічний ризик
 - г. немає правильної відповіді
884. Речовини, вплив яких достовірно збільшує частоту виникнення пухлин (доброякісних та/або злоякісних) в популяціях людини та/або тварин та/або скорочує час їх розвитку:
- а. тератогени
 - б. канцерогени
 - в. мутагени
 - г. немає правильної відповіді
885. Ризик не прийнятний для виробничих умов та населення:
- а. високий
 - б. середній
 - в. низький
 - г. немає правильної відповіді

886. Ризик допустимий для виробничих умов, при впливі на все населення необхідно здійснювати динамічний контроль і поглиблено вивчати джерела й можливі наслідки шкідливих впливів для вирішенні питання про заходи з управління ризиком:

- а. високий
- б. середній
- в. низький
- г. немає правильної відповіді

887. Допустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються гігієнічні нормативи для населення):

- а. високий
- б. середній
- в. низький
- г. немає правильної відповіді

888. Індивідуальний канцерогенний ризик розраховують за формулою:

- а. $r = m \cdot Fr$
- б. $R = r \cdot N$
- в. $r = Fr \cdot D$
- г. немає правильної відповіді

889. Колективний канцерогенний ризик розраховують за формулою:

- а. $r = m \cdot Fr$
- б. $R = r \cdot N$
- в. $r = Fr \cdot D$
- г. немає правильної відповіді

890. Фізичні і хімічні чинники, що викликають стійкі спадкові зміни — мутації:

- а. тератогени
- б. канцерогени
- в. мутагени
- г. немає правильної відповіді

891. Фізичні і хімічні чинники, що викликають порушення ембріонального розвитку:

- а. тератогени
- б. канцерогени
- в. мутагени
- г. немає правильної відповіді

892. Речовини, які викликають онкологічні захворювання:

- а. тератогени
- б. канцерогени
- в. мутагени
- г. немає правильної відповіді

893. Перевірка виконання природоохоронних, природоресурсних, екологічнобезпечних вимог підприємствами, організаціями, установами, громадянами:

- а. екологічне інспектування
- б. екологічний моніторинг
- в. екологічний менеджмент
- г. немає правильної відповіді

894. Державний інспектор повинен мати стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста першої категорії не менше:

- а. трьох років
- б. двох років
- в. чотирьох років
- г. немає правильної відповіді

895. Проба, яка характеризує склад та властивості води у даному місці на момент відбору. Її отримують однократним відбором усього необхідного для аналізу об'єму води у заданій точці місця відбору:

- а. разова
- б. усереднена
- в. змішана
- г. немає правильної відповіді

896. Проба, яка характеризує склад та властивості води з урахуванням неоднорідності її кількісних та якісних характеристик у часі, просторі:

- а. разова
- б. усереднена
- в. змішана
- г. немає правильної відповіді

897. Проба води з відкритої водойми повинна бути відібрана до:

- а. 12 години дня
- б. 11 години дня
- в. 10 години дня
- г. 9 години дня

898. Об'єм проби при ручному відборі має бути більшим за об'єм необхідний для одного визначення усіх показників:

- а. у чотири рази
- б. у п'ять разів
- в. у два рази
- г. у три рази

899. Проби повинні доставлятися до лабораторії не пізніше, ніж:

- а. через 3 години після відбору
- б. через 2 години після відбору
- в. через 5 години після відбору
- г. через 6 години після відбору

900. У технічному паспорті промислових відходів повинні бути такі розділи:

- а. первинні дані про відходи
- б. відомості про місце утворення відходів, характеристика відходів
- в. відомості про існуючі та можливі технології переробки і використання відходів тощо
- г. усі відповіді правильні

901. Відходи 1 класу небезпеки зберігаються:

- а. у герметичній тарі
- б. пластикових пакетах

- в. навалом
- г. в паперових мішках

902. Відходи 2 класу небезпеки зберігаються:

- а. у герметичній тарі
- б. в закритій тарі (ящики, мішки)
- в. навалом
- г. в паперових мішках

903. Відходи третього класу небезпеки зберігаються:

- а. у герметичній тарі
- б. в закритій тарі (ящики, мішки)
- в. навалом
- г. в паперових мішках

904. Відходи четвертого класу небезпеки зберігаються:

- а. у герметичній тарі
- б. в закритій тарі (ящики, мішки)
- в. навалом або відкрито
- г. в паперових мішках

905. Відходи 4 класу небезпеки зберігаються:

- а. відкрито
- б. у герметичній тарі
- в. в паперових мішках
- г. в мішках з тканини

906. Відходи 3 класу небезпеки зберігаються:

- а. у герметичній тарі
- б. навалом
- в. в мішках з тканини та паперових мішках
- г. немає правильної відповіді

907. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів:

- а. Державна екологічна інспекція
- б. Міністерство екології та природних ресурсів
- в. Департамент екології та природних ресурсів
- г. немає правильної відповіді

908. Основними завданнями Держекоінспекції є здійснення:

- а. державного нагляду за додержанням вимог законодавства щодо охорони земель,
- б. державного нагляду за додержанням вимог законодавства щодо надр;
- в. державного нагляду за додержанням вимог законодавства щодо об'єктів ПЗФ
- г. усі відповіді правильні

909. Держекоінспекцію очолює:

- а. голова
- б. директор

- в. начальник
 - г. усі відповіді правильні
910. Очільник Держекоінспекції призначається на посаду та звільняється з посади:
- а. Кабінетом Міністрів України
 - б. Президентом України
 - в. Міністром екології
 - г. немає правильної відповіді
911. Пропозицію кандидата на посаду голови Держекоінспекції вносять:
- а. Верховна рада
 - б. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
 - в. Міністр екології
 - г. Президент
912. Очільник Держекоінспекції має:
- а. двох заступників
 - б. трьох заступників
 - в. одного заступника
 - г. немає правильної відповіді
913. Заступники очільника Держекоінспекції призначаються:
- а. Кабінетом Міністрів України
 - б. Президентом України
 - в. Міністром екології
 - г. немає правильної відповіді
914. Пропозицію кандидатів на посаду заступників голови Держекоінспекції вносять:
- а. Верховна рада
 - б. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
 - в. Міністр екології
 - г. Президент
915. Заступники Голови Держекоінспекції звільняються з посади
- а. Головою Держекоінспекції
 - б. Кабінетом Міністрів України
 - в. Президентом України
 - г. немає правильної відповіді
916. Пропозицію на звільнення заступників голови Держекоінспекції вносять:
- а. Голова Держекоінспекції
 - б. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
 - в. Міністр екології
 - г. Президент
917. Держекоінспекція є юридичною особою публічного права та має:
- а. печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням
 - б. власні бланки
 - в. рахунки в органах Казначейства
 - г. усі відповіді правильні
918. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють:

- а. громадські інспектори з охорони довкілля
 - б. державні інспектори
 - в. державні службовці
 - г. усі відповіді правильні
919. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли:
- а. 16 років
 - б. 18 років
 - в. 20 років
 - г. 17 років
920. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України:
- а. мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції
 - б. мають досвід природоохоронної роботи
 - в. пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції
 - г. усі відповіді правильні
921. Громадські інспектори призначаються:
- а. Головним державним екологічним інспектором України
 - б. Комісією з питань вищого корпусу державної служби
 - в. Міністром екології
 - г. Президентом
922. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном:
- а. на 3 роки
 - б. на 1 рік
 - в. на 2 роки
 - г. на 5 років
923. Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах:
- а. без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці
 - б. без увільнення від основної роботи з додатковою оплатою праці
 - в. без увільнення від основної роботи
 - г. з увільнення від основної роботи та з додатковою оплатою праці
924. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається:
- а. Головним державним екологічним інспектором України
 - б. Комісією з питань вищого корпусу державної служби
 - в. Міністром екології
 - г. Президентом
925. Громадські інспектори мають право:
- а. перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу
 - б. складати протоколи про адміністративні правопорушення
 - в. доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства
 - г. усі відповіді правильні
926. Громадськими інспекторами можуть бути:
- а. громадяни України, які мають досвід природоохоронної роботи
 - б. громадяни України, які пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції

- в. громадяни України, які досягли повноліття
 - г. усі відповіді правильні
927. Громадські інспектори для підтверження їх повноваження отримують:
- а. посвідчення
 - б. свідоцтво
 - в. диплом
 - г. немає правильної відповіді
928. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються такими нормативно-правовими актами:
- а. Конституцією України
 - б. законами України
 - в. актами Президента України і Кабінету Міністрів України
 - г. усі відповіді правильні
929. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до відповідного органу Держекоінспекції:
- а. письмову заяву
 - б. подання організації, що його рекомендує
 - в. письмову заяву та подання організації, що його рекомендує
 - г. усі відповіді правильні
930. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються:
- а. Конституцією України
 - б. законами України
 - в. Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля
 - г. усі відповіді правильні
931. До основних прав громадських інспекторів належать:
- а. перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу
 - б. складати протоколи про адміністративні правопорушення
 - в. доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства
 - г. усі відповіді правильні
932. Громадські інспектори мають право:
- а. зупиняти транспортні засоби
 - б. проводити огляд речей
 - в. доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства
 - г. усі відповіді правильні
933. Громадські інспектори не мають права:
- а. зупиняти транспортні
 - б. проводити огляд речей
 - в. доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства
 - г. немає правильної відповіді
934. Найбільші об'єми гірничо-видобувних відходів сконцентровані в обл.:
- а. Донецькій
 - б. Дніпропетровській
 - в. Запорізькій
 - г. усі відповіді правильні

935. Супутні гірничі породи та залишкові продукти (шлам, пил, відсів тощо) належать до:

- а. відходів виробництва
- б. відходів споживання
- в. побутових відходів
- г. немає правильної відповіді

936. Дії, спрямовані на запобігання їх утворенню, збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів, їх утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення:

- а. поводження з відходами
- б. рекуперація відходів
- в. переробка відходів
- г. розміщення відходів

937. Остаточне розміщення побутових відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях (полігонах) таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів:

- а. поводження з відходами
- б. рекуперація відходів
- в. переробка відходів
- г. захоронення відходів

938. Класифікація відходів за галузями промисловості:

- а. тверді, рідкі, газоподібні
- б. відходи паливної, металургійної, хімічної та інших галузей
- в. горючі й негорючі
- г. високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні

939. Класифікація промислових відходів проводять за галузями промисловості:

- а. відходи харчової, текстильної та інших галузей промисловості
- б. тверді, рідкі, газоподібні
- в. горючі й негорючі
- г. високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні

940. Класифікація промислових відходів проводять за агрегатним станом:

- а. тверді, рідкі, газоподібні
- б. відходи паливної, металургійної, хімічної та інших галузей
- в. горючі й негорючі
- г. високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні

941. Класифікація промислових відходів проводять за за небезпечністю:

- а. відходи харчової, текстильної та інших галузей промисловості
- б. тверді, рідкі, газоподібні
- в. горючі й негорючі
- г. надзвичайно небезпечні, високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні

942. Класифікація промислових відходів проводять за конкретними виробництвами:

- а. тверді, рідкі, газоподібні
- б. відходи паливної, металургійної, хімічної та інших галузей
- в. відходи виробництва сірчаної кислоти, содового, фосфорокислотного й інших виробництв
- г. високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні

943. Процес розкладання органічних сполук під дією високих температур при відсутності або недостатності кисню:

- а. піроліз
- б. горіння
- в. окиснення
- г. відновлення

944. Наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування систем - це:

- а. ембріологія
- б. анатомія
- в. мірмекологія
- г. екологія

945. Екологічні фактори, що пов'язані з різними формами господарської діяльності людини:

- а. едафічні
- б. абіотичні
- в. антропогенні
- г. біотичні

946. Певна територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов'язаними популяціями різних видів, об'єднаних між собою та з фізичним середовищем існування, коло обігом речовин і потоком енергії:

- а. біогеоценоз
- б. біотоп
- в. едатон
- г. евритоп

947. Ділянка земної поверхні (суші або водойми) з однотипними абіотичними умовами середовища (рельєф, ґрунт, мікроклімат і т.п.), що її займає певне угруповання організмів:

- а. синузія
- б. біотоп
- в. едатон
- г. евритоп

948. Термін "екологія" вперше запропонував:

- а. Е. Геккель
- б. О.М. Сєверцов
- в. К. Рул'є
- г. Ж. Бюффон

949. Наукові праці "Система природи" та "Філософія ботаніки" належать:

- а. Р. Бойлю
- б. Ж.Б. Ламарку
- в. К. Ліннею
- г. П.С. Палласу

950. Вчений, який вважав, що важливою причиною змін організмів, еволюції рослин і тварин є вплив зовнішніх чинників:

- а. Ж.Б. Ламарк
- б. С. Крашенінніков

- в. І. Лепехін
- г. Одум

951. Нове поняття ноосфери (розумної оболонки) вперше було введено:

- а. В. Сукачовим
- б. В. Докучаєвим
- в. Ф. Клементсом
- г. В. Вернадським

952. Мешканці водного середовища мають назву:

- а. гідробіоти
- б. гідрофіти
- в. ксерофіти
- г. гігрофіти.

953. Організм, мешканець ґрунтів:

- а. гідрофіл
- б. едафобіонт
- в. гігрофіт
- г. галофіт

954. Здатність організмів витримувати зміни умов навколишнього середовища:

- а. Моніторинг
- б. сукцесія
- в. толерантність
- г. синюзія.

955. Приклад стенобіонта – організму, який потребує лише певних умов навколишнього середовища:

- а. форель
- б. качка
- в. їжак
- г. вовк

956. Пристосованість організмів до умов навколишнього середовища, що виникла у процесі еволюції і яка виявляється у зміні їх зовнішніх і внутрішніх особливостей:

- а. адсорбція
- б. евакуація
- в. акліматизація
- г. адаптація

957. Фактор, що виходить за межі максимуму чи мінімуму:

- а. лімітуючий
- б. антропогенний
- в. етологічний
- г. едафічний

958. Німецький хімік Юстус Лібіх відкрив закон:

- а. закон природного циклу
- б. закон об'ємів
- в. закон піраміди енергії
- г. закон мінімуму

959. Закон про те, що в організмі, як цілісній системі, всі його частини відповідають одна одній як за будовою, так і за функціями, відкритий Ж. Кюв'є, називається:

- а. закон необерненості
- б. закон кореляції
- в. геогенетичний закон
- г. біогенетичний закон

960. Закони еволюції були сформульовані Ч. Дарвіном у:

- а. 1851 році
- б. 1873 році
- в. 1859 році
- г. 1800 році

961. Прикладом конвергенції в еволюції є такі тварини:

- а. планктон-карась-щука
- б. акула-пінгвін-дельфін
- в. рак-самітник-лілія актинія-морська зірка
- г. тунець-тюлень-ведмідь.

962. Сукупність видів рослин і тварин в межах природно - кліматичної зони:

- а. екотип
- б. біом
- в. Біоценоз
- г. синюзія

963. Найвища у світі трав'яниста рослина:

- а. банан
- б. бамбук
- в. хміль
- г. іпомея пурпурна

964. Зміну пір року можна віднести до змін середовища існування:

- а. хаотичним
- б. спрямованим
- в. невизначеним
- г. циклічним.

965. Масове переміщення тварин з одного місця існування до іншого:

- а. спеціалізація
- б. міграція
- в. Акліматизація
- г. реакліматизація.

966. Механізм активного відокремлення у просторі особин і груп організмів:

- а. парування
- б. територіальність
- в. хижацтво
- г. міграція

967. Просторове і трофічне місце виду в біогеоценозі, комплекс його зв'язків з іншими видами і вимог до фізичного середовища існування:

- а. екотон
- б. біоценоз
- в. екологічна ніша
- г. меротоп.

968. Сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу, частково чи повністю ізольовано від інших подібних сукупностей особин цього ж виду:

- а. популяція
- б. вид
- в. рід
- г. загін.

969. Чим більше нащадків народжує тварина, тим турбота про них:

- а. менша
- б. більша
- в. не визначена
- г. має бути взаємовигідною

970. З перелічених організмів максимальну плодючість мають:

- а. видра
- б. жирафа
- в. рябчик
- г. риба-місяць

971. Прикладами рослин – хижаків є:

- а. вороняче око, конвалія
- б. ромашка, дзвоники
- в. пижма, будяк
- г. пухирник, товстянка.

972. Лімітуючими факторами для організмів поверхневих шарів світового океану є:

- а. світло
- б. нестача кисню
- в. кількість поживних речовин
- г. нестача прісної води

973. Основна роль деструкторів у тому, що вони:

- а. створюють значну кількість органічних речовин
- б. перетворюють складні органічні сполуки до простих речовин
- в. забезпечують колообіг фосфору у природі
- г. забезпечують колообіг азоту у природі

974. Ознака, яка є спільною для природних і штучних угруповань:

- а. однаковий видовий склад рослин
- б. однаковий видовий склад тварин
- в. здійснення колообігу речовин
- г. однакова стійкість до несприятливих факторів

975. Що таке генофонд популяції?

- а. сукупність ядерних та позаядерних генів даної особини
- б. сукупність усіх генів особин даної популяції
- в. сукупність усіх алелей конкретного гена

- г. сукупність домінантних алелей даного локусу, що з'являється у фенотипі усіх особин, що мають алелі
976. Коралові рифи не зустрічаються на великих глибинах, тому що там:
- а. бракує світла для фотосинтезу
 - б. мало у воді розчинених газів
 - в. повільна течія
 - г. низька температура води
977. Структурною одиницею біоценозу є:
- а. вид
 - б. популяція
 - в. консорція
 - г. сукцесія
978. Для заключних стадій сукцесії характерна:
- а. широка різноманітність ценофобних видів
 - б. мала різноманітність ценофобних видів
 - в. широка різноманітність як ценофільних, так і ценофобних видів
 - г. видова різноманітність нехарактерна
979. Систему тривалих спостережень за змінами екосистеми і біосфери називають:
- а. моніторингом
 - б. модифікацією
 - в. моделюванням
 - г. метаболізмом.
980. Епіфіти – це група рослин, адаптованих для кращого забезпечення:
- а. водою
 - б. світлом
 - в. запилювачами
 - г. поживними речовинами
981. Співвідношення понять "екосистема" і "біогеоценоз" є такими:
- а. це ідентичні поняття
 - б. поняття "екосистема" ширше, ніж поняття "біогеоценоз"
 - в. поняття "біогеоценоз" ширше, ніж поняття "екосистема"
 - г. поняття "екосистема" тотожне "біогеоценозу".
982. Утворення значного шару щільного дерну пов'язано з:
- а. виходом рослин на сушу
 - б. появою голонасінних рослин
 - в. появою однодольних рослин
 - г. появою гігантських папоротей.
983. У річку з поля змиваються хлорорганічні пестициди. Більше всього їх буде в тканинах:
- а. зоопланктону
 - б. фітопланктону
 - в. хижих риб
 - г. рослиноїдних риб
984. До біотичних чинників навколишнього середовища належать:

- а. озоновий шар Землі
- б. ультрафіолетове випромінювання
- в. погода і клімат
- г. вірусні інфекції

985. Сільськогосподарські рослини, в структуру яких методами генної інженерії впроваджені гени стійкості до шкідників, можуть бути небезпечні тим, що:

- а. вживаючи їх в їжу, людина поїдає чужорідні гени
- б. при їх отриманні або вирощуванні, стійкість може передатися іншим рослинам і тваринам
- в. для їх вирощування необхідні пестициди
- г. такі рослини можуть перетворюватися на генетичні химери

986. Якщо висушити болото, то на місці болотяної рослинності утвориться:

- а. степова рослинність
- б. водойма
- в. ділянка, вільна від рослинності
- г. лучна або лісова рослинність

987. Видовий склад наземних рослинних угруповань набагато різноманітніший ніж водний тому, що:

- а. у водному середовищі умови життя стабільні й рослинам не потрібні складні пристосування до розвитку і розмноження;
- б. на суходолі рослини поширюються набагато швидше;
- в. у воді рослина не може жити довго, тому швидко розмножується і гине;
- г. у воді зростають тільки водорості, а їх набагато менше, ніж наземних рослин.

988. Скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери – це:

- а. кислотні дощі;
- б. озонові діри;
- в. смог;
- г. тепличний ефект.

989. "Адаптивна зона" - це:

- а. сукупність усіх факторів середовища, за яких можливе існування виду у природі;
- б. певний тип середовищ життя з характерною сукупністю специфічних екологічних умов, за яких можуть існувати різні групи організмів, якщо вони набули певних адаптацій;
- в. комплекс умов середовища, що визначає тип пристосувань (адаптацій);
- г. нема правильної відповіді.

990. В освітленій частині ставка кількість планктонних організмів, у тому числі й дафній, виявилась більшою. Це пов'язано з тим, що вони:

- а. збираються на світло;
- б. збираються на велику концентрацію водоростей;
- в. краще розмножуються на світлі;
- г. нездатні до протидії течії.

991. Виберіть із запропонованих відповідей ту пару слів, зв'язок між якими найближчий за змістом до пари термінів "комар - репелент":

- а. ящірка-гніздо;
- б. вакцинація-хвороба;
- в. груша-плодожерка;
- г. земля-корені.

992. Види, роди, родини й інші таксони тварин чи рослин, поширення яких обмежене певною територією, називають:
- а. реліктовими;
 - б. ендемічними;
 - в. моніторинговими;
 - г. карантинними.
993. Для популяції, як структурної одиниці виду, характерні показники:
- а. густина, народжуваність, смертність;
 - б. вікова структура, біотичний потенціал;
 - в. розподіл у просторі (дисперсія), крива зростання;
 - г. всі відповіді правильні.
994. До проблем, що розглядає екологія, належать:
- а. боротьба із забрудненням повітря промисловими відходами;
 - б. підтримання заповідного режиму на природних територіях, що охороняються;
 - в. динаміка чисельності популяцій;
 - г. порядок надання дозволу на використання природних ресурсів.
995. До екосистем, яким властиві найдовші ланцюги живлення, належать:
- а. морські;
 - б. наземні;
 - в. ті, у яких домінують ссавці й птахи;
 - г. ті, в яких домінують плазуни.
996. Ефективна величина популяції визначається:
- а. кількістю особин, що можуть досягти статевої зрілості;
 - б. кількістю особин, що вже досягли статевої зрілості;
 - в. кількістю особин, що дали початок наступному поколінню;
 - г. первинним співвідношенням статей.
997. Феномен зміни хазяїна у життєвих циклах паразитів пов'язаний з:
- а. існуванням періодичних зв'язків між хазяїнами;
 - б. наявністю личинкових стадій;
 - в. запобіганням загибелі хазяїна у результаті надмірного збільшення чисельності паразитів;
 - г. потребою у кисні для розвитку личинкових стадій.
998. Зі збільшенням складності екологічних систем їхня стійкість та надійність:
- а. зростає;
 - б. зменшується;
 - в. залишається незмінною;
 - г. залежить від біотичних чинників.
999. Коли деякі види тварин досягають статевої зрілості, вони мігрують на далекі відстані до місць розмноження, щоб уникнути несприятливої погоди. Сигналом для цього може бути:
- а. умовний подразник;
 - б. тривалість дня;
 - в. негативне підкріплення;
 - г. випадковий стимул.
1000. Людина може бути проміжним хазяїном для:

- а. цїп'яка бичачого;
- б. цїп'яка свинячого;
- в. печїнкового сисуна;
- г. ехінокока.

1001. Найбільші види пінгвінів мешкають:

- а. у південній частині ареалу ряду;
- б. у північній частині ареалу ряду;
- в. у центральній частині ареалу ряду;
- г. на маленьких островах.

1002. Ознака, що є спільною для природних і штучних екосистем – це:

- а. однаковий видовий склад рослин;
- б. однаковий видовий склад тварин;
- в. здійснення кругообігу речовин;
- г. однакова стійкість до несприятливих факторів.

1003. Ознака, що є спільною для природних і штучних екосистем – це:

- а. колообіг речовин;
- б. різна кількість видів рослин;
- в. різна кількість видів тварин;
- г. однакова біологічна продуктивність.

1004. Ознакою симбіотичного травлення у травоядних є наявність бактерій, що розщеплюють:

- а. сечовину;
- б. целюлозу;
- в. пентагастрин;
- г. крохмаль.

1005. До основних причин, внаслідок яких зменшується біологічна різноманітність, належать:

- а. зростання чисельності населення;
- б. зростання споживання ресурсів;
- в. зневажливе ставлення до біологічних видів і систем;
- г. всі відповіді правильні.

1006. Остаточним хазяїном паразитичного організму є той, в тілі якого паразит:

- а. не розмножується;
- б. розмножується нестатево;
- в. розмножується статевим способом;
- г. лише запліднюється.

1007. Переваги життя на суходолі для тварин, зумовлені:

- а. рівномірним розподілом кисню в повітрі, порівняно з водою (за винятком великих висот);
- б. швидкими добовими та сезонними коливаннями температури;
- в. більшою доступністю їжі;
- г. наявністю гравітацій.

1008. Піраміди біомас можуть бути перевернутими в:

- а. угрупованнях пустель;
- б. планктонних угрупованнях;
- в. ланцюгах живлення, де переважають пойкилотермні організми;
- г. угрупованнях лісостепової зони.

1009. Подібність у будові рослин африканських, азіатських і американських пустель, які належать до різних родин, визначається:

- а. спільним предком;
- б. географічною ізоляцією;
- в. однаковими селективними факторами середовища;
- г. антропічними факторами.

1010. Позитивні оборотні зв'язки відіграють головну роль у процесі:

- а. запустелювання пасовищ;
- б. підтримування співвідношення кисню і вуглекислого газу в атмосфері;
- в. регуляції рівня глюкози в крові;
- г. рівноваги між хижаком і жертвою.

1011. При скупченні на обмеженій території значної кількості організмів спостерігають:

- а. інтенсивне розмноження;
- б. взаємодопомогу;
- в. боротьбу за існування;
- г. збільшення тривалості життя.

1012. Різні види риб можуть жити і розмножуватися в одній водоймі, але не схрещуються. Це приклад передзиготної ізоляції:

- а. екологічної;
- б. поведінкової;
- в. механічної;
- г. гаметної.

1013. Продуктивність океану переважно лімітується:

- а. коливанням рівня солоності;
- б. низькою температурою;
- в. нестачею біогенів;
- г. нестабільною температурою.

1014. Розташуйте у правильній послідовності цифри названих екосистем за зростанням величини первинної нетто-продукції (1 – тропічний ліс; 2 – савана; 3 – тундра; 4 – пустелі субтропіків; 5 – широколистяний ліс; 6 – тайга):

- а. 1-2-3-4-5-6;
- б. 3-4-6-1-2-5;
- в. 4-3-2-6-5-1;
- г. 6-5-1-3-4-2.

1015. Ступінь витривалості організмів або їхніх угруповань до впливу факторів середовища – це:

- а. зона оптимуму;
- б. екологічна пластичність;
- в. межа витривалості;
- г. лімітуючий фактор.

1016. Сумарна біомаса консументів завжди менша за біомасу продуцентів тому, що:

- а. ККД автотрофних організмів вищий, ніж гетеротрофних;
- б. ККД гетеротрофних організмів вищий, ніж автотрофних;
- в. при перенесенні енергії в ланцюгах живлення значна її частина витрачається;
- г. нема правильної відповіді.

1017. Умовна межа, за якою існування організму стає неможливим - це:

- а. екологічна пластичність;
- б. межа витривалості;
- в. зона песимуму;
- г. зона оптимуму.

1018. Первинна сукцесія відбувається у напрямі:

- а. мохи – лишайники – трав'янисті рослини;
- б. лишайники – трав'янисті рослини –мохи;
- в. лишайники – мохи – трав'янисті рослини;
- г. трав'янисті рослини – мохи - лишайники.