

Біологія та лабораторна діагностика_бакалавр 2021

Основний рівень

1. Епідерміс – це...
 - а. Твірна тканина
 - б. Покривна тканина
 - в. Провідна тканина
 - г. Механічна тканина
2. Ситовидні трубки – є структурними елементами...
 - а. Флоєми
 - б. Ксилеми
 - в. Епідерми
 - г. Склеренхіми
3. Прокамбій – це...
 - а. Первинна покривна тканина
 - б. Вторинна твірна тканина
 - в. Первинна твірна тканина
 - г. Внутрішня видільна тканина
4. Стовпчаста паренхіма виконує функцію...
 - а. Транспірації
 - б. Газообміну
 - в. Фотосинтезуючу
 - г. Механічну
5. Ситовидні трубки входять до складу...
 - а. Перидерми
 - б. Ксилеми (деревини)
 - в. Флоєми (лубу)
 - г. Коленхіми
6. У центральному циліндрі кореня завжди можна відшукати...
 - а. Провідні тканини
 - б. Ризодерму
 - в. Екзодерму
 - г. Перидерму
7. Найдовшою зоною кореня є...
 - а. Зона розтягування
 - б. Зона поділу клітин
 - в. Всисна зона
 - г. Провідна зона
8. Зони кінчика молодого кореня розташовані в такому порядку...

- а. Кореневий чохлак, розтягу, поділу клітин, всисна, провідна
- б. Кореневий чохлак, поділу клітин, розтягу, всисна, провідна
- в. Кореневий чохлак, поділу клітин, всисна, розтягу, провідна
- г. Кореневий чохлак, всисна, провідна, поділу клітин, розтягу

9. Клітинна оболонка буває...

- а. Проста і потовщена
- б. Складна і тонка
- в. Проста і складна
- г. Первинна і вторинна

10. Камбій – це...

- а. Вторинна твірна тканина
- б. Первинна твірна тканина
- в. Первинна покривна тканина
- г. Видільна тканина

11. Спори папоротеподібних виконують функцію:

- а. Вегетативного розмноження
- б. Відтворення спорофіту
- в. Статевого розмноження
- г. Утворення гаметофіту

12. Папоротеподібні ніколи не розмножуються:

- а. Спорами
- б. Вегетативно
- в. Насінням
- г. Поділом кореневищ

13. Водорості не здатні розмножуватися:

- а. Спорами
- б. Поділом клітин
- в. Насінням
- г. Вегетативно

14. Лишайники – це:

- а. Типові рослини
- б. Типові гриби
- в. Паразитичні організми
- г. Симбіотичні організми

15. До лишайників належить:

- а. Сфагновий мох
- б. Зозулин льон
- в. Ламінарія
- г. Ісландський мох

16. Суниці лісові належать до:

- а. Класу дводольних, родини складноцвітих
 - б. Класу однодольних, родини пасльонових
 - в. Класу дводольних, родини розових
 - г. Класу дводольних, родини хрестоцвітих
17. Одна з відмінностей мохів і папоротей та, що у мохів немає:
- а. Багатоклітинних органів розмноження
 - б. Провідних тканин
 - в. Спор
 - г. Нестатевого покоління
18. На які царства поділяють еукаріотичні організми в сучасній систематиці?
- а. Водорості, гриби, лишайники, вищі рослини, тварини
 - б. Нижчі рослини тварини, вищі рослини
 - в. Найпростіші, рослини, тварини
 - г. Рослини, тварини, гриби
19. Які організми не належать до царства рослин?
- а. Діатомові водорості
 - б. Ціанобактерії
 - в. Бурі водорості
 - г. Червоні водорості
20. Які ознаки грибів суперечать їхньому розміщенню в царстві тварин?
- а. Характер кінцевих продуктів метаболізму
 - б. Наявність хітину в зовнішніх покривах тіла
 - в. Наявність твердої оболонки клітини
 - г. Характер запасних поживних речовин
21. Які ознаки грибів наближають їх до рослин?
- а. Наявність хітину в зовнішніх покривах тіла
 - б. Здатність наростати протягом необмеженого часу
 - в. Гетеротрофний спосіб живлення
 - г. Характер запасних поживних речовин
22. Виберіть представника родини складноцвітих:
- а. Конюшина лучна
 - б. Суниці лісові
 - в. Редька посівна
 - г. Волошка синя
23. Наука, яка вивчає лишайники – це:
- а. Альгологія
 - б. Мікологія
 - в. Орнітологія
 - г. Ліхенологія
24. Яка з перелічених ознак хвощів відрізняє їх від папоротей?

- а. Наявність листків
 - б. Наявність коренів
 - в. Нестатеве розмноження спорами
 - г. Членистість стебла
25. Яка риса не є спільною для відділів бурих і діатомових водоростей?
- а. Наявність одноклітинних представників
 - б. Наявність прикріплених організмів
 - в. Поширення коричневого відтінку в забарвленні
 - г. Наявність морських представників
26. Яка роль не властива грибам у природі?
- а. Розкладання відмерлих решток рослин і тварин
 - б. Постачання вищим рослинам води і поживних речовин
 - в. Паразитизм
 - г. Фотосинтез
27. Гіфами називають:
- а. Тіло нитчастих водоростей
 - б. Багатоклітинні або одноклітинні нитчасті утвори грибів
 - в. Безбарвні клітини, якими водорості прикріплені до субстрату
 - г. Органи статевого розмноження грибів
28. Міцелієм називають:
- а. Частину тіла гриба, яка занурюється у субстрат або тіло господаря
 - б. Багатоклітинне або одноклітинне нитчасте тіло грибів
 - в. Щільне сплетіння гіф гриба, на якому відбувається спороношення
 - г. Продукт симбіозу гриба з коренями вищих рослин
29. Плодові тіла грибів...
- а. Утворюються зі статевих органів грибів
 - б. Містять спори
 - в. Накопичують поживні речовини для розвитку зародків грибів
 - г. Слугують для вегетативного розмноження грибів
30. Що таке дріжджі?
- а. Одноклітинні еукаріотичні аеробні організми
 - б. Одноклітинні еукаріотичні анаеробні організми
 - в. Гриби з добре розвинутим міцелієм
 - г. Бактерії
31. На відміну від ялини, фотосинтетичні листки у сосни:
- а. Розміщені почергово
 - б. Розвиваються на видовжених пагонах
 - в. Розвиваються на вкорочених пагонах
 - г. Опадають кожного року
32. Яке із тверджень про однодольні рослини неправильне?

- а. Для однодольних рослин характерна одна сім'ядоля
- б. Листки однодольних рослин часто мають паралельне жилкування
- в. Головний корінь однодольних рослин швидко відмирає
- г. Провідні пучки однодольних рослин містять камбій

33. Яка ознака не характеризує більшості бобових?

- а. Відсутність ендосперму в зрілій насініні
- б. Пірчастоскладні листки
- в. Плід стручок
- г. Симбіоз з бульбочковими бактеріями

34. Виберіть представника родини Пасльонових:

- а. Беладонна звичайна
- б. Полин гіркий
- в. Горох посівний
- г. Тимофіївка

35. Як називається розділ морфології рослин, що вивчає будову й життєдіяльність коренів та кореневих систем?

- а. Палінологія
- б. Ризологія
- в. Карпология
- г. Тератология

36. Як називається розділ морфології рослин, що вивчає будову, форму, функції та морфогенез плодів та насіння?

- а. Карпология
- б. Тератология
- в. Ризология
- г. Палінологія

37. Які існують видозміни кореня?

- а. Пневматофори
- б. Кореневище
- в. Бульба
- г. Цибулина

38. Що є надземним видозмінним пагоном?

- а. Коренеплід
- б. Кореневище
- в. Яблуко
- г. Капуста

39. Якщо від одного вузла відходить один листок, то таке листкорозташування називається?

- а. Мутовчасте
- б. Спіральне
- в. Супротивне
- г. Кільцеве

40. Якщо в одному вузлі бруньки розташовуються одна над одною, таке розташування бруньок називається?
- а. Колатеральне
 - б. Серіальне
 - в. Дихотомічне
 - г. Супротивне
41. Стебло, яке стелиться по землі, але не вкорінюється, називається...
- а. Сланке
 - б. Повзуче
 - в. Столон
 - г. Батіг
42. Фасціація – це патологічний розвиток
- а. Кореня
 - б. Стебла
 - в. Квітки
 - г. Листка
43. Які бруньки не мають періоду спокою і розвиваються одночасно із материнським пагоном?
- а. Зимуючі
 - б. Сплячі
 - в. Збагачення
 - г. Додаткові
44. Які бруньки виконують функцію вегетативного розмноження і можуть хаотично закладатися на будь яких вегетативних частинах рослини?
- а. Збагачення
 - б. Додаткові
 - в. Зимуючі
 - г. Сплячі
45. Якщо від верхівки рахісу відходять три прості листки – це
- а. Складний трійчастий листок
 - б. Складний непарноперистий листок
 - в. Складний пальчастий листок
 - г. Складний парноперистий листок
46. Що це за тип жилкування, якщо від основи листка жилки розходяться віялом і кожна жилка на верхівці поділяється на дві:
- а. Подвійне
 - б. Дихотомічне
 - в. Паралельне
 - г. Сітчасте
47. Як називається суцвіття, якщо на одній загальній осі квітки розташовуються почергово без квітконіжок – це

- а. Кितिця
- б. Головка
- в. Кошик
- г. Колос

48. Як називається суцвіття, якщо на одній загальній, видовженій, м'ясистій осі розташовуються квітки без квітконіжок?

- а. Кितिця
- б. Головка
- в. Кошик
- г. Початок

49. Як називається суцвіття, якщо на одній загальній осі почергово розташовуються квітки з однаковою довжиною квітконіжок?

- а. Кितिця
- б. Колос
- в. Кошик
- г. Зонтик

50. Кореневу систему рослин утворюють:

- а. Усі корені, які вона має
- б. Головний та додаткові корені
- в. Головний та бічні корені
- г. Бічні та додаткові корені

51. Листок з'єднується зі стеблом в місці, яке називається:

- а. Листковою пазухою
- б. Вузлом
- в. Камбієм
- г. Міжвузлям

52. Жилки листків викують такі функції:

- а. Механічну
- б. Провідну та запасуючу
- в. Механічну та провідну
- г. Усі зазначені

53. Дихальні корені утворюються в рослин, які зростають:

- а. Занурені у воду
- б. На стовбурах дерев
- в. На піщаних ґрунтах
- г. На кам'янистих ґрунтах

54. Суцвіття кошик утворюється у:

- а. Вишні
- б. Соняшника
- в. Очерету
- г. Конвалії

55. Квітки, які не мають чашечки і віночка:
- а. В природі не існують
 - б. Утворюються тільки за несприятливих умов
 - в. Називаються голими
 - г. Називаються безплідними
56. Якщо рослина однодомна, то в неї:
- а. Усі квітки або тичинкові, або двостатеві
 - б. Усі квітки або двостатеві, або стерильні
 - в. Утворюються або тичинкові, або маточкові
 - г. Усі квітки двостатеві, або є і тичинкові, і маточкові
57. Якщо через квітку можна провести одну вісь симетрії, то така квітка
- а. Моноподіальна
 - б. Симподіальна
 - в. Асиметрична
 - г. Зигоморфна
58. До сухих нерозкривних плодів відносяться:
- а. Горіх, зернівка, біб
 - б. Горіх, крилатка, сім'янка
 - в. Сім'янка, зернівка, коробочка
 - г. Біб, стручок, коробочка
59. До сухих розкривних плодів відноситься:
- а. Горіх, зернівка, біб
 - б. Горіх, крилатка, сім'янка
 - в. Сім'янка, зернівка, коробочка
 - г. Біб, стручок, коробочка
60. Як називається розділ морфології рослин, що вивчає будову пилку та спор?
- а. Палінологія
 - б. Ризологія
 - в. Карпалогія
 - г. Тератологія
61. Як називається розділ морфології рослин, що вивчає відхилення від нормального розвитку органів рослин?
- а. Палінологія
 - б. Ризологія
 - в. Карпалогія
 - г. Тератологія
62. Що таке метамер?
- а. Це частина пагона, що включає в себе: листок та бруньку
 - б. Це частина пагона, що включає в себе: стебло, бруньку і листок
 - в. Це частина пагона, що включає в себе: міжвузля, вузол, листок
 - г. Це частина пагона, що включає в себе: вузол, бруньку, листок

63. Вкажіть представника типу губки
- а. Коренерот
 - б. Бодяга
 - в. Гідра
 - г. Актинія
64. Укажіть органели руху амеби звичайної
- а. Скоротливі вакуолі
 - б. Війки
 - в. Псевдоподії
 - г. Плавці
65. Виберіть органели руху евглени зеленої
- а. Скоротливі вакуолі
 - б. Війки
 - в. Джгутик
 - г. Плавці
66. Оберіть тварину у якої наявна порошиця
- а. Лямблії
 - б. Амеба Протей
 - в. Евглена зелена
 - г. Інфузорія-туфелька
67. Назвіть тварину зі змішаним живленням
- а. Амеба протей
 - б. Радіолярії
 - в. Лейшманія
 - г. Евглена зелена
68. Назвіть збудника сонної хвороби
- а. Лейшманія
 - б. Лямблії
 - в. Трипаносома
 - г. Дизентерійна амеба
69. Укажіть найпростіших, які живуть у рубцях жуйних парнокопитних:
- а. Трипаносоми
 - б. Евглена зелена
 - в. Інфузорія-ентодініоморфа
 - г. Радіолярія
70. Укажіть найпростіших, які беруть участь в утворенні крейди та вапняку
- а. Фораменіфери
 - б. Радіолярії
 - в. Лейшманія
 - г. Споровики
71. Укажіть найпростіших, які беруть участь в утворенні яшми та опалу

- а. Фораменіфери
- б. Радіолярії
- в. Лейшманія
- г. Споровики

72. Укажіть, яким способом малярійний плазмодій розмножується в клітинах печінки людини:

- а. Статевим
- б. Нестатевим
- в. Статевими та нестатевим
- г. Правильної відповіді немає

73. Укажіть в якому шарі клітин у медуз утворюються статеві клітини

- а. Ектодермальному
- б. Ентодермальному
- в. Мезодермальному
- г. Мезоглії

74. Укажіть які рифи називаються береговими

- а. Ті, що оточують береги
- б. Ті, що тягнуться уздовж берега на певній відстані
- в. Кільцеподібні рифи коралових островів
- г. Ті, що знаходять с океанічних западинах

75. Укажіть які рифи називаються бар'єрними

- а. Ті, що оточують береги
- б. Ті, що тягнуться уздовж берега на певній відстані
- в. Кільцеподібні рифи коралових островів
- г. Ті, що знаходять с океанічних западинах

76. Укажіть які рифи називаються "атолами"

- а. Ті, що оточують береги
- б. Ті, що тягнуться уздовж берега на певній відстані
- в. Кільцеподібні рифи коралових островів
- г. Ті, що знаходять с океанічних западинах

77. Назвіть тип нервової системи у медуз

- а. Дифузний
- б. Розкидано-вузловий
- в. Драбинчастий
- г. Стовбуровий

78. Зазначте, як називають органи рівноваги у медуз

- а. Ропалії
- б. Світлочутливі вічка
- в. Статоцисти
- г. Осфадії

79. Укажіть, що називається ропаліями

- а. Кільцеподібні коралові острови
- б. Видільні органи плоских червів
- в. Чутливі тільця медуз, які поєднують в собі статоцисти та світлочутливі вічка
- г. Це нервові клітини

80. Укажіть які організми належать до паразитичних одноклітинних

- а. Фораменіфери
- б. Радіолярії
- в. Амеба дизентерійна
- г. Лямблія

81. Віднайдіть представника найпростіших

- а. Дріжджі
- б. Хлорела
- в. Радіолярія
- г. Котячий сисун

82. Визначте, з чого утворюються статеві клітини гідри

- а. Мезоглеї
- б. Залозистих клітин
- в. Проміжних клітин
- г. Нервових клітин

83. Укажіть, де розташовані щупальця у гідри

- а. По краю парасольки
- б. Оточують рот у вигляді віночка
- в. У кишкової порожнині
- г. Біля підошви

84. Укажіть до яких тварин за способом живлення належить гідра

- а. Коменсалізм
- б. Паразитизм
- в. Хижацтва
- г. Мутуалізм

85. З'ясуйте, чим кишковопорожнинні захоплюють свою їжу

- а. Псевдоніжками
- б. Ротом
- в. Щелепами
- г. Щупальцями

86. Укажіть, що собою являє паренхіма плоских червів

- а. Різновид епітеліальної клітини
- б. Різновид сполучної тканини
- в. Різновид м'язової тканини
- г. Безструктурну речовину

87. Укажіть, хто з вказаних тварин належить до плоских червів

- а. Шершень
- б. Трихінела
- в. Котячий сисун
- г. Гострик дитячий

88. Зазначте чим представлена видільна система плоских червів

- а. Проглотидами
- б. Протонефридіями
- в. Метанефридіями
- г. Зеленими залозами

89. Визначте, що знаходиться у проміжках між органами плоских червів

- а. Первинна порожнина тіла
- б. Вторинна порожнина тіла
- в. Паренхіма
- г. Кишкова порожнина

90. Зазначте, де в організмі людини може паразитувати бичачий ціп'як

- а. У кишечнику
- б. У нирках
- в. У печінці
- г. У легенях

91. Вкажіть основного хазяїна сисуна печінкового

- а. Собака
- б. Курка
- в. Корова
- г. Великий ставковий

92. Визначте, як відбувається поглинання їжі у цестод

- а. Через ротовий отвір
- б. Через протонефридії
- в. Через присоски
- г. Через усю поверхню тіла

93. Назвіть паразита, зараження яким неможливо вилікувати без хірургічного втручання

- а. Котячий сисун
- б. Ехінокок
- в. Печінковий сисун
- г. Бичачий ціп'як

94. Вкажіть, у кого з названих тварин немає травної системи

- а. Стьожка широкого
- б. Людської аскариди
- в. Котячого сисуна
- г. Молочно-білої планарії

95. Оберіть паразита, у якого наявна травна система

- а. Стьожек широкий
- б. Котячий сисун
- в. Бичачий ціп`як
- г. Ехінокок

96. З'ясуйте, як називається непочленована ділянка тіла стьожкових червів, на задньому кінці якої утворюються членики

- а. Присоска
- б. Головка
- в. Шийка
- г. Фіна

97. Вкажіть, у кого з названих червів на головці наявні гачки для прикріплення

- а. Планарії біла
- б. Печінкового сисуна
- в. Бичачого ціп`яка
- г. Свинячого ціп`яка

98. Вкажіть, для кого з названих тварин характерна наявність двох присосків – ротового та черевного

- а. Трихінели
- б. Котячого сисуна
- в. Молочно-білої планарії
- г. Бичачого ціп`яка

99. Назвіть плоского черва, для якого характерний прямий розвиток

- а. Печінковий сисун
- б. Ехінокок
- в. Молочно-біла планарія
- г. Широкий стьожек

100. Вкажіть, як називається міхурчата стадія розвитку цестод, яка утворюється в м'язах проміжного хазяїна

- а. Присоска
- б. Шийка
- в. Фіна
- г. Членик

101. Укажіть, як називається порожнина тіла кільчастих червів

- а. Кутикула
- б. Параподія
- в. Целом
- г. Гіподерма

102. З'ясуйте, скільки відділів налічує кишечник кільчастих червів

- а. 1
- б. 2
- в. 4
- г. 3

103. Укажіть, чим представлена видільна система кільчастих червів
- Протонефридіями
 - Метанефридіями
 - Фагоцитарними клітинами
 - Виведення продуктів обміну відбувається через шкіру
104. Укажіть представника малощетинкових червів
- Медична п'явка
 - Трубочник
 - Нереїс
 - Піскожил
105. Поясніть, чим відрізняється вторинна порожнина від первинної
- Значно більшим об'ємом
 - Відсутністю рідини всередині
 - Наявністю епітеліальної висилки
 - Сполученням із зовнішнім середовищем
106. Визначте представника кільчиків, у якого редуковані параподії, але є пучечки щетинок
- Трубочник
 - Нереїс
 - Медична п'явка
 - Піскожил
107. Укажіть, який з названих червів живе у морі
- Трубочник
 - Широкий стьожак
 - Нереїс
 - Голова нематода
108. Укажіть тварину, слинні залози якої виробляють гірудин
- Медична п'явка
 - Людська аскарида
 - Печінковий сисун
 - Австралійський земляний черв'як
109. Укажіть тварину, у якої наявні зябра
- Піскожил
 - Дощовий черв'як
 - Трубочник
 - Медична п'явка
110. Виберіть ознаку, характерну для круглих червів
- Зазвичай гермафродити
 - Мають черевний і ротовий присоски
 - Проміжки між органами заповнені паренхімою
 - Наявна первинна порожнина тіла
111. Укажіть відділ тіла, який відсутній у двостулкових молюсків

- а. Голова, тулуб
 - б. Тулуб, нога
 - в. Нога, голова
 - г. Мантия
112. Укажіть представників головоногих молюсків
- а. Корабельний черв'як
 - б. Жабурниця
 - в. Перлівниця
 - г. Каракатиця
113. Визначте, як називається складка шкіри, що оточує тулуб молюсків
- а. Паренхіма
 - б. Мантия
 - в. Параподія
 - г. Амбра
114. Поясніть, з яких шарів утворена черепашка молюсків
- а. Мантийного, епідермального
 - б. Коркового, рогового, перламутрового
 - в. Рогового, фарфорового, перламутрового
 - г. Кальцієвого, фарфорового, жирового
115. Укажіть, яка кров рухається через серце молюсків
- а. Артеріальна
 - б. Венозна
 - в. У шлуночку венозна, а у передсерді артеріальна
 - г. Змішана
116. Укажіть, як називається порожнина, яка знаходиться між мантиєю і тулубом молюска
- а. Первинна
 - б. Вторинна
 - в. Мантийна
 - г. Кишкова
117. Укажіть, яке серце характерне для більшості червононогих
- а. Однокамерне
 - б. Двокамерне
 - в. Трикамерне
 - г. П'ятикамерне
118. Визначте, для яких молюсків характерний реактивний рух
- а. Червононогих
 - б. Двостулкових
 - в. Головоногих
 - г. Малощетинкових
119. Оберіть найбільшу за розмірами та масою тіла тварину

- а. Рапана
 - б. Виноградний слимак
 - в. Тридакна
 - г. Велетенський кальмар
120. Укажіть назву органа, яким виноградний слимак віддирає клітини листків і стебел, коли живиться
- а. Присоски
 - б. Тертка
 - в. Щелепи
 - г. Ввідний сифон
121. З'ясуйте, куди відкриваються сечовидільні та статеві отвори у молюсків
- а. У мантийну порожнину
 - б. У кишечник
 - в. У легені
 - г. У навколосерцеву сумку
122. Назвіть молюска, який дихає зябрами
- а. Фіза
 - б. Ставковик великий
 - в. Рапана
 - г. Виноградний слимак
123. Укажіть, який з молюсків небезпечний для людини
- а. Вустриця
 - б. Фіза
 - в. Конус
 - г. Голий слизун
124. Укажіть, як називається фарба, котру добувають із двостулкових молюсків Середземного моря
- а. Амбра
 - б. Пурпур
 - в. Сепія
 - г. Перламутр
125. З'ясуйте, хто з наведених тварин пошкоджує кораблі
- а. Жабурниця
 - б. Вустриця
 - в. Перлівниця
 - г. Корабельний черв'як
126. Укажіть, звідки органи виділення молюсків забирають продукти обміну речовин
- а. Із мантийної порожнини
 - б. Із кишечника
 - в. Із легень
 - г. Із крові
127. Оберіть головноного молюска, який має найбільше щупалець, що позбавлені присосок

- а. Кальмар
 - б. Восьминіг
 - в. Каракатиця
 - г. Наутілус
128. З'ясуйте, у що перетворилася в процесі еволюції нога головоногих
- а. Лійку
 - б. Мантію
 - в. Тулуб
 - г. Черепашку
129. Укажіть, як називається отвір черепашки черевоногих молюсків
- а. Сепія
 - б. Сифон
 - в. Устя
 - г. Лійка
130. Назвіть клас, який не належить до типу Членистоногі
- а. Комахи
 - б. Павукоподібні
 - в. Жалкі
 - г. Ракоподібні
131. Визначте, скільки пар ходильних ніг є у річкового рака
- а. 2
 - б. 3
 - в. 4
 - г. 5
132. Укажіть, що є основою зовнішнього скелета членистоногих
- а. Целюлоза
 - б. Вапно
 - в. Хітин
 - г. Рогова речовина
133. Оберіть, чим представлена видільна система річкового рака
- а. Протонефридіями
 - б. Мальпігієвими судинами
 - в. Зеленими залозами
 - г. Метанефридіями
134. Визначте, до чого у комах приєднується передня пара крил
- а. До передньогрудей
 - б. До середньогрудей
 - в. До першого членика черевця
 - г. До задньогрудей
135. З'ясуйте, який тип ротового апарату характерний для більшості мух

- а. Сисний
- б. Колючо-сисний
- в. Гризучо-сисний
- г. Сисно-лижучий

136. Укажіть, куди впадає протока печінки у річкового рака

- а. У стравохід
- б. У середню кишку
- в. У задню кишку
- г. У цідильний шлунок

137. Назвіть представника ракоподібних, черевце якого невелике і підігнуте під груди

- а. Річковий рак
- б. Дафнія
- в. Краб
- г. Рак-самітник

138. Визначте кількість дихалець на грудях комах

- а. Одна пара
- б. Дві пари
- в. Три пари
- г. Чотири пари

139. Укажіть, хто з наведених павукоподібних найнебезпечніший для людини

- а. Каракурт
- б. Павук-сріблянка
- в. Тарантул
- г. Галовий кліщ

140. Здатність організму підтримувати сталість внутрішнього середовища на певному відносно сталому рівні –

- а. Регенерація
- б. Автотомія
- в. Гомеостаз
- г. Імунітет

141. Спосіб регуляції функцій організму, що здійснюється через хімічні речовини, розчинені в рідинах –

- а. Нервова
- б. Гуморальна
- в. Гомеостатична
- г. Зовнішня

142. Типи тканин тварин і людини

- а. Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова
- б. Епітеліальна, основна, м'язова, нервова
- в. Покривна, основна, м'язова, нервова
- г. Сполучна, механічна, м'язова, нервова

143. Різновидом епітелію є
- а. Щільний
 - б. Пухкий
 - в. Залозистий
 - г. Ретикулярний
144. Сполучна тканина, що міститься в серці та кровоносних судинах –
- а. Щільна
 - б. Пухка
 - в. Ретикулярна
 - г. Кров
145. Кістки, тіла яких утворені компактною кістковою тканиною –
- а. Довгі
 - б. Короткі
 - в. Пласкі
 - г. Широкі
146. Мускулатура, волокна якої короткі, веретеноподібні, одноядерні, непосмуговані, скорочуються повільно –
- а. Скелетна
 - б. Гладенька
 - в. Серцева
 - г. Мієлоїдна
147. Тканина, яка утворює скелет людини –
- а. Епітеліальна
 - б. Сполучна
 - в. Основна
 - г. М'язова
148. Твердість і міцність кісток (кісткової тканини) забезпечується
- а. Органічними речовинами міжклітинної речовини
 - б. Неорганічними речовинами міжклітинної речовини
 - в. Цитоплазматичними мітками між клітинами
 - г. Спеціальними речовинами остеобластів
149. До трубчастих (довгих) кісток належить
- а. Лопатка
 - б. Грудина
 - в. Променева
 - г. Клубова
150. Рухомі з'єднання між кістками –
- а. Шви
 - б. Зрощення
 - в. Злиття
 - г. Суглоби

151. Вихід суглобової головки із суглобової западини –
- а. Вивих
 - б. Відкритий перелом
 - в. Закритий перелом
 - г. Забій
152. Кістка, яка не належить до лицьового відділу черепа –
- а. Вилична
 - б. Носова
 - в. Нижньощелепна
 - г. Сконева
153. Відділ скелета, у якому більшість кісток пласкі і сполучені швами –
- а. Череп
 - б. Хребет
 - в. Грудна клітка
 - г. Скелет верхніх кінцівок
154. Відділ скелета, що складається з 33-34 коротких кісток, які сполучаються між собою напіврухомо або зростаються –
- а. Череп
 - б. Хребет
 - в. Грудна клітка
 - г. Скелет верхніх кінцівок
155. Кількість хребців у грудному відділі хребта –
- а. 3
 - б. 5
 - в. 7
 - г. 12
156. Стан постійного незначного напруження м'яза –
- а. Сила м'яза
 - б. Швидкість скорочення м'яза
 - в. Витривалість м'яза
 - г. Тонус м'яза
157. Скоротливі нитки у волокні скелетної мускулатури –
- а. Зв'язки
 - б. Сухожилля
 - в. Міофібрили
 - г. Мікротрубочки
158. Довгі (веретеноподібної форми) м'язи містяться
- а. На кінцівках
 - б. Між хребцями
 - в. Між ребрами
 - г. На тулубі

159. Кількість крові у дорослої людини становить
- а. 1-2 л
 - б. 3-4 л
 - в. 5-6 л
 - г. 7-8 л
160. Захисна функція крові полягає в тому, що вона
- а. Транспортує O₂ і CO₂
 - б. Транспортує поживні речовини
 - в. Транспортує продукти обміну
 - г. Забезпечує імунітет організму
161. Плазма крові становить від її складу
- а. 45-50%
 - б. 55-60%
 - в. 65-70%
 - г. 75-80%
162. Еритроцити без'ядерні, оскільки
- а. Є фрагментами клітин мегакаріоцитів
 - б. Походять від прокаріот
 - в. Є прокаріотичними клітинами
 - г. Втрачають ядро при виході у кров'яне русло
163. Ядерні, безбарвні клітини крові –
- а. Еритроцити
 - б. Лейкоцити
 - в. Тромбоцити
 - г. Гепатоцити
164. Місцем руйнування лейкоцитів є
- а. Тимус, лімфатичні вузли
 - б. Червоний кістковий мозок
 - в. Жовтий кістковий мозок
 - г. Печінка, селезінка
165. Спадкове захворювання, що виявляється в нездатності крові до зсідання –
- а. Ахондроплазія
 - б. Фенілкетонурія
 - в. Серпоподібноклітинна анемія
 - г. Гемофілія
166. В крові однієї людини не може бути одночасно
- а. Аглютиногену А і аглютиніну β
 - б. Аглютиногену В і аглютиніну α
 - в. Аглютиногену А і аглютиніну α
 - г. Аглютиногенів А і В
167. Судини, у яких найменша швидкість крові –

- а. Артерії
- б. Артеріоли
- в. Капіляри
- г. Вени

168. Велике коло кровообігу починається із

- а. Лівого передсердя
- б. Правого передсердя
- в. Лівого шлуночка
- г. Правого шлуночка

169. Мале коло кровообігу починається із

- а. Лівого передсердя
- б. Правого передсердя
- в. Лівого шлуночка
- г. Правого шлуночка

170. Судини, які несуть кров від серця –

- а. Артерії
- б. Вени
- в. Капіляри
- г. Зв'язки

171. Залози, що не мають протоків і виділяють секрети (гормони) безпосередньо в кров –

- а. Екзокринні
- б. Ендокринні
- в. Змішаної секреції
- г. Загальні

172. Залозами змішаної секреції є

- а. Молочні
- б. Сальні
- в. Кишкові
- г. Статеві

173. Гормон передньої частки гіпофіза, який стимулює секрецію гормонів надниркових залоз –

- а. Адренкортикотропний гормон
- б. Лютеїнізуючий гормон
- в. Фолікулостимулюючий гормон
- г. Тиреотропний гормон

174. При гіпофункції щитоподібної залози в дитячому віці розвивається

- а. Гігантизм
- б. Карликовість
- в. Акромегалія
- г. Кретинізм

175. При гіперфункції щитоподібної залози в дорослому віці розвивається

- а. Базедова хвороба
- б. Аддісонова хвороба
- в. Акромегалія
- г. Мікседема

176. Гормоном мозкового шару наднирників є

- а. Інсулін
- б. Альдостерон
- в. Норадреналін
- г. Тироксин

177. Гормон підшлункової залози, який знижує рівень глюкози в крові (сприяє перетворенню глюкози в глікоген) –

- а. Мелатонін
- б. Інсулін
- в. Глюкагон
- г. Адреналін

178. Клітини нервової тканини, які спеціалізуються на проведенні нервових імпульсів –

- а. Остеобласти
- б. Нематобласти
- в. Нейрони
- г. Подоцити

179. Короткі відростки, що проводять нервові імпульси до тіла нейрона –

- а. Синапси
- б. Аксони
- в. Дендрити
- г. Перикаріони

180. Нейрон, який проводить нервовий імпульс від рецептора до ЦНС –

- а. Чутливий
- б. Вставний
- в. Еферентний
- г. Руховий

181. Місце функціонального сполучення між нейронами, у якому здійснюється передача нервового імпульсу –

- а. Синапс
- б. Перикаріон
- в. Кінцева пластинка
- г. Акросома

182. Шлях, по якому проходить нервовий імпульс при здійсненні рефлексу –

- а. Рефлекторний цикл
- б. Рефлекторна дуга
- в. Рефлекторний колектор
- г. Симпласт

183. Функції спинного мозку:
- а. Сенсорна, моторна
 - б. Захисна, бар'єрна
 - в. Рефлекторна, провідникова
 - г. Трофічна, дихальна
184. Структура головного мозку, яка сполучає великі півкулі –
- а. Міст
 - б. Черв'як
 - в. Мозолисте тіло
 - г. Соскоподібне тіло
185. Система органів, яка не бере безпосередньої участі у виділенні продуктів життєдіяльності –
- а. Сечовидільна
 - б. Дихальна
 - в. Травна
 - г. Ендокринна
186. Нирка оточена шаром
- а. Хрящової тканини
 - б. Жирової тканини
 - в. Епітеліальної тканини
 - г. Гладенької мускулатури
187. Кількість нефронів, що містяться в одній нирці, приблизно становить
- а. 1 млн.
 - б. 2 млн.
 - в. 3 млн.
 - г. 4 млн.
188. Під час утворення вторинної сечі у кров не всмоктуються
- а. Азотисті сполуки
 - б. Моносахариди
 - в. Вітаміни
 - г. Вода та іони мінеральних солей
189. Порожнистий м'язовий орган, що є резервуаром для збирання сечі –
- а. Ниркова капсула
 - б. Ниркова миска
 - в. Сечовий міхур
 - г. Сечівник
190. Сукупність процесів, внаслідок яких відбувається поглинання організмом кисню і виділення вуглекислого газу –
- а. Зовнішнє дихання
 - б. Внутрішнє дихання
 - в. Клітинне дихання
 - г. Тканинне дихання

191. Частина дихальних шляхів, з якої повітря надходить до носоглотки –
- а. Носова порожнина
 - б. Трахея
 - в. Гортань
 - г. Бронхіоли
192. Частина дихальних шляхів, з якої повітря надходить до трахеї –
- а. Носова порожнина
 - б. Бронхіоли
 - в. Гортань
 - г. Носоглотка
193. Частина дихальних шляхів у формі трубки, яка утворена хрящовими незамкненими кільцями –
- а. Носова порожнина
 - б. Носоглотка
 - в. Гортань
 - г. Трахея
194. До м'якої частини трахеї прилягає
- а. Носоглотка
 - б. Стравохід
 - в. Гортань
 - г. Низхідна частина аорти
195. При вдиху
- а. Скорочуються внутрішні міжреберні м'язи і м'язи черевного пресу
 - б. Скорочуються зовнішні міжреберні м'язи і діафрагма
 - в. Розслаблюються зовнішні міжреберні м'язи і діафрагма
 - г. Розслаблюються внутрішні міжреберні м'язи і діафрагма
196. Не беруть участі у дихальних рухах м'язи
- а. Діафрагми
 - б. Міжреберні
 - в. Черевного пресу
 - г. Шиї
197. До складу травного каналу не відноситься
- а. Ротова порожнина
 - б. Глотка
 - в. Стравохід
 - г. Підшлункова залоза
198. Залози, протоки яких відкриваються у передротову та ротову порожнини –
- а. Потові
 - б. Сальні
 - в. Слинні
 - г. Обкладові
199. Залози, протоки яких відкриваються у дванадцятипалу кишку:

- а. Підшлункова, печінка
 - б. Головні, обкладові, додаткові
 - в. Ендокринні, екзокринні
 - г. Сальні, потові
200. Не є власне травною залозою
- а. Підшлункова
 - б. Печінка
 - в. Підщелепна слинна
 - г. Під'язикова слинна
201. Орган, що забезпечує підтримання гомеостазу ("універсальна лабораторія" організму) –
- а. Селезінка
 - б. Печінка
 - в. Підшлункова залоза
 - г. Щитоподібна залоза
202. У ротовій порожнині починається травлення
- а. Білків
 - б. Жирів
 - в. Вуглеводів
 - г. Нуклеїнових кислот
203. Ферменти, які містяться у слині:
- а. Амілаза, птіалін
 - б. Муцин, лізоцим
 - в. Пепсин, трипсин
 - г. Ліпаза, нуклеаза
204. Ліпаза розщеплює жири до
- а. Гліцерину і вищих жирних кислот
 - б. Нуклеотидів
 - в. Моносахаридів
 - г. Амінокислот
205. Дві сторони метаболізму:
- а. Синергізм, антагонізм
 - б. Асиміляція, дисиміляція
 - в. Плазмоліз, деплазмоліз
 - г. Денатурація, ренатурація
206. Сукупність процесів розпаду (окиснення) складних органічних речовин до простіших із вивільненням енергії –
- а. Денатурація
 - б. Ренатурація
 - в. Асиміляція
 - г. Дисиміляція
207. Вітаміни відкрив

- а. І.М.Сеченов
- б. І.П.Павлов
- в. І.І.Мечніков
- г. М.І.Лунін

208. Нестача певних вітамінів в організмі –

- а. Авітаміноз
- б. Гіповітаміноз
- в. Гіпервітаміноз
- г. Гіпотензія

209. Надлишок вітамінів (переважно жиророзчинних) у продуктах харчування є причиною

- а. Авітамінозу
- б. Гіповітамінозу
- в. Гіпервітамінозу
- г. Гіпотонії

210. До групи водорозчинних належить вітамін

- а. А
- б. Д
- в. С
- г. К

211. Вітамін, який впливає на обмін Са і Р –

- а. А
- б. Д
- в. С
- г. К

212. Вітамін, який утворюється в шкірі під дією ультрафіолетового випромінювання –

- а. А
- б. Д
- в. С
- г. К

213. Рахіт розвивається внаслідок гіпо- чи авітамінозу вітаміну

- а. А
- б. Д
- в. С
- г. К

214. Лімфоцити є різновидом

- а. Еритроцитів
- б. Лейкоцитів
- в. Тромбоцитів
- г. Адипоцитів

215. Шар епідермісу, утворений мертвими зроговілими клітинами, які щільно прилягають одна до одної –

- а. Пірамідальний
- б. Кірковий
- в. Мозковий
- г. Роговий

216. Шар шкіри, у якому містяться гладенькі м'язи, сальні й потові залози –

- а. Епідерміс
- б. Дерма
- в. Підшкірна жирова клітковина
- г. Ендодерма

217. До волосяних фолікулів кріпляться

- а. Гладенькі м'язи
- б. Поперечносмугасті м'язи
- в. Потові залози
- г. Сухожильні струни

218. Залози, які мають вигляд трубочок, що починаються щільно закрученим клубочком, і відкриваються протоками на поверхні епідермісу –

- а. Слинні
- б. Слізні
- в. Сальні
- г. Потові

219. Шкіра людини не виконує функцію

- а. Запасаючу
- б. Терморегуляторну
- в. Видільну
- г. Гуморальну

220. Функція шкіри, яка полягає у виведенні з потом непотрібних і шкідливих продуктів життєдіяльності –

- а. Бар'єрна
- б. Запасна
- в. Видільна
- г. Сенсорна

221. Захворювання шкіри, що спричиняється комахами: головною, лобковою, одержною вошами –

- а. Дерматит
- б. Вітиліго
- в. Короста
- г. Педикульоз

222. Відділ аналізатора, представлений рецепторами –

- а. Периферичний
- б. Проміжний
- в. Центральний
- г. Вентральний

223. Відділ аналізатора, представлений нервами, нервовими шляхами і проміжними нервовими центрами ЦНС –

- а. Сприймаючий
- б. Провідниковий
- в. Кірковий
- г. Вентральний

224. Прозора сполучнотканинна плівка, що покриває видиму поверхню ока і вистилає внутрішню поверхню повік –

- а. Склера
- б. Овальне вікно
- в. Кругле вікно
- г. Кон'юктива

225. Рогівка – це прозоре випукле утворення

- а. Склери
- б. Сітківки
- в. Склистого тіла
- г. Судинної оболонки

226. Отвір у райдужній оболонці ока –

- а. Кон'юктива
- б. Зіниця
- в. Жовта пляма
- г. Сліпа пляма

227. Здатність кристалика рефлекторно змінювати свою кривизну в залежності від відстані до предметів, зображення яких сприймається –

- а. Автотомія
- б. Неотенія
- в. Апоміксис
- г. Акомодація

228. Фоторецептори сітківки ока, які подразнюються лише яскравим світлом і можуть розрізнити кольори –

- а. Диски Меркеля
- б. Тільця Руффіні
- в. Волоскові клітини
- г. Колбочки

229. Місце виходу зорового нерва на сітківці ока –

- а. Ретикулярна формація
- б. Ромбоподібна ямка
- в. Жовта пляма
- г. Сліпа пляма

230. Структура, яка належить до оптичної системи ока –

- а. Кришталік
- б. Війковий м'яз
- в. Ціліарне тіло
- г. Сітківка

231. Порушення зору, вроджена форма якого спричиняється видовженням очного яблука –

- а. Астигматизм
- б. Дальтонізм
- в. Короткозорість
- г. Далекозорість

232. Тонка сполучнотканинна плівка, яка розмежує зовнішнє і середнє вухо –

- а. Діафрагма
- б. Овальне вікно
- в. Кругле вікно
- г. Барабанна перетинка

233. Частина кісткового лабіринту, яка не виконує функцію органа рівноваги –

- а. Завитка
- б. Присінок
- в. Круглий мішечок
- г. Овальний мішечок

234. Фізіологічною основою психічних процесів є

- а. Нижча нервова діяльність
- б. Вища нервова діяльність
- в. Перша сигнальна система
- г. Друга сигнальна система

235. Безумовні рефлекси, що забезпечують кашель, чхання, блювання, належать до

- а. Харчових
- б. Дихальних
- в. Захисних
- г. Орієнтувальних

236. Складні системи безумовних рефлексів, пов'язаних зі збереженням виду (природжені програми поведінки, для здійснення яких не потрібне попереднє навчання) –

- а. Таксиси
- б. Тропізми
- в. Настії
- г. Інстинкти

237. Збіг у часі дії умовного подразника з безумовним подразником є основною умовою утворення

- а. Таксисів
- б. Інстинктів
- в. Безумовних рефлексів
- г. Умовних рефлексів

238. Припинення або послаблення умовно-рефлекторних реакцій організму –

- а. Іррадіація
- б. Концентрація
- в. Індукція
- г. Гальмування

239. Фази сну, що чергуються:

- а. Сенсорний, руховий
- б. Повільний, швидкий
- в. Загальний, спеціальний
- г. Організований, неорганізований

240. Немембранні органели цитоплазми, що складаються із двох субодиниць

- а. Рибосоми
- б. Пероксисоми
- в. Мікрофіламенти
- г. Мікротрубочки

241. Між субодиницями рибосом відбувається

- а. Процес трансляції
- б. Процес реплікації
- в. Процес активації амінокислот
- г. Синтез гліколіпідів

242. Рибосоми належать до

- а. Немембранних органел
- б. Одномембранних органел
- в. Двомембранних органел
- г. Клітинних включень

243. Клітинний центр є у клітинах

- а. Грибів і тварин
- б. Грибів і рослин
- в. Тварин і вищих рослин
- г. Тварин і нижчих рослин

244. Щільний шар цитоплазми, що оточує клітинний центр в еукаріотичній клітині

- а. Центросфера
- б. Центріоля
- в. Центромера
- г. Каріоплазма

245. Кожна центріоля клітинного центру еукаріотичної клітини складається з

- а. Двох мікротрубочок, розміщених перпендикулярно
- б. Двох субодиниць: великої і малої
- в. Дев'яти триплетів мікротрубочок
- г. Двох хроматид, з'єднаних центромерою

246. Клітинний центр еукаріотичної клітини бере участь

- а. В утворенні субодиниць рибосом
 - б. У формуванні нативної структури білків
 - в. У синтезі ліпідів і стероїдів
 - г. У формуванні веретена поділу
247. До одномембранних органел цитоплазми належать
- а. Комплекс Гольджі, рибосоми
 - б. Вакуолі, лізосоми
 - в. Вакуолі, мітохондрії
 - г. Лізосоми, пластиди
248. Ендоплазматична сітка належить до
- а. Немембранних органел
 - б. Одномембранних органел
 - в. Двомембранних органел
 - г. Клітинних включень
249. Ендоплазматична сітка – це
- а. Деспіралізовані переплетені нитки хроматину
 - б. Система мембран, що пронизують цитоплазму
 - в. Своєрідний цитоскелет, утворений мікротрубочками
 - г. Своєрідний цитоскелет, утворений мікрофіламентами
250. Ендоплазматична сітка в еукаріотичній клітині сполучається із
- а. Плазматичною мембраною, зовнішньою ядерною мембраною, комплексом Гольджі;
 - б. Плазматичною мембраною, зовнішньою мітохондріальною мембраною
 - в. Плазматичною мембраною, зовнішньою мембраною мітохондрій та хлоропластів
 - г. Зовнішньою ядерною мембраною, комплексом Гольджі, мембранами мітохондрій
251. Ендоплазматична сітка, яка містить рибосоми
- а. Гладка
 - б. Шорстка
 - в. Щільна
 - г. Жорстка
252. Комплекс Гольджі є полярною органелою, оскільки
- а. Знаходиться поблизу плазматичної мембрани на одному із полюсів клітини
 - б. З одного полюса цистерни безперервно утворюються, а з іншого – відшнуровуються у вигляді пухирців
 - в. На мембранах цистерн і пухирців накопичуються різнойменні заряди
 - г. На внутрішньому і зовнішньому боці мембран існує різниця потенціалів
253. Комплекс Гольджі належить до
- а. Немембранних органел
 - б. Одномембранних органел
 - в. Двомембранних органел
 - г. Клітинних включень
254. Комплекс Гольджі знаходиться

- а. У плазматичній мембрані
 - б. Поблизу плазматичної мембрани
 - в. Поблизу ядра
 - г. У ядрі
255. “Енергетичними станціями” клітини називають
- а. Мітохондрії
 - б. Хлоропласти
 - в. Хромосоми
 - г. Лізосоми
256. Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій
- а. Тилакоїди
 - б. Ламели
 - в. Кристи
 - г. Плазмодесми
257. У матриксі мітохондрій містяться
- а. Мікротрубочки і мікрофіламенти
 - б. Зерна крохмалю
 - в. Кільцева ДНК, РНК, дрібні рибосоми
 - г. Гідролітичні ферменти
258. У мітохондріях відбуваються реакції
- а. Темної фази фотосинтезу
 - б. Окиснення органічних речовин із вивільненням енергії, за рахунок якої синтезується АТФ
 - в. Білкового синтезу
 - г. Синтезу вуглеводів, ліпідів, стероїдів
259. Мітохондрії належать до
- а. Немембранних органел
 - б. Одномембранних органел
 - в. Двомембранних органел
 - г. Органел руху
260. Драглистий матрикс, яким заповнені хлоропласти
- а. Каріоплазма
 - б. Ендолімфа
 - в. Строма
 - г. Перилімфа
261. Внутрішня мембрана хлоропластів утворює
- а. Кристи
 - б. Тилакоїди і ламели
 - в. Цистерни, трубочки і пухирці
 - г. Підмембранні комплекси
262. У стромі хлоропластів містяться

- а. Кільцева ДНК, РНК, дрібні рибосоми
 - б. Мікротрубочки і мікрофіламенти
 - в. Жирові краплини
 - г. Гідролітичні ферменти
263. На мембранах тилакоїдів містяться
- а. Дихальні пігменти
 - б. Фотосинтетичні пігменти
 - в. Гідролітичні ферменти
 - г. Кристали оксалату кальцію
264. Хлоропласти можуть перетворюватись на
- а. Промітохондрії
 - б. Хромопласти та мітохондрії
 - в. Лейкопласти та мітохондрії
 - г. Хромопласти
265. Світлова фаза фотосинтезу відбувається
- а. У стромі хлоропластів
 - б. На мембранах тилакоїдів у хлоропластах
 - в. На виростах внутрішньої мембрани хромопластів
 - г. На виростах внутрішньої мембрани лейкопластів
266. Темнова фаза фотосинтезу відбувається
- а. На мембранах ендоплазматичної сітки
 - б. У стромі хлоропластів
 - в. На мембранах тилакоїдів у хлоропластах
 - г. На виростах внутрішньої мембрани лейкопластів
267. Пластиди належать до
- а. Одномембранних органел
 - б. Двомембранних органел
 - в. Органел руху
 - г. Клітинних включень
268. Забарвлення хромопластів визначається наявністю
- а. Гемоглобіну
 - б. Гемоціаніну
 - в. Каротиноїдів
 - г. Хроматину
269. Функція лейкопластів
- а. Запасання крохмалю
 - б. Синтез білків
 - в. Синтез ліпідів
 - г. Фотосинтез
270. Профаза мітозу характеризується

- а. Спіралізацією хроматину і формуванням хромосом
- б. Розташуванням хромосом в екваторіальній площині клітини
- в. Деспіралізацією хромосом
- г. Подвоєнням ДНК

271. Метафаза мітозу характеризується

- а. Поділом центромер і розходженням хроматид
- б. Розташуванням хромосом в екваторіальній площині клітини
- в. Деспіралізацією хромосом
- г. Подвоєнням ДНК

272. Анафаза мітозу характеризується

- а. Спіралізацією хроматину і формуванням хромосом
- б. Поділом центромер і розходженням хроматид до полюсів клітини
- в. Деспіралізацією хромосом
- г. Подвоєнням ДНК

273. Телофаза мітозу характеризується

- а. Спіралізацією хроматину і формуванням хромосом
- б. Розташуванням хромосом в екваторіальній площині клітини
- в. Деспіралізацією хромосом і формуванням ядерних оболонок
- г. Подвоєнням ДНК

274. Інтерфаза клітинного циклу характеризується

- а. Поділом центромер і розходженням хроматид
- б. Розташуванням хромосом в екваторіальній площині клітини
- в. Деспіралізацією хромосом і формуванням ядерних оболонок
- г. Подвоєнням ДНК

275. Найкоротшим періодом клітинного циклу є

- а. Профаза мітозу
- б. Метафаза мітозу
- в. Анафаза мітозу
- г. Інтерфаза

276. Руйнується ядерна оболонка і починає формуватись веретено поділу в

- а. Профазі мітозу
- б. Метафазі мітозу
- в. Телофазі мітозу
- г. Інтерфазі

277. Завершується процес спіралізації хромосом і формування веретена поділу в

- а. Профазі мітозу
- б. Анафазі мітозу
- в. Телофазі мітозу
- г. Інтерфазі

278. Руйнується веретено поділу і формуються ядерні оболонки в

- а. Профазі мітозу
- б. Метафазі мітозу
- в. Телофазі мітозу
- г. Интерфазі

279. Поділ ядра, за якого хромосоми випадково розподіляються між дочірніми ядрами

- а. Амітоз
- б. Мітоз
- в. Множинний поділ
- г. Ендомітоз

280. Редукційний поділ клітини

- а. Амітоз
- б. Мейоз
- в. Множинний поділ
- г. Ендомітоз

281. Мейоз відбувається при утворенні

- а. Гамет у тварин і спор у рослин
- б. Ендоспор у бактерій
- в. Зиготи у грибів
- г. Віроспор

282. Кількість послідовних поділів при мейозі

- а. Два
- б. Три
- в. П'ять
- г. Шість

283. Кон'югація гомологічних хромосом при мейозі відбувається в

- а. Интерфазі між двома послідовними поділами
- б. Профазі I
- в. Метафазі
- г. Анафазі I

284. Пари гомологічних хромосом, які кон'югують при мейозі

- а. Хромери
- б. Біваленти
- в. Хіазми
- г. Центромери

285. Процес кросинговеру між гомологічними хромосомами відбувається в

- а. Профазі I
- б. Метафазі I
- в. Анафазі I
- г. Профазі II

286. Під час процесу кросинговеру

- а. Хромосоми деспіралізуються
- б. Пари хромосом розходяться до полюсів клітини
- в. Гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками
- г. Гомологічні хромосоми починають наближатись одна до одної

287. Меристема – це тканина рослин

- а. Механічна
- б. Покривна
- в. Основна
- г. Твірна

288. Різновидності твірної тканини за розташуванням на рослині:

- а. Стовпчаста, губчаста
- б. Верхівкова, бічна, вставна
- в. Первинна, вторинна, третинна
- г. Асиміляційна, запасуюча, повітроносна

289. Живі, дрібні клітини з тонкою клітинною стінкою, що щільно прилягають одна до одної і швидко діляться, характерні для тканини рослин

- а. Основної
- б. Твірної
- в. Механічної
- г. Провідної

290. Живі, плоскі, прозорі клітини неправильної форми, що розташовані одним шаром і щільно прилягають одна до одної, характерні для тканини рослин

- а. Верхівкової твірної
- б. Механічної
- в. Провідної
- г. Первинної покривної

291. Живі, великі клітини різноманітної форми, з добре вираженими міжклітинниками характерні для тканини рослин

- а. Основної
- б. Твірної
- в. Провідної
- г. Покривної

292. Клітини меристеми рослин

- а. Живі, дрібні, з тонкою клітинною стінкою, швидко діляться, щільно прилягають одна до одної
- б. Живі, великі, різноманітної форми, з добре вираженими міжклітинниками
- в. Живі, у вигляді волокон, з дещо потовщеними клітинними стінками
- г. Мертві, з потовщеними клітинними стінками, які просочені суберином

293. Камбій, корковий камбій належать до тканини

- а. Вторинної покривної
- б. Верхівкової твірної
- в. Бічної твірної
- г. Вставної твірної

294. Клітини епідерми рослин
- а. Живі, у вигляді волокон, з дещо потовщеними клітинними стінками
 - б. Живі, великі, різноманітної форми, з добре вираженими міжклітинниками
 - в. Живі, дрібні, з тонкою клітинною стінкою, швидко діляться, щільно прилягають одна до одної
 - г. Живі, плоскі, прозорі, неправильної форми, розташовані одним шаром, щільно прилягають одна до одної
295. Плівка із воскоподібної речовини на поверхні шкірочки рослин
- а. Епідерма
 - б. Кутикула
 - в. Екзодерма
 - г. Слизовий шар
296. Спеціалізовані утворення епідерми пагона:
- а. Кореневі волоски, сочевички
 - б. Продихи, волоски (трихоми), залозисті клітини
 - в. Продихи, волоски (трихоми), сочевички
 - г. Продихи, сочевички, склереїди
297. Спеціалізовані утворення епідерми кореня (ризодерми)
- а. Продихи
 - б. Волоски (трихоми)
 - в. Сочевички
 - г. Кореневі волоски
298. Ризодерма – це
- а. Мезодерма первинної кори кореня
 - б. Ендодерма первинної кори кореня
 - в. Епідерма кореня
 - г. Епідерма пагона
299. Продихи епідерми пагона забезпечують
- а. Транспірацію і газообмін
 - б. Надходження повітря до органів дихання рослини
 - в. Процес переходу води із рідкого стану в газоподібний
 - г. Вбирання води надземною частиною рослини
300. Продихи утворені
- а. Попарно розміщеними клітинами бобоподібної форми, які мають хлоропласти і нерівномірно потовщені стінки
 - б. Мертвими клітинами, які мають потовщення на внутрішніх стінках – пояски Каспарі
 - в. Клітинами зірчастої форми, які мають хлоропласти і потовщені стінки
 - г. Без'ядерними клітинами циліндричної форми із розрідженою цитоплазмою
301. Між продиховими клітинами є
- а. Продихова сітка
 - б. Продихова щілина

- в. Продиховий канал
- г. Продихова сочевичка

302. Спеціалізовані утворення епідерми пагона, які служать для здійснення та регуляції транспірації і газообміну

- а. Продихи
- б. Трихоми
- в. Смоляні ходи
- г. Сочевички

303. Кореневі волоски – це

- а. Багатоклітинні спеціалізовані утворення перидерми кореня
- б. Багатоклітинні спеціалізовані утворення епідерми кореня
- в. Одноклітинні спеціалізовані утворення ризодерми
- г. Одноклітинні спеціалізовані утворення перидерми

304. Корок – це

- а. Запасаюча паренхіма
- б. Механічна тканина
- в. Первинна покривна тканина
- г. Вторинна покривна тканина

305. При вторинному потовщенні стебла епідерма замінюється

- а. Лубом
- б. Корком
- в. Екзодермою
- г. Ендодермою

306. Корок входить до складу

- а. Перидерми
- б. Екзодерми
- в. Ендодерми
- г. Мезодерми

307. Клітини корка

- а. Живі, з нерівномірно потовщеними клітинними стінками
- б. Мертві, з потовщеними та просоченими суберином клітинними стінками
- в. Живі, з дещо потовщеними та просоченими суберином клітинними стінками
- г. Мертві, з нерівномірно потовщеними та просоченими лігніном клітинними стінками

308. Сочевички – це

- а. Бульбочкоподібні потовщення на коренях рослин
- б. Одномембранні органели рослинної клітини, заповнені клітинним соком
- в. Спеціальні отвори у корку, які служать для здійснення газообміну
- г. Спеціалізовані утворення епідерми пагона, які служать для здійснення та регуляції транспірації і газообміну

309. Спеціальні отвори у корку, які служать для здійснення газообміну

- а. Трихоми
 - б. Смоляні ходи
 - в. Сочевички
 - г. Пори
310. Стінки клітин корка просочені
- а. Суберином
 - б. Кутином
 - в. Хітином
 - г. Глікогеном
311. Паренхіма – це тканина рослин
- а. Провідна
 - б. Твірна
 - в. Механічна
 - г. Основна
312. Клітини паренхіми рослин
- а. Мертві, заповнені повітрям або смолянистими речовинами
 - б. Живі, великі, різноманітної форми
 - в. Живі, дрібні, щільно прилягають одна до одної, швидко діляться
 - г. Мертві, циліндричної форми, із зруйнованими поперечними стінками
313. Різновидності основної тканини рослин:
- а. Коленхіма, склеренхіма
 - б. Верхівкова, бічна, вставна
 - в. Асиміляційна, запасуюча, повітроносна
 - г. Первинна, вторинна, третинна
314. Паренхіма листка називається
- а. Мезофіл
 - б. Камбій
 - в. Епідерма
 - г. Ризодерма
315. Різновидності мезофілу:
- а. Головний, додатковий, бічний
 - б. Стовпчастий, губчастий
 - в. Первинний, вторинний
 - г. Висхідний, низхідний
316. Асиміляційна паренхіма
- а. Заповнює серцевину та кору стебел і коренів, запасає поживні речовини
 - б. Міститься у всіх зелених частинах рослини, її клітини фотосинтезують
 - в. Заповнює м'які частини плодів, запасає поживні речовини
 - г. Створює своєрідний скелет рослини, забезпечує опору
317. Судини (трахеї) і трахеїди – це елементи провідної тканини, які забезпечують

- а. Висхідний транспорт води і розчинених у ній органічних речовин
- б. Висхідний транспорт води і розчинених у ній мінеральних солей
- в. Низхідний транспорт води і розчинених у ній органічних речовин
- г. Низхідний і висхідний транспорт води й розчинених у ній органічних речовин та мінеральних солей

318. Ситоподібні трубки – це елементи провідної тканини, які забезпечують

- а. Висхідний транспорт води і розчинених у ній органічних речовин
- б. Висхідний транспорт води і розчинених у ній мінеральних солей
- в. Низхідний транспорт води і розчинених у ній органічних речовин
- г. Низхідний і висхідний транспорт води й розчинених у ній органічних речовин та мінеральних солей

319. Замикаючі клітини продиху розміщуються серед клітин...

- а. епідермісу
- б. корку
- в. коленхіми
- г. ендодерми

320. Сочевички – це специфічні ділянки...

- а. епідерми
- б. коленхіми
- в. корку
- г. склеренхіми

321. Коленхіма – це...

- а. твірна тканина
- б. механічна тканина
- в. покривна тканина
- г. видільна тканина

322. Судинно-волокнисті пучки бувають...

- а. первинні і вторинні
- б. відкриті і закриті
- в. прості і складні
- г. малі і великі

323. За допомогою бічної твірної тканини...

- а. утворюються квіти та плоди
- б. потовщуються пагони та корені
- в. утворюються листки
- г. видовжуються кореневища та квітконоси

324. Спермії пилкового зерна покритонасінних рослин утворюються із...

- а. репродуктивної клітини
- б. вегетативної клітини
- в. інтини
- г. тапетума

325. Зародковий мішок покритонасінних містить...
- а. чоловічу гамету
 - б. насінний зачаток
 - в. зародок
 - г. яйцеклітину
326. Сформований зародковий мішок покритонасінних рослин складається із...
- а. 9 клітин
 - б. 5 клітин
 - в. 7 клітин
 - г. 6 клітин
327. Найбільший об'єм у типових клітинах рослинного організму займають...
- а. ядра
 - б. вакуолі
 - в. лейкопласти
 - г. хромосоми
328. Подвійне запліднення є характерною ознакою всіх...
- а. рослин, що ростуть на Землі
 - б. мохоподібних
 - в. покритонасінних рослин
 - г. голонасінних рослин
329. Для спорофіту папоротеподібних характерна:
- а. наявність ризоїдів
 - б. наявність кореневищ
 - в. відсутність судин
 - г. утворення статевих клітин
330. У гаметофіту папоротеподібних наявні:
- а. корені
 - б. кореневища
 - в. спорангії
 - г. архегонії та антеридії
331. Пилок у голонасінних переноситься:
- а. вітром
 - б. комахами
 - в. водою
 - г. механічно
332. Мохи і папороті подібні в тому, що мають:
- а. провідні тканини
 - б. кореневища
 - в. корені
 - г. у життєвому циклі чергування поколінь
333. Сфагнум на відміну від політриха звичайного:

- а. не має ризоїдів
- б. має ризоїди
- в. утворює спори
- г. має прості судини

334. Ендосперм голонасінних розвивається із:

- а. спори
- б. центральної клітини
- в. зародкового мішка
- г. зиготи

335. Першою клітиною диплоїдного покоління у вищих рослин є:

- а. яйцеклітина
- б. спермій
- в. зигота
- г. спора

336. Першою клітиною гаплоїдного покоління у вищих рослин є:

- а. яйцеклітина
- б. спермій
- в. зигота
- г. спора

337. Насінний зачаток голонасінних складається із:

- а. покриву й ендосперму
- б. покриву та нуцелусу
- в. покриву, ендосперму і зародкового мішка
- г. ендосперму і зародкового мішка

338. Насінина голонасінних розвиваються із:

- а. зиготи
- б. бруньки
- в. насінного зачатка
- г. зародкового мішка

339. Які ознаки грибів наближають їх до тварин?

- а. Загальна організація вегетативного тіла
- б. Гетеротрофний тип живлення
- в. Спосіб розмноження
- г. Характер росту

340. Які з наведених критеріїв не використовують у систематиці водоростей?

- а. Типи фотосинтетичних пігментів
- б. Природа покривів клітини
- в. Типи провідних тканин
- г. Будова тіла

341. У мохоподібних, на відміну від інших вищих рослин:

- а. у життєвому циклі переважає спорофіт
- б. гаметофіт не здатний до самостійного живлення
- в. у життєвому циклі переважає гаметофіт
- г. спорофіт гаплоїдний

342. Яка з частин тіла мохів належить статевому поколінню?

- а. Спорогон
- б. Ризоїди
- в. Стопа
- г. Коробочка

343. Яка з частин тіла мохів належить нестатевому поколінню?

- а. Коробочка
- б. Листочки
- в. Ризоїди
- г. Архегонії

344. Назвіть геологічний період, коли плауноподібні і хвощеподібні домінували у флорі Землі:

- а. Девон
- б. Карбон
- в. Палеоген
- г. Антропоген.

345. Розетки листків чоловічої папороті:

- а. гаплоїдні
- б. диплоїдні
- в. утворюють заростки
- г. належать статевому поколінню

346. Соруси чоловічої папороті розвиваються:

- а. а нижній поверхні заростка
- б. у спорангіях
- в. з нижнього боку листків
- г. у пазухах листків

347. Яка ознака не характеризує більшості пасльонових?

- а. трав'яниста життєва форма
- б. віночок складається з 4 пелюсток
- в. прості розчленовані листкові пластинки
- г. плоди ягоди або коробочки

348. Серед грибів відсутні:

- а. гетеротрофи
- б. автотрофи
- в. паразити
- г. симбіонти

349. Можливість швидко всмоктувати і утримувати велику кількість води у сфагнуму обумовлена:

- а. існуванням у водоймах
- б. наявністю спеціальних водоносних клітин
- в. наявністю коренів
- г. щільним шаром кутикули на поверхні листків

350. Симбіонтами лишайників є...

- а. Гриби і мохи
- б. Гриби і водорості
- в. Водорості і мохи
- г. Мохи та інфузорії

351. Який вигляд має тіло ацетабулярії?

- а. Пластинки
- б. Парасольки
- в. Сферичної клітини
- г. Розгалуженого кущика

352. Для прокаріотичної клітини характерна відсутність

- а. Клітинної стінки
- б. Мітохондрій
- в. ДНК
- г. Плазматичної мембрани

353. Бактеріальні клітини у вигляді паличок, що мають форму спіралі із джгутиком –

- а. Коки
- б. Вібріони
- в. Бацили
- г. Спірохети

354. Бактеріальні клітини у вигляді паличок, що мають форму коми із джгутиком –

- а. Коки
- б. Вібріони
- в. Бацили
- г. Спірили

355. Бактеріальні клітини кулястої форми –

- а. Коки
- б. Вібріони
- в. Бацили
- г. Спірили

356. Спосіб живлення рослин –

- а. Фотоавтотрофний
- б. Хемоавтотрофний
- в. Фотогетеротрофний
- г. Хемогетеротрофний

357. Для рослинної клітини не характерні

- а. Рибосоми, лізосоми, скоротливі вакуолі
- б. Пластиди, вакуолі, комплекс Гольджі
- в. Лізосоми, клітинний центр, мікротрубочки
- г. Глікокалікс, пелікула, травні вакуолі

358. Тільки для рослинної клітини характерні

- а. Рибосоми, целюлозна клітинна стінка, мікротрубочки
- б. Ядерця, ендоплазматична сітка, пластиди
- в. Великі вакуолі, мітохондрії, клітинний центр
- г. Целюлозна клітинна стінка, великі вакуолі, пластиди

359. Основна запасна речовина у рослин –

- а. Целюлоза
- б. Глікоген
- в. Крохмаль
- г. Хітин

360. До вищих спорових рослин належать

- а. Бурі і червоні водорості
- б. Папороті, голонасінні
- в. Мохи, папороті, хвощі, плауни
- г. Водорості, мохи

361. Процес утворення органічних речовин з неорганічних у хлоропластах з використанням енергії світла –

- а. Дихання
- б. Фотодихання
- в. Хемосинтез
- г. Фотосинтез

362. Типи рослинних тканин:

- а. Твірна, покривна, сполучна, провідна, опорно-рухова
- б. Твірна, епітеліальна, провідна, механічна, основна
- в. Епітеліальна, сполучна, провідна, механічна
- г. Твірна, покривна, основна, провідна, механічна

363. Плівка із воскоподібної речовини на поверхні шкірочки рослин –

- а. Епідерма
- б. Кутикула
- в. Кірка
- г. Екзодерма

364. Попарно розміщені клітини епідерми пагона, які мають бобоподібну форму, хлоропласти і нерівномірно потовщені стінки, утворюють

- а. Продихи
- б. Трихоми
- в. Шкірні залози
- г. Сочевички

365. Вегетативні органи рослин служать для

- а. Підтримання життєдіяльності та нестатевого розмноження
- б. Підтримання життєдіяльності та статевого розмноження
- в. Вегетативного і статевого розмноження
- г. Здійснення функції гетеротрофного живлення

366. Вегетативний орган рослин з необмеженим ростом, який здійснює поглинання й транспорт води та розчинених мінеральних солей –

- а. Квітка
- б. Стебло
- в. Листок
- г. Корінь

367. До основних функцій кореня не належить

- а. Поглинання й транспорт води
- б. Поглинання й транспорт розчинених мінеральних солей
- в. Поглинання й транспорт розчинених органічних речовин
- г. Закріплення рослини в субстраті

368. Із зародкового корінця формується

- а. Кореневище
- б. Додатковий корінь
- в. Головний корінь
- г. Бічний корінь першого порядку

369. Від стебел і листків можуть відходити

- а. Ризоїди
- б. Додаткові корені
- в. Головні корені
- г. Бічні корені першого порядку

370. Коренева бульба – це

- а. Потовщена верхівка підземного пагона
- б. Потовщений додатковий корінь
- в. Потовщений бічний корінь
- г. Потовщений головний корінь

371. Коренеплід – це

- а. Потовщена верхівка підземного пагона
- б. Потовщений додатковий корінь
- в. Потовщений бічний корінь
- г. Потовщений головний корінь

372. Коренева система – це

- а. Сукупність усіх коренів рослини
- б. Сукупність бічних коренів різних порядків
- в. Сукупність кореневих волосків
- г. Провідна система кореня

373. Стрижнева коренева система характеризується
- а. Відсутністю кореневої шийки
 - б. Наявністю кількох головних коренів
 - в. Відсутністю вираженого головного кореня, великою кількістю бічних коренів
 - г. Наявністю добре вираженого головного кореня
374. Мичкувата коренева система характеризується
- а. Відсутністю кореневої шийки
 - б. Наявністю кількох головних коренів
 - в. Відсутністю вираженого головного кореня, великою кількістю бічних Коренів, майже однакових за розмірами
 - г. Відсутністю вираженого головного кореня, великою кількістю додаткових коренів, майже однакових за розмірами
375. Стрижнева коренева система характерна для
- а. Голонасінних та однодольних покритонасінних
 - б. Голонасінних та дводольних покритонасінних
 - в. Всіх покритонасінних
 - г. Папоротеподібних і голонасінних
376. Мичкувата коренева система характерна для
- а. Однодольних покритонасінних
 - б. Дводольних покритонасінних
 - в. Всіх покритонасінних
 - г. Голонасінних
377. Основна запасна речовина у тварин
- а. Целюлоза
 - б. Глікоген
 - в. Крохмаль
 - г. Хітин
378. Товстостінне довгоживуче утворення у одноклітинних тварин, яке служить для перенесення несприятливих умов –
- а. Фіна
 - б. Циста
 - в. Пелікула
 - г. Зигота
379. Рухові реакції на зовнішні подразники у найпростіших –
- а. Тропізми
 - б. Рефлекси
 - в. Таксиси
 - г. Настії
380. Вирости цитоплазми у саркодових, які служать для руху і фагоцитозу –
- а. Псевдоподії
 - б. Мікрофіламенти

- в. Джгутики
- г. Війки

381. Органели, які виконують функцію осморегуляції у найпростіших –

- а. Скоротливі вакуолі
- б. Травні вакуолі
- в. Мітохондрії
- г. Рибосоми

382. Спосіб нестатевого розмноження у більшості найпростіших –

- а. Вегетативне
- б. Кон'югація
- в. Стробіляція
- г. Поділ

383. До класу Джгутикові належить

- а. Малярійний плазмодій
- б. Амеба дизентерійна
- в. Евглена зелена
- г. Інфузорія-туфелька

384. Амеба дизентерійна належить до класу

- а. Корененіжки
- б. Джгутикові
- в. Інфузорії
- г. Війчасті

385. Евглена зелена належить до класу

- а. Корененіжки
- б. Джгутикові
- в. Інфузорії
- г. Війчасті

386. Тимчасові вирости цитоплазми, які не мають ущільненої клітинної оболонки, у найпростіших –

- а. Фімбрії
- б. Ворсинки
- в. Війки
- г. Псевдоніжки

387. Поодинокі довгі вирости цитоплазми з ущільненою клітинною оболонкою, за допомогою яких здійснюється функція руху у найпростіших –

- а. Фімбрії
- б. Ворсинки
- в. Війки
- г. Джгутики

388. Чисельні короткі вирости цитоплазми з ущільненою клітинною оболонкою, за допомогою яких здійснюється функція руху у найпростіших –

- а. Фімбрії
- б. Ворсинки
- в. Війки
- г. Джгутики

389. Кількість скоротливих вакуолей у клітині амеби протей –

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

390. Кількість скоротливих вакуолей у клітині інфузорії-туфельки –

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

391. Органели клітини інфузорії-туфельки, які складаються із центрального резервуара і привідних каналців –

- а. Скоротливі вакуолі
- б. Травні вакуолі
- в. Мітохондрії
- г. Рибосоми

392. Кількість ядер у клітині інфузорії-туфельки –

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

393. Малярійний плазмодій потрапляє до організму людини

- а. З їжею
- б. Повітряно-крапельним шляхом
- в. Під час забруднення ран
- г. Під час укусу самки комара

394. Трипаносоми потрапляють до організму людини

- а. З їжею
- б. Повітряно-крапельним шляхом
- в. Під час забруднення ран
- г. Під час укусу мухи цеце

395. Основним господарем малярійного плазмодія є

- а. Рачок циклоп
- б. Москіт
- в. Муха цеце;
- г. Самка малярійного комара

396. Проміжним господарем малярійного плазмодія є

- а. Рачок циклоп
- б. Москіт
- в. Людина
- г. Малярійний комар

397. Представники типу Найпростіші, які беруть участь в утворенні осадових порід –

- а. Лейшманії
- б. Трипаносоми
- в. Лямблії
- г. Форамініфери

398. Багатоклітинні водні організми, які ведуть прикріплений спосіб життя, мають асиметричне тіло з великою порожниною всередині; дещо диференційовані клітини, не організовані в тканини, розміщені двома шарами; скелет (вапняковий, кременистий або роговий) –

- а. Губки
- б. Голкошкірі
- в. Найпростіші
- г. Молюски

399. Вапняковий, кременистий або роговий скелет характерний для

- а. Губок
- б. Кишковопорожнинних
- в. Плоских червів
- г. Круглих червів

400. Відновлення втрачених або пошкоджених частин тіла –

- а. Автогамія
- б. Плазмоліз
- в. Неотенія
- г. Регенерація

401. Високу здатність до регенерації мають

- а. Найпростіші
- б. Губки
- в. Молюски
- г. Круглі черви

402. М'язи у плоских червів

- а. Поздовжні, кільцеві, косі
- б. Тільки кільцеві
- в. Тільки косі
- г. Відсутні

403. Проміжки між органами у плоских червів заповнені

- а. Порожнинною рідиною
- б. Кров'ю
- в. Гемолімфою
- г. Пухкою сполучною тканиною

404. Кишечник у вільноживучих плоских червів
- а. Наскрізний, з ворсинками
 - б. Сліпо замкнений, з порами
 - в. Наскрізний, нерозгалужений
 - г. Сліпо замкнений, розгалужений
405. Газообмін у вільноживучих плоских червів відбувається через
- а. Зяброві капіляри
 - б. Зяброві пори
 - в. Стінки трахей
 - г. Покриви тіла
406. Кровоносна система у плоских червів
- а. Незамкнена, представлена тільки судинами
 - б. Замкнена, представлена тільки судинами
 - в. Незамкнена, представлена судинами і серцем
 - г. Відсутня
407. Нервова система драбинчастого типу характерна для представників типу
- а. Плоскі черви
 - б. Членистоногі
 - в. Молюски
 - г. Хордові
408. Кількість нервових стовбурів у нервовій системі плоских червів –
- а. 1
 - б. 2
 - в. 3
 - г. 4
409. Тип Плоскі черви включає класи:
- а. Малоцетинкові, Багатоцетинкові, П'явки;
 - б. Гідроїдні поліпи, Коралові поліпи, Сцифоїдні медузи;
 - в. Війчасті, Сисуни, Стъожкові;
 - г. Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.
410. Тип Плоскі черви належить до класу...
- а. Стъожкові
 - б. Малоцетинкові
 - в. Головногі
 - г. П'явки
411. Клас, який належить до типу Плоскі черви –
- а. П'явки
 - б. Малоцетинкові
 - в. Війчасті
 - г. Нематоди
412. Вільноживучий представник типу Плоскі черви –

- а. Бичачий ціп'як
- б. Широкий стьожак
- в. Печінковий сисун
- г. Планарія біла

413. Клас типу Плоскі черви, представники якого є вільноживучими організмами –

- а. Малощетинкові
- б. Нематоди
- в. Війчасті
- г. Сисуни

414. Представник типу Плоскі черви, паразит людини і великої рогатої худоби –

- а. Аскарида людська
- б. Планарія біла
- в. Печінковий сисун
- г. П'явка кінська

415. Найбільшого розміру досягає доросла форма

- а. Бичачого солітера
- б. Печінкового сисуна
- в. Широкого стьожака
- г. Котячої двоустки

416. Найбільшого розміру досягає фіна

- а. Бичачого солітера
- б. Свинячого солітера
- в. Широкого стьожака
- г. Ехінокока

417. Людина для озброєного ціп'яка є

- а. Тільки основним господарем
- б. Тільки проміжним господарем
- в. Одночасно і основним, і проміжним господарем
- г. Коменсалом

418. Людина для ехінокока є

- а. Тільки основним господарем
- б. Тільки проміжним господарем
- в. Одночасно і основним, і проміжним господарем
- г. Коменсалом

419. Органи прикріплення у неозброєного ціп'яка

- а. Представлені присосками
- б. Представлені гачечками
- в. Представлені прищепками
- г. Представлені клейкими нитками

420. Видовжене, несегментоване, округле в поперечному перерізі тіло характерне для представників типу

- а. Плоскі черви
- б. Круглі черви
- в. Кільчасті черви
- г. Членистоногі

421. Ротовий отвір у круглих червів

- а. Оточений щелепами і ногощелепами
- б. Оточений щупальцями
- в. Оточений трьома губами, на яких є смакові сосочки
- г. Оточений двома сфінктерами

422. Газообмін у круглих червів відбувається через

- а. Зяброві капіляри
- б. Зяброві пори
- в. Стінки трахей
- г. Покриви тіла

423. Двома каналами, що тягнуться вздовж тіла і в передній частині зливаються в один, який відкривається отвором назовні, у круглих червів представлена

- а. Дихальна система
- б. Кровоносна система
- в. Видільна система
- г. Травна система

424. Тип нервової системи у круглих червів –

- а. Стовбурова
- б. Розкидано-вузлова
- в. Драбинчаста
- г. Трубчаста

425. Круглі черви розмножуються

- а. Статево (роздільностатеві)
- б. Статево (гермафродити)
- в. Статево (роздільностатеві і гермафродити)
- г. Нестатево брунькуванням

426. Представник типу Круглі черви, який є паразитом рослин –

- а. Аскарида людська
- б. Аскарида кінська
- в. Аскарида свиняча
- г. Галова нематода

427. Представник типу Круглі черви (Нематоди), який є паразитом людини –

- а. Ґрунтова нематода
- б. Стеблова нематода
- в. Бурякова нематода
- г. Гострик

428. Вільноживучий представник типу Круглі черви –

- а. Ґрунтова нематода
- б. Стеблова нематода
- в. Бурякова нематода
- г. Галова нематода

429. Гострик паразитує в

- а. Кишечнику великої рогатої худоби
- б. Жовчних протоках великої рогатої худоби
- в. Кишечнику людини
- г. Жовчних протоках людини

430. Видовжене, сегментоване, округле в поперечному перерізі тіло характерне для представників типу

- а. Плоскі черви
- б. Круглі черви
- в. Кільчасті черви
- г. Членистоногі

431. Стінка тіла кільчастих червів –

- а. Шкірно-м'язовий мішок
- б. Синцитій
- в. Гіподерма
- г. Псевдоцель

432. Кровоносна система у кільчастих червів

- а. Незамкнена, представлена тільки судинами
- б. Замкнена, представлена тільки судинами
- в. Незамкнена, представлена судинами і серцем
- г. Замкнена, представлена судинами і серцем

433. У замкненій кровоносній системі

- а. Кров рухається тільки по судинах
- б. Кров циркулює тільки у порожнині тіла
- в. Кров рухається тільки у міжклітинних просторах
- г. Кров рухається по судинах і у порожнині тіла

434. Судини у кровоносній системі кільчастих червів, які у кожному членику сполучають між собою спинну і черевну судини –

- а. Кільцеві
- б. Поперечні
- в. Косі
- г. Прямі

435. Тип нервової системи у кільчастих червів –

- а. Стовбурова
- б. Навкологлоткове кільце та черевний нервовий ланцюжок
- в. Драбинчаста
- г. Трубчаста

436. Клас, який належить до типу Кільчасті черви –
- а. Малощетинкові
 - б. Турбеларії
 - в. Нематоди
 - г. Трематоди
437. До класу Малощетинкові належить
- а. Нереїс
 - б. Піскожил
 - в. Планарія біла
 - г. Дощовий черв'як
438. Особлива складка шкіри у молюсків, яка відростає від спинного боку тіла і секретує черепашку –
- а. Гіподерма
 - б. Мантия
 - в. Кутикула
 - г. Екзодерма
439. Порожнина у молюсків, сполучена з навколишнім середовищем, у яку відкриваються анальний, сечовидільний і статевий отвори –
- а. Плевральна
 - б. Мантийна
 - в. Гастральна
 - г. Первинна
440. Черепашка у представників класу Червоногі
- а. Зовнішня, спіральнотакручена, суцільна
 - б. Зовнішня, складається з двох симетричних частин
 - в. Зовнішня, складається з кількох несиметричних частин
 - г. Внутрішня, пластинчаста, суцільна
441. Шари черепашки молюсків:
- а. Поліморфний, зернистий, пірамідальний
 - б. Роговий, ростковий
 - в. Роговий, вапняковий, перламутровий
 - г. Кірковий, мозковий
442. Клас типу Молюски, у представників якого редукована голова –
- а. Червоногі
 - б. Двостулкові
 - в. Головоногі
 - г. Десятиногі
443. Клас типу Молюски, представники якого є фільтраторами –
- а. Червоногі
 - б. Двостулкові
 - в. Головоногі
 - г. Десятиногі

444. Органами дихання наземних і деяких прісноводних червононогих молюсків є
- а. Легеня
 - б. Зяброві щілини
 - в. Трахеї
 - г. Бронхи
445. До класу Червононогі належить
- а. Ставковик великий
 - б. Устриця
 - в. Беззубка
 - г. Дрейсена
446. Відділи тіла членистоногих:
- а. Голова, груди, черевце (головогруди, черевце)
 - б. Голова, тулуб, хвіст, кінцівки
 - в. Голова, шия, тулуб, хвіст
 - г. Голова, тулуб; щупальці
447. Кількість пар простих очей у павука-хрестовика –
- а. 1
 - б. 2
 - в. 3
 - г. 4
448. Органи дотику у комах –
- а. Антени
 - б. Антенули
 - в. Вібриси
 - г. Щупики
449. Органи зору у комах –
- а. Тільки фасеткові очі
 - б. Тільки прості очі
 - в. Фасеткові і прості очі
 - г. Хеліцери
450. Органами виділення у ракоподібних є
- а. Нерозгалужені мальпігієві судини
 - б. Розгалужені мальпігієві судини
 - в. Жирове тіло
 - г. Зелені залози
451. Ряд класу Комахи, представники якого мають тонкі прозорі крила першої пари і редуковані або видозмінені в дзижчальця крила другої пари, ротовий апарат сисного, лижучо-сисного або ріжучо-лижучого типу –
- а. Напівтвердокрилі
 - б. Лускокрилі

- в. Двокрилі
- г. Бабки

452. Комаха, личинки якої розвиваються у воді –

- а. Муха хатня
- б. Комар малярійний
- в. Блоха щуряча
- г. Воша людська

453. Ряд класу Комахи, представники якого мають сплющене з боків тіло, редуковані крила, ротовий апарат колючо-сисного типу, є ектопаразитами людини і ссавців –

- а. Напівтвердокрилі
- б. Лускокрилі
- в. Блохи
- г. Таргани

454. Розвиток з неповним метаморфозом (перетворенням) у комах включає послідовні стадії:

- а. Яйце → лялечка → імаго (доросла особина)
- б. Яйце → імаго → личинка → лялечка
- в. Яйце → імаго → личинка
- г. Яйце → личинка → імаго

455. Розвиток з повним метаморфозом (перетворенням) у комах включає послідовні стадії:

- а. Яйце → лялечка → імаго (доросла особина)
- б. Яйце → імаго → личинка → лялечка
- в. Яйце → імаго → личинка
- г. Яйце → личинка → лялечка → імаго

456. До ряду Павуки належить

- а. Тарантул
- б. Скорпіон
- в. Сольпуга
- г. Косарик

457. Спосіб регуляції функцій організму, що здійснюється через імпульси електрохімічної природи –

- а. Нервова
- б. Гуморальна
- в. Гомеостатична
- г. Зовнішня

458. До тваринних тканин не належить

- а. Епітеліальна
- б. Сполучна
- в. Основна
- г. М'язова

459. Тканина тварин і людини, клітини якої щільно прилягають одна до одної; виконує захисну, бар'єрну, всмоктувальну та секреторну функції –

- а. Епітеліальна
- б. Сполучна
- в. Основна
- г. М'язова

460. Епітелій, який вистилає шлунок, кишечник –

- а. Залозистий
- б. Одношаровий плоский
- в. Одношаровий кубічний
- г. Одношаровий циліндричний

461. Сполучна тканина, міжклітинна речовина якої за складом подібна до плазми крові, клітини виконують імунні функції –

- а. Щільна
- б. Хрящова
- в. Жирова
- г. Лімфа

462. Різновиди м'язової тканини:

- а. Роговіюча, нероговіюча
- б. Плоска, кубічна, циліндрична
- в. Компактна, губчаста
- г. Поперечносмугаста, гладенька, серцева

463. Мускулатура, волокна якої за будовою подібні до волокон поперечносмугастої мускулатури, але коротші і сполучені між собою за допомогою поверхневих відростків –

- а. Скелетна
- б. Гладенька
- в. Серцева
- г. Мієлоїдна

464. Гнучкість і пружність кісток (кісткової тканини) забезпечується

- а. Органічними речовинами міжклітинної речовини
- б. Неорганічними речовинами міжклітинної речовини
- в. Цитоплазматичними мітками між клітинами
- г. Спеціальними речовинами остеобластів

465. Види кісток:

- а. Довгі, короткі, пласкі
- б. Нерухомі, напіврухомі, рухомі
- в. Відвідні, привідні
- г. Тонкі, середні, широкі

466. Нерухомі з'єднання між кістками –

- а. Шви
- б. Злиття
- в. Блокоподібні суглоби
- г. Кулясті суглоби

467. З'єднання між тазовою та стегною кістками –
- а. Ліктьовий суглоб
 - б. Плечовий суглоб
 - в. Колінний суглоб
 - г. Кульшовий суглоб
468. Кістка, яка належить до лицьового відділу черепа –
- а. Вилична
 - б. Лобова
 - в. Тім'яна
 - г. Потилична
469. Єдина рухома кістка черепа –
- а. Вилична
 - б. Сконева
 - в. Тім'яна
 - г. Нижньощелепна
470. До мозкового відділу черепа належать кістки
- а. 2 лобові, 1 тім'яна, 2 скроневі, 1 потилична
 - б. 1 лобова, 2 тім'яні, 2 скроневі, 1 потилична
 - в. 1 лобова, 2 тім'яні, 1 сконева, 2 потиличні
 - г. 2 лобові, 1 тім'яна, 1 сконева, 2 потиличні
471. Відділ хребта, що складається з 7 хребців –
- а. Шийний
 - б. Грудний
 - в. Поперековий
 - г. Крижовий
472. Кількість хребців у поперековому відділі хребта –
- а. 3
 - б. 5
 - в. 7
 - г. 12
473. Тимчасова втрата працездатності м'яза –
- а. Сила м'яза
 - б. Швидкість скорочення м'яза
 - в. Витривалість м'яза
 - г. Стомлення м'яза
474. Чотириголовий м'яз стегна належить до м'язів
- а. Голови
 - б. Шиї
 - в. Тулуба
 - г. Нижніх кінцівок
475. Кількість пар ребер, що безпосередньо з'єднані з грудиною за допомогою хрящів –

- а. 5
- б. 6
- в. 7
- г. 8

476. Дихальна функція крові полягає в тому, що вона

- а. Транспортує O₂ і CO₂
- б. Транспортує поживні речовини
- в. Транспортує продукти обміну
- г. Забезпечує імунний захист організму

477. Гуморальна функція крові полягає в тому, що вона

- а. Транспортує O₂ і CO₂
- б. Транспортує поживні речовини
- в. Транспортує продукти обміну
- г. Транспортує гормони та інші БАР

478. Еритроцити мають форму

- а. Двовгнутого диска
- б. Двоопуклої лінзи
- в. Веретеноподібну
- г. Кубічну

479. Тривалість життя еритроцитів становить

- а. 30 днів
- б. 60 днів
- в. 120 днів
- г. 240 днів

480. Клітини крові, для яких характерний амебоїдний рух –

- а. Еритроцити
- б. Лейкоцити
- в. Тромбоцити
- г. Остеоцити

481. Зсідання крові можливе за наявності у плазмі білка

- а. Еластину
- б. Колагену
- в. Фібриногену
- г. Міозину

482. Аглютиніни – речовини білкової природи, що містяться

- а. В цитоплазмі тромбоцитів
- б. В цитоплазмі лейкоцитів
- в. В цитоплазмі еритроцитів
- г. У плазмі крові

483. Ритмічні коливання стінок артерій, зумовлені скороченням серця –

- а. Аритмія
- б. Серцевий автоматизм
- в. Кров'яний тиск
- г. Пульс

484. Судини, у яких найбільший тиск крові –

- а. Артерії
- б. Артеріоли
- в. Капіляри
- г. Вени

485. Аорта виходить із

- а. Лівого передсердя
- б. Правого передсердя
- в. Лівого шлуночка
- г. Правого шлуночка

486. Кровопостачання серця здійснюється

- а. Правую загальною сонною артерією
- б. Лівою загальною сонною артерією
- в. Правую підключичною артерією
- г. Коронарними артеріями

487. Судини, які несуть кров до серця –

- а. Артерії
- б. Вени
- в. Капіляри
- г. Зв'язки

488. Залози, що одні секрети виділяють через протоки назовні або в порожнини органів, а інші (гормони) – безпосередньо в кров –

- а. Екзокринні
- б. Ендокринні
- в. Змішаної секреції
- г. Загальні

489. Біологічно активні речовини різної хімічної природи, які в невеликих кількостях істотно впливають на функції організму (є факторами гуморальної регуляції) –

- а. Фітонциди
- б. Антигени
- в. Антитіла
- г. Гормони

490. Розростання окремих частин тіла, спричинене гіперфункцією гіпофіза щодо секреції соматотропного гормону в дорослому віці –

- а. Гігантизм
- б. Карликовість
- в. Акромегалія
- г. Мікседема

491. При гіпофункції щитоподібної залози в дорослому віці розвивається
- а. Базедова хвороба
 - б. Аддісонова хвороба
 - в. Акромегалія
 - г. Мікседема
492. Розростання щитоподібної залози, спричинене нестачею йоду в їжі –
- а. Зоб
 - б. Базедова хвороба
 - в. Акромегалія
 - г. Мікседема
493. Кортикостероїди є гормонами
- а. Кіркового шару наднирників
 - б. Мозкового шару наднирників
 - в. Задньої частки гіпофіза
 - г. Передньої частки гіпофіза
494. Сукупність структур, що поєднують, узгоджують, регулюють роботу органів і систем, забезпечують зв'язок організму з навколишнім середовищем, а також діяльність людини як соціальної істоти –
- а. Нервова система
 - б. Ендокринна система
 - в. Кровоносна система
 - г. Травна система
495. Сукупність клітин нервової тканини, які забезпечують в ЦНС механічну і трофічну підтримку нейронам –
- а. Синцитій
 - б. Нейроглія
 - в. Симпласт
 - г. Гіподерма
496. Довгий відросток, що проводить нервові імпульси від тіла нейрона –
- а. Синапс
 - б. Аксон
 - в. Дендрит
 - г. Перикаріон
497. Нейрон, який зв'язує між собою нейрони в ЦНС –
- а. Аферентний
 - б. Вставний
 - в. Еферентний
 - г. Руховий
498. Реакція організму у відповідь на будь-яке подразнення, яка здійснюється і контролюється нервовою системою –

- а. Таксис
- б. Тропізм
- в. Рефлекс
- г. Інстинкт

499. Сприймаючий апарат рефлекторної дуги –

- а. Рецептор
- б. Аферентний нейрон
- в. Вставний нейрон
- г. Еферентний нейрон

500. Рефлекторна функція спинного мозку полягає у

- а. Формуванні штучних умовних рефлексів
- б. Формуванні натуральних умовних рефлексів
- в. Здійсненні складних рухових рефлексів
- г. Забезпеченні інстинктів

501. Нерівності поверхні кори великих півкуль головного мозку:

- а. Звивини, борозни
- б. Піраміди, сосочки
- в. Вирости, ворсинки
- г. Частки, зони

502. До органів сечовидільної системи не належить

- а. Нирка
- б. Сечовід
- в. Сечовий міхур
- г. Надниркова залоза

503. Основна структурна і функціональна одиниця нирки –

- а. Піраміда
- б. Сосочок
- в. Частка
- г. Нефрон

504. М'язові трубки, які відводять сечу від нирок у сечовий міхур –

- а. Звивисті каналці
- б. Збирні трубки
- в. Ниркові піраміди
- г. Сечоводи

505. Інфекційне запалення слизової оболонки сечового міхура –

- а. Сечокам'яна хвороба
- б. Пієлонефрит
- в. Гломерулонефрит
- г. Цистит

506. Окиснювальні процеси в клітинах, внаслідок яких виділяється енергія –

- а. Зовнішнє дихання
- б. Внутрішнє дихання
- в. Фотодихання
- г. Асиміляція

507. Частина дихальних шляхів, з якої повітря надходить до гортані –

- а. Носова порожнина
- б. Трахея
- в. Бронхіоли
- г. Носоглотка

508. Між голосовими зв'язками знаходиться

- а. Надгортанник
- б. Клиноподібна пазуха
- в. Голосова пазуха
- г. Голосова щілина

509. Частина дихальних шляхів, з якої повітря надходить до бронхів –

- а. Носова порожнина
- б. Трахея
- в. Гортань
- г. Носоглотка

510. Війки епітелію слизової оболонки дихальних шляхів виштовхують відпрацьований слиз до

- а. Альвеол
- б. Ніздрів
- в. Бронхіол
- г. Носоглотки

511. При видиху

- а. Скорочуються зовнішні міжреберні м'язи і м'язи черевного пресу
- б. Скорочуються зовнішні міжреберні м'язи і діафрагма
- в. Розслаблюються зовнішні міжреберні м'язи і діафрагма
- г. Скорочуються внутрішні міжреберні м'язи і діафрагма

512. Сума резервного, дихального і додаткового об'ємів легеневого повітря –

- а. Корисний об'єм
- б. Зайвий об'єм
- в. Живий об'єм
- г. Життєва ємність легень

513. До складу травного каналу не належить

- а. Ротова порожнина
- б. Глотка
- в. Стравохід
- г. Печінка

514. Великими слинними залозами є:

- а. Підшлункова, печінка
- б. Шлункові, кишкові
- в. Привушні, під'язикові, підщелепні
- г. Головні, обкладові, додаткові

515. Печінка відкривається загальною протокою у порожнину

- а. Шлунка
- б. Сліпої кишки
- в. Ободової кишки
- г. Дванадцятипалої кишки

516. Кількість різців у зубному апараті людини –

- а. 4
- б. 6
- в. 8
- г. 10

517. Кров, що йде від кишечника, проходить через

- а. Селезінку
- б. Печінку
- в. Підшлункову залозу
- г. Нирки

518. Травлення білків починається у

- а. Ротовій порожнині
- б. Шлунку
- в. Дванадцятипалій кишці
- г. Порожній кишці

519. Фермент шлункового соку –

- а. Птіалін
- б. Трипсин
- в. Пепсин
- г. Сахараза

520. Сукупність біохімічних реакцій, які відбуваються в організмі і пов'язані з надходженням речовин, їх переробкою, видаленням продуктів життєдіяльності –

- а. Метаболізм
- б. Гомеостаз
- в. Стрес
- г. Синергізм

521. Сукупність процесів утворення складних органічних речовин із простіших з використанням енергії –

- а. Денатурація
- б. Ренатурація
- в. Асиміляція
- г. Дисиміляція

522. Надлишок глюкози в печінці перетворюється на

- а. Глікоген
- б. Гліцерин
- в. Целюлозу
- г. Пектин

523. Відсутність певних вітамінів в організмі –

- а. Гіповітаміноз
- б. Гіпервітаміноз
- в. Авітаміноз
- г. Аноксія

524. Надлишок певних вітамінів в організмі –

- а. Авітаміноз
- б. Гіповітаміноз
- в. Гіпервітаміноз
- г. Гіпотензія

525. До групи жиророзчинних належить вітамін

- а. В2
- б. В3
- в. В6
- г. Е

526. Вітамін, який бере участь у синтезі зорового пігменту (родопсину), сприяє проходженню обмінних процесів у епітеліальних тканинах –

- а. А
- б. Д3
- в. С
- г. К1

527. Вітамін, який є складовою частиною (коферментом) ферментів; забезпечує опірність організму до інфекційних захворювань –

- а. А
- б. Д
- в. С
- г. К

528. "Куряча сліпота" розвивається внаслідок гіпо- чи авітамінозу вітаміну

- а. А
- б. Д
- в. С
- г. К

529. Судини в організмі людини, які з одного боку сліпо замкнені –

- а. Артеріоли
- б. Вени

- в. Кровоносні капіляри
- г. Лімфатичні капіляри

530. Шар шкіри, утворений багат шаровим роговючим епітелієм –

- а. Епідерміс
- б. Дерма
- в. Підшкірна жирова клітковина
- г. Ендодерма

531. Шар епідермісу, утворений живими клітинами, які постійно діляться і забезпечують регенерацію –

- а. Пірамідальний
- б. Кірковий
- в. Мозковий
- г. Ростковий

532. У дермі шкіри відсутні

- а. Гладенькі м'язи
- б. Кровоносні судини
- в. Лімфатичні судини
- г. Меланоцити

533. Залози, які виділяють секрет, що змащує волосини і поверхню шкіри для їхнього пом'якшення й захисту –

- а. Слинні
- б. Слізні
- в. Сальні
- г. Потові

534. Ріст волосини відбувається

- а. На кінці стрижня
- б. В середині стрижня
- в. У корені
- г. У колодочці

535. Функція шкіри, яка полягає у перешкоджанні проникненню в організм різних речовин і мікроорганізмів із навколишнього середовища –

- а. Бар'єрна
- б. Запасна
- в. Видільна
- г. Сенсорна

536. Зміна просвітів кровоносних судин шкіри регулює

- а. Водно-сольовий обмін
- б. Серцевий ритм
- в. Дихання
- г. Тепловіддачу

537. Захворювання шкіри, що спричиняється кліщем свербуном –

- а. Дерматит
- б. Вітиліго
- в. Короста
- г. Молочниця

538. Відділ аналізатора, представлений нейронами кори великих півкуль –

- а. Периферичний
- б. Проміжний
- в. Центральний
- г. Вентральний

539. Біля 90% інформації про навколишній світ людина отримує завдяки

- а. Слуху
- б. Смаку
- в. Нюху
- г. Зору

540. Зовнішня оболонка очного яблука, утворена щільною сполучною тканиною –

- а. Склера
- б. Сітківка
- в. Склисте тіло
- г. Кришталік

541. Райдужка – це утворення

- а. Склери
- б. Сітківки
- в. Склистого тіла
- г. Судинної оболонки

542. Еластичне щільне прозоре утворення у формі двоопуклої лінзи, що міститься в ціліарному тілі судинної оболонки ока –

- а. Кришталік
- б. Райдужка
- в. Склисте тіло
- г. Зіниця

543. Фоторецептори сітківки ока, які подразнюються навіть присмерковим світлом і не розрізняють кольорів –

- а. Диски Меркеля
- б. Тільця Руффіні
- в. Волоскові клітини
- г. Палички

544. Зона найвиразнішого бачення в центрі сітківки ока (навпроти зіниці), де зосереджено найбільше колбочок –

- а. Ретикулярна формація
- б. Ромбоподібна ямка
- в. Жовта пляма
- г. Сліпа пляма

545. Частки кори, де розташована зорова сенсорна зона (вищі зорові центри) –
- а. Потилична
 - б. Сконева
 - в. Тім'яна
 - г. Лобова
546. Нечітке бачення наближених предметів як наслідок фокусування променів за сітківкою –
- а. Астигматизм
 - б. Дальтонізм
 - в. Косоокість
 - г. Далекозорість
547. Слуховий прохід є частиною
- а. Зовнішнього вуха
 - б. Середнього вуха
 - в. Внутрішнього вуха
 - г. Євстахієвої труби
548. Частина кісткового лабіринту, яка виконує функцію сприйняття звуку –
- а. Завитка
 - б. Присінок
 - в. Круглий мішечок
 - г. Овальний мішечок
549. Рецептори органа смаку –
- а. Хеморецептори
 - б. Фоторецептори
 - в. Механорецептори
 - г. Терморецептори
550. Природжені, відносно постійні реакції організму на дію зовнішнього і внутрішнього середовища, що здійснюються за участю нервової системи –
- а. Таксиси
 - б. Тропізми
 - в. Безумовні рефлекси
 - г. Умовні рефлекси
551. Безумовні рефлекси, що забезпечують повертання голови та тіла у бік світлового чи звукового подразника, належать до
- а. Харчових
 - б. Дихальних
 - в. Захисних
 - г. Орієнтувальних
552. Реакції організму на дію зовнішнього середовища, що здійснюються за участю нервової системи, виникають впродовж життя, мають тимчасовий характер і можуть згасати зі зміною умов –
- а. Таксиси
 - б. Тропізми

- в. Безумовні рефлекси
- г. Умовні рефлекси

553. Тимчасові зв'язки між нервовими центрами аналізаторів безумовного й умовного подразників встановлюються при формуванні

- а. Таксисів
- б. Інстинктів
- в. Безумовних рефлексів
- г. Умовних рефлексів

554. Система послідовних закріплених тимчасових нервових зв'язків (умовних рефлексів), що утворилась у відповідь на постійно повторювану систему умовних подразників –

- а. Динамічний стереотип
- б. Навички
- в. Звички
- г. Пам'ять

555. Звивисті каналці нефронів впадають у

- а. Сечовід
- б. Збирну трубку
- в. Ниркову капсулу
- г. Ниркову миску

556. Вкажіть науку, яка вивчає живі організми, їхню будову, хімічний склад, процеси життєдіяльності, угруповання, зв'язки з довкіллям:

- а. географія;
- б. хімія;
- в. біологія;
- г. фізика.

557. Вкажіть основну структурну й функціональну одиницю живого:

- а. білок;
- б. нуклеїнова кислота;
- в. клітина;
- г. тканина.

558. Оберіть процес отримання живими організмами поживних речовин з довкілля:

- а. подразливість;
- б. живлення;
- в. розмноження;
- г. виділення.

559. Вкажіть здатність живих організмів сприймати впливи навколишнього середовища і певним чином відповідати на них:

- а. подразливість;
- б. живлення;
- в. розмноження;
- г. виділення.

560. Визначте здатність живих організмів відтворювати собі подібних:

- а. подразливість;
- б. живлення;
- в. розмноження;
- г. виділення.

561. Вкажіть назву науки про рослини:

- а. зоологія;
- б. ботаніка;
- в. математика;
- г. хімія.

562. Вкажіть мову, якою пишуться міжнародні наукові назви організмів:

- а. англійська;
- б. українська;
- в. латинська;
- г. німецька.

563. Вкажіть науку, яка вивчає гриби:

- а. вірусологія;
- б. мікологія;
- в. екологія;
- г. цитологія.

564. Вкажіть науку, яка вивчає хімічний склад клітини:

- а. біохімія;
- б. цитологія;
- в. мікологія;
- г. бактеріологія.

565. Вкажіть науку, що вивчає життєві функції організмів:

- а. вірусологія;
- б. бактеріологія;
- в. фізіологія;
- г. ботаніка.

566. Вкажіть, як називається наука, що вивчає будову клітин:

- а. ботаніка;
- б. цитологія;
- в. фізіологія;
- г. екологія.

567. Визначте, як називається наука, що вивчає тварин:

- а. бактеріологія;
- б. зоологія;
- в. цитологія;
- г. мікологія.

568. Вкажіть, як називається наука, що вивчає взаємозв'язки організмів між собою та зовнішнім середовищем:

- а. вірусологія;
- б. мікологія;
- в. екологія;
- г. ботаніка.

569. З'ясуйте що вивчає систематика:

- а. хімічний склад клітини;
- б. будову клітин;
- в. життєві функції організмів;
- г. різноманітність живих істот.

570. Дайте визначення тканини:

- а. основна структурна й функціональна одиниця живого;
- б. група клітин, які мають подібну будову, спільне походження та виконують спільні функції;
- в. частина організму, яка має притаманну їй будову, займає певне положення та виконує певні функції;
- г. життєва форма рослин.

571. Дайте визначення органа:

- а. основна структурна й функціональна одиниця живого;
- б. група клітин, які мають подібну будову, спільне походження та виконують спільні функції;
- в. частина організму, яка має притаманну їй будову, займає певне положення та виконує певні функції.
- г. життєва форма рослин.

572. Вкажіть найпоширеніші та найважливіші пігменти рослин:

- а. жири;
- б. хлорофіли;
- в. вуглеводи;
- г. білки.

573. Вкажіть явище утворення органічних речовин з неорганічних з використанням енергії сонячних променів:

- а. обмін речовин;
- б. виділення;
- в. хемосинтез;
- г. фотосинтез.

574. Вкажіть основну характерну ознаку представників царства Рослини:

- а. обмін речовин;
- б. подразливість;
- в. фотосинтез;
- г. розмноження.

575. Вкажіть ознаки рослин, які називаються нижчими:

- а. які мають невеликі розміри;
- б. які мають тканини і органи;
- в. тіло яких не почленоване на органи;
- г. які живуть у водоймах.

576. Вкажіть ознаки рослин, які називаються вищими:

- а. які мають невеликі розміри;
- б. які мають тканини і органи;
- в. тіло яких не почленоване на органи;
- г. які живуть у водоймах.

577. Серед наведених рослин вкажіть представників нижчих:

- а. мохи;
- б. водорості;
- в. плауни;
- г. папороті.

578. Відомо, що в зародку насінини одночасно з брунькою закладається зародковий корінь. Вкажіть, на який вид кореня він перетвориться на проростанні:

- а. головний;
- б. бічний;
- в. додатковий;
- г. ходульний.

579. Назвіть утворення на підземній частині стебла, із якого розвиваються додаткові пагони і численні додаткові корені мичкуватої кореневої системи:

- а. мікориза;
- б. коренеплід;
- в. коренева бульба;
- г. вузол кущіння.

580. З'ясуйте, яке добриво посилює засвоєння азоту з повітря коренями гороху та конюшини:

- а. калієва селітра;
- б. амонійна селітра;
- в. азотобактерин;
- г. хлорид калію.

581. Вкажіть, чим коренебульба відрізняється від коренеплоду:

- а. тим, що запасає поживні речовини;
- б. тим, що є видозміною пагона;
- в. тим, що є видозміною додаткових або бічних коренів;
- г. тим, що є видозміною головного кореня.

582. Назвіть рослину, стебло якої тригранне:

- а. осока;
- б. береза;
- в. кактус опунція;
- г. липа.

583. Відшукайте рослину, стебло якої чотиригранне:

- а. тополя;
- б. м'ята;
- в. валеріана;
- г. осока.

584. Назвіть рослину, стебло якої сплющене:

- а. осока;
- б. валеріана;
- в. кактус опунція;
- г. кукурудза.

585. Визначте кількість камбіальних кілець у стовбурі десятирічного дуба:

- а. 1;
- б. 2;
- в. 10;
- г. 5.

586. Вкажіть, що розвивається з бруньок кореневища:

- а. кореневі волоски;
- б. бічні корені;
- в. надземні пагони;
- г. додаткові корені.

587. Назвіть потовщення одного чи кількох міжвузлів стебла, в яких відкладаються поживні речовини:

- а. стеблові бульби;
- б. цибулини;
- в. коренеплоди;
- г. кореневища.

588. Назвіть рослину, у якої листки не мають продихів:

- а. елодея;
- б. береза;
- в. латаття біле;
- г. конюшина.

589. З'ясуйте, що орієнтує листову пластинку відносно сонячних променів:

- а. жилки;
- б. продихи;
- в. черешок;
- г. прилистки.

590. Назвіть рослину, для якої характерні трійчасті листки:

- а. липа;
- б. конюшина;
- в. дуб;
- г. пшениця.

591. Вкажіть рослину, для якої характерні пальчастоскладні листки:

- а. гірко каштан звичайний;
- б. конюшина;
- в. жито;
- г. горобина.

592. Вкажіть, як називається листок, зубці на краю якого мають рівні боки:

- а. цілокрай;
- б. зубчастий;
- в. пилчастий;
- г. городчастий.

593. Вкажіть, як називається листок, якщо у зубцях на краю листкової пластинки один бік довший, а інший – коротший:

- а. цілокрай;
- б. зубчастий;
- в. пилчастий;
- г. виїмчастий.

594. З'ясуйте, як називається частина квітки, якою вона прикріплюється до пагона:

- а. чашолисток;
- б. квітколоже;
- в. квітконіжка;
- г. віночок.

595. Вкажіть, як називається верхня розширена частина квітконіжки:

- а. чашолисток;
- б. квітколоже;
- в. оцвітину;
- г. чашечка.

596. Назвіть покрив квітки, що складається з чашечки і віночка:

- а. проста оцвітину;
- б. подвійна оцвітину;
- в. зародковий мішок;
- г. суцвіття.

597. З'ясуйте, які квітки називаються чоловічими:

- а. ті, що мають лише тичинки;
- б. ті, що мають лише маточки;
- в. ті, що мають і маточки і тичинки;
- г. ті, що не мають ні маточок ні тичинок.

598. З'ясуйте, які квітки називаються жіночими:

- а. ті, що мають лише тичинки;
- б. ті, що мають лише маточки;
- в. ті, що мають і маточки і тичинки;
- г. ті, що не мають ні маточок ні тичинок.

599. Назвіть суцвіття, яке не належить до простих:

- а. китиця;
- б. початок;
- в. волоть;
- г. щиток.

600. Вкажіть, як називається чоловіче суцвіття кукурудзи:

- а. колос;
- б. китиця;
- в. волоть;
- г. початок.

601. Віднайдіть плід, характерний для родини Айстрові:

- а. зернівка;
- б. сім'янка;
- в. коробочка;
- г. ягода.

602. З'ясуйте, який плід у гороху посівного:

- а. стручечок;
- б. стручок;
- в. біб;
- г. коробочка.

603. Вкажіть вид рослини, що має суцвіття головка:

- а. люпин;
- б. конюшина;
- в. горох;
- г. лядвенець.

604. Вкажіть представника айстрових, у якого суцвіття складається лише з трубчастих та несправжньоаязичкових квіток:

- а. кульбаба;
- б. череда;
- в. полин;
- г. соняшник.

605. Вкажіть, як називається тіло лишайника:

- а. міцелій;
- б. слань;
- в. стебло;
- г. мікориза.

606. Виберіть лишайник, який вживається в їжу і згадується в Біблії під назвою "манна небесна":

- а. леканора;
- б. ягель;
- в. цетрарія;
- г. паргелія.

607. Зазначте назву грибного компонента лишайника:

- а. грибниця;
- б. мікобіонт;
- в. фікобіонт;
- г. міцелій.

608. Зазначте назву рослинного компонента лишайника:

- а. грибниця;
- б. мікобіонт;
- в. фікобіонт;
- г. міцелій.

609. Відшукайте, де відбувається остаточне перетравлення їжі у гдри:

- а. у кишковій порожнині;
- б. у тонкому кишечнику;
- в. у товстому кишечнику;
- г. у вакуолях травних клітин.

610. Вкажіть, який організм має роговий скелет:

- а. актинія;
- б. гідра;
- в. тигр усурійський;
- г. червоний корал.

611. Вкажіть, який організм належить до поодиноких коралів:

- а. мадрепоровий корал;
- б. актинія;
- в. гідра;
- г. червоний корал.

612. Визначте тварину, для якої характерне чергування двох поколінь (поліпів та медуз) у життєвому циклі:

- а. гідра;
- б. червоний корал;
- в. актинія;
- г. аурелія.

613. Вкажіть, що називається ропаліями:

- а. кільцеподібні коралові острови;
- б. органели з фотосинтезуючими пігментами у деяких найпростіших;
- в. органи розмноження кишковопорожнинних;
- г. чутливі тільця медуз які поєднують статоцисти та світлочутливі вічка.

614. Зазначте, де в організмі людини може паразитувати бичачий ціп'як:

- а. у кишечнику;
- б. у печінці;
- в. у шлунку;
- г. у нирках.

615. Вкажіть проміжного хазяїна бичачого ціп'яка:

- а. собака;
- б. людина;
- в. велика рогата худоба;
- г. риба.

616. Вкажіть паразита, для якого людина виступає в ролі проміжного хазяїна:

- а. печінковий сисун;
- б. бичачий ціп'як;
- в. людська аскарида;
- г. ехінокок.

617. Вкажіть, як називаються м'язисті нечленисті бічні парні вирости сегментів багатощетинкових червів, які зазвичай мають пучечки щетинок і служать для пересування:

- а. метанефридії;
- б. протонефридії;
- в. ганглії;
- г. параподії.

618. Вкажіть, чим представлена видільна система кільчастих червів:

- а. шкірними залозами, від яких відходять бокові канали;
- б. протонефридіями;
- в. метанефридіями;
- г. фагоцитарними клітинами.

619. Виберіть правильну ознаку внутрішньої будови кільчастих червів:

- а. кровоносна система у цих тварин відсутня;
- б. наявна незамкнена кровоносна система;
- в. наявна замкнена кровоносна система;
- г. наявні протонефридії.

620. Назвіть тварину, яка належить до багатощетинкових червів:

- а. медична п'явка;
- б. нереїс;
- в. піскожил;
- г. трубочник.

621. Вкажіть, звідки органи виділення молюсків забирають продукти обміну речовин:

- а. із мантийної порожнини;
- б. із кишечника;
- в. із легень;
- г. із навколосерцевої сумки.

622. З'ясуйте, куди відкриваються сечовидільні та статеві отвори у молюсків:

- а. у мантийну порожнину;
- б. у кишечник;
- в. у легені;
- г. у навколосерцеву сумку.

623. Вкажіть, у кого із наведених молюсків черепашка закручена проти годинникової стрілки:

- а. голого слизуна;
- б. ставковика великого;
- в. фізи;
- г. виноградного слимака.

624. Вкажіть, яке серце характерне для наутілуса:

- а. однокамерне;
- б. двокамерне;
- в. трикамерне;
- г. чотирикамерне.

625. Вкажіть, від чого залежить кількість передсердь у молюсків:

- а. розмірів тіла тварини;
- б. наявності черепашки;
- в. кількості органів дихання;
- г. кількості щупалець.

626. Назвіть органи дихання, які характерні для хордових, що живуть у воді:

- а. зябра;
- б. легені;
- в. трахеї;
- г. легеневі мішки.

627. Вкажіть тип центральної нервової системи хордових:

- а. надглотковий і підглотковий ганглії та черевний нервовий ланцюжок;
- б. нервовий вузол та нервові стовбури;
- в. нервова трубка з порожниною всередині;
- г. навкологлоткове кільце і нервові стовбури.

628. Визначте, чим починається травна система ланцетника:

- а. ротовою присоскою;
- б. передротовою западиною;
- в. ротовою порожниною;
- г. передротовою лійкою.

629. Вкажіть тип живлення, характерний для ланцетника:

- а. відфільтровує дрібні організми;
- б. захоплює щупальцями дрібних безхребетних;
- в. поглинає розчинені у воді органічні речовини через покриви;
- г. живиться, зішкрібаючи водорості та мікроорганізми з субстрату.

630. Вкажіть, куди виводиться вода з глотки ланцетника:

- а. в рот;
- б. у навколишнє середовище;
- в. у навколозяброву порожнину;
- г. в кишечник.

631. Вкажіть тип пластид, що є кінцевим етапом їхнього розвитку:

- а. лейкопласт;
- б. хлоропласт;
- в. хромопласт;
- г. пропластида.

632. З'ясуйте, що називається гранами:

- а. складки внутрішньої мембрани хлоропластів;
- б. складки внутрішньої мембрани мітохондрій;
- в. сплющені вакуолі або мішечки.
- г. група тилакоїдів, що нагадує стовпчик монет.

633. Вкажіть неправильну ознаку чи властивість ядра клітини:

- а. у ньому знаходиться спадкова інформація клітини;
- б. у більшості організмів ядерна оболонка у процесі поділу не зникає;
- в. оболонка ядра пронизана порами;
- г. поверхневий апарат ядра представлений двома мембранами.

634. Назвіть період інтерфази, в якому відбувається ріст клітини та підготовка до синтезу ДНК:

- а. постсинтетичний;
- б. анафаза;
- в. синтетичний;
- г. метафаза.

635. Вкажіть, як називається тимчасове утворення, яке складається з і-РНК і нанизаних на неї рибосом:

- а. нуклеосома;
- б. полісома;
- в. папілома;
- г. лізосома.

636. Вкажіть, яким шляхом утворюються вуглеводи у автотрофних організмів:

- а. перетворення неуглеводних органічних сполук на вуглеводи;
- б. окислення аміаку до вуглеводнів;
- в. відновлення вуглекислого газу до вуглеводнів;
- г. потрапляння з їжею.

637. Вкажіть, які сполуки є попередниками нуклеотидів:

- а. амінокислоти;
- б. жирні кислоти;
- в. стероїди;
- г. фосфоліпіди.

638. Визначте, яке явище є основою біосинтезу нуклеїнових кислот:

- а. репарації;
- б. рецепції;
- в. реплікації;
- г. реімплантації.

639. Визначте, якому відділу майбутнього головного мозку відповідає первинний мозковий пухирець, на якому випинаються очні пухирці:

- а. кінцевому;
- б. середньому;
- в. довгастому;
- г. проміжному.

640. Визначте, який процес є основою прямого розвитку організмів:

- а. цефалізації;
- б. кортиколізації;
- в. ембріонізації;
- г. верифікації.

641. Вкажіть, яка стадія розвитку тварин з непрямим розвитком відсутня за умов їх неповного перетворення:

- а. яйця;
- б. личинки;
- в. лялечки;
- г. імаго.

642. Визначте, що називається життєвим циклом:

- а. період від народження організму до настання статевої зрілості;
- б. період від утворення зиготи до природної смерті організму;
- в. період між однаковими фазами розвитку двох чи більше послідовних поколінь;
- г. період між початком продукції статевих продуктів та їх злиттям з утворенням зиготи.

643. Вкажіть, скільки клітин утворюють у покритонасінних чоловічий гаметофіт:

- а. 2;
- б. 3;
- в. 4;
- г. 5.

644. Визначте, як називається сукупність промислових методів, які застосовуються для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ:

- а. радіобіологія;
- б. біотехнологія;
- в. біоіндикація;
- г. селекція.

645. Назвіть ученого, який у 1969 році вперше здійснив синтез генів поза організмом:

- а. С. Четвериков;
- б. С. Райт;
- в. Р. Фішер;
- г. Г. Хорана.

646. Вкажіть, як називається сукупність клітин чи організмів, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом:

- а. порода;
- б. прищепи;
- в. клон;
- г. гібрид.

647. Вкажіть, прикладом якої взаємодії між особинами в популяціях і між популяціями в угрупованнях є конкуренція, паразитизм, хижацтво:

- а. нейтральної;
- б. взаємовигідної;
- в. сусідської;
- г. антагоністичної.

648. Вкажіть, в чому полягає правило екологічної індивідуальності:

- а. екологічний фактор впливає на організм лише в певних межах;
- б. оптимум та межі витривалості організму стосовно певного фактора залежать від інтенсивності дії інших;
- в. взаємокомпенсація життєво важливих екологічних факторів має певні межі;
- г. не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями.

649. З'ясуйте, підтвердженням якого правила є те, що лишайники оселяються на бідних на органіку субстратах:

- а. правила оптимуму;
- б. правило екологічної індивідуальності;
- в. правило відносно незалежної адаптації;
- г. правило песимуму.

650. Вкажіть, як називається метод штучного розведення цінних у господарстві мешканців водойм:

- а. аквакультура;
- б. акліматизація;
- в. гідропоніка;
- г. селекція.

651. Зазначте, які види називаються зникаючими:

- а. ті, які в недалекому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів для їх збереження;
- б. ті, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірно, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на стан їхніх популяцій;
- в. ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча внаслідок їхньої незначної чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути за несприятливих змін середовища існування;
- г. ті, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає стурбованості.

652. Вкажіть, в чому полягає суть парникового ефекту:

- а. у збільшенні вологості атмосферного повітря;
- б. у збільшенні кількості кисню в атмосфері;
- в. у підвищенні температури біля поверхні Землі;
- г. у зниженні температури біля поверхні Землі.

653. Які ферменти беруть участь у процесах біосинтезу РНК?

- а. РНК-полімераза
- б. ДНК -полімераза
- в. Лужна фосфатаза
- г. Тромбокіназа

654. Похідним ліпідів є:

- а. Жовчні кислоти
- б. Полісахариди
- в. Катехоламіни
- г. Алкалоїди

655. Термін „біологія” запропонував вчений

- а. Ернст Геккель
- б. Арістотель
- в. Грегор-Йоганн Мендель
- г. Жан-Батіст Ламарк

656. Біологія індивідуального розвитку вивчає

- а. Сперматогенез
- б. Оогенез
- в. Філогенез
- г. Онтогенез

657. Закономірності спадковості і мінливості організмів вивчає

- а. Систематика
- б. Біохімія
- в. Філогенія
- г. Генетика

658. Шляхи історичного розвитку певних систематичних груп живих організмів вивчає

- а. Систематика
- б. Біохімія
- в. Філогенія
- г. Генетика

659. Неклітинні форми життя вивчає

- а. Вірусологія
- б. Біохімія
- в. Біоніка
- г. Бактеріологія

660. Прокаріотичні організми вивчає

- а. Вірусологія
- б. Бактеріологія
- в. Мікологія
- г. Ліхенологія

661. Наука, яка досліджує викопні рештки вимерлих організмів

- а. Іхтіологія
- б. Палеонтологія
- в. Філогенія
- г. Ліхенологія

662. Закономірності поширення живих організмів на Землі досліджує

- а. Систематика
- б. Екологія
- в. Біогеографія
- г. Біометрія

663. Систематика – наука, яка

- а. Вивчає шляхи історичного розвитку систематичних груп живих організмів;
- б. Досліджує закономірності історичного розвитку живих організмів;
- в. Досліджує закономірності поширення живих організмів на Землі;
- г. Описує, упорядковує, класифікує існуючі і вимерлі види живих організмів.

664. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого описують і аналізують певні біологічні об'єкти чи явища

- а. Порівняльно-описовий
- б. Експериментальний
- в. Моніторинг
- г. Статистичний

665. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого штучно створюють ситуацію, що допомагає вивчити певні властивості живих організмів

- а. Порівняльно-описовий
- б. Експериментальний
- в. Моделювання
- г. Статистичний

666. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого проводять постійні (довготривалі) стеження за перебігом певних біологічних процесів, за станом певних біологічних об'єктів

- а. Порівняльно-описовий
- б. Моделювання
- в. Моніторинг
- г. Статистичний

667. Метод біологічних досліджень, за допомогою якого проводять математичну обробку матеріалу, одержаного в результаті спостережень за біологічними об'єктами, явищами, процесами

- а. Порівняльно-описовий
- б. Моделювання
- в. Моніторинг
- г. Статистичний

668. Живлення – це процес

- а. Окислення органічних речовин із вивільненням енергії
- б. Надходження до організму поживних речовин та їх засвоєння

- в. Надходження до організму води та її засвоєння
- г. Збільшення розмірів тіла

669. Дихання – це процес

- а. Окислення органічних речовин із вивільненням енергії
- б. Видалення з організму продуктів життєдіяльності
- в. Надходження до організму води та її засвоєння
- г. Випаровування води поверхнею тіла

670. Виділення – це процес

- а. Окислення органічних речовин із вивільненням енергії
- б. Видалення з організму продуктів життєдіяльності
- в. Виведення з організму неперетравлених решток їжі
- г. Випаровування води поверхнею тіла

671. Автотрофи – організми, які

- а. Для процесів окислення використовують молекулярний кисень
- б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
- в. Живляться готовими органічними речовинами
- г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних

672. Гетеротрофи – організми, які

- а. Не здатні підтримувати сталість хімічного складу, будови, властивостей у змінних умовах
- б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
- в. Живляться готовими органічними речовинами
- г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних

673. Аероби – організми, які

- а. Для процесів окислення використовують молекулярний кисень
- б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
- в. Живляться готовими органічними речовинами
- г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних

674. Анаероби – організми, які

- а. Для процесів окислення використовують молекулярний кисень
- б. Для процесів окислення не використовують молекулярний кисень
- в. Живляться готовими органічними речовинами
- г. Для живлення самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних

675. Сапрофіти – організми, що живляться

- а. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі хемосинтезу
- б. За рахунок інших організмів, з якими взаємовигідно співживуть
- в. Органічними речовинами живих організмів, завдаючи шкоди останнім
- г. Органічними речовинами відмерлих організмів, всмоктуючи їх поверхнею тіла

676. Паразити – організми, що живляться

- а. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі фотосинтезу
- б. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі хемосинтезу

- в. За рахунок інших організмів, з якими взаємовигідно співживуть
- г. Органічними речовинами живих організмів, завдаючи шкоди останнім

677. Симбіонти – організми, що живляться

- а. Органічними речовинами, які самостійно утворюють в процесі фотосинтезу
- б. За рахунок інших організмів, з якими взаємовигідно співживуть
- в. Органічними речовинами живих організмів, завдаючи шкоди останнім
- г. Органічними речовинами відмерлих організмів, всмоктуючи їх поверхню тіла

678. Здатність організму відповідати на зміни навколишнього середовища обмін речовин;

- а. Розвиток
- б. Подразливість
- в. Саморегуляція
- г. Пристосованість

679. Здатність організму підтримувати сталість хімічного складу, будови, властивостей у змінних умовах середовища

- а. Розвиток
- б. Подразливість
- в. Саморегуляція
- г. Пристосованість

680. Відповідність будови та життєдіяльності організму конкретним умовам середовища

- а. Розвиток
- б. Подразливість
- в. Саморегуляція
- г. Пристосованість

681. Збільшення кількості організмів

- а. Розвиток
- б. Розмноження
- в. Саморегуляція
- г. Пристосованість

682. Подразливість організмів виявляється у формі

- а. Руху
- б. Розвитку
- в. Розмноження
- г. Обміну речовин

683. Ріст організмів розрізняють

- а. Обмежений і необмежений
- б. Аеробний і анаеробний
- в. Видовжений і вкорочений
- г. Автотрофний і гетеротрофний

684. Дихання організмів розрізняють

- а. Внутріклітинне та внутріпорожнинне
- б. Пряме й непряме

- в. Автотрофне і гетеротрофне
- г. Аеробне й анаеробне

685. Індивідуальний розвиток організму

- а. Партогенез
- б. Ембріогенез
- в. Філогенез
- г. Онтогенез

686. Розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини

- а. Гаметогенез
- б. Партогенез
- в. Філогенез
- г. Онтогенез

687. До надцарства Прокаріоти належать

- а. Віруси і бактерії
- б. Бактерії та ціанобактерії
- в. Гриби й лишайники
- г. Синьо-зелені та зелені водорості

688. Зв'язаною (структурованою) називають воду, яка

- а. Міститься у протопластах клітин
- б. Міститься в міжклітинному середовищі
- в. Формує водяну оболонку навколо деяких сполук (наприклад білків) і перешкоджає їхній взаємодії
- г. Утворюється в результаті реакції конденсації або бере участь у гідролізі складних органічних сполук

689. Гідрофільними називаються речовини, які

- а. Мають неполярні молекули і нерозчинні у воді
- б. Мають полярні молекули і нерозчинні у воді
- в. Мають неполярні молекули і розчиняються у воді
- г. Мають полярні молекули і розчиняються у воді

690. Завдяки великій теплоємності вода

- а. Бере участь у біохімічних реакціях
- б. Забезпечує рівномірний розподіл теплоти в організмі
- в. Запобігає різким змінам температури у живих системах та навколишньому середовищі
- г. Здатна підніматись на великі відстані по судинах ксилеми

691. Завдяки високій теплопровідності вода

- а. Є універсальним розчинником і середовищем для біохімічних реакцій
- б. Забезпечує рівномірний розподіл теплоти в організмі
- в. Запобігає різким змінам температури у живих системах та навколишньому середовищі
- г. Здатна підніматись на великі відстані по судинах ксилеми

692. Завдяки великій теплоті випаровування вода

- а. Бере участь у біохімічних реакціях
 - б. Забезпечує рівномірний розподіл теплоти в організмі
 - в. Забезпечує процеси терморегуляції (транспірацію і потовиділення)
 - г. Здатна підніматись на великі відстані по судинах ксилеми
693. Кисле середовище у шлунку хребетних тварин і людини створює сполука
- а. H_3PO_4
 - б. HNO_3
 - в. CH_3COOH
 - г. HCl
694. Появу різниці потенціалів на зовнішній і внутрішній поверхні плазматичних мембран зумовлює
- а. Різна концентрація іонів калію і натрію зовні і всередині клітини
 - б. Накопичення електронів на зовнішній поверхні мембрани
 - в. Накопичення протонів гідрогену на внутрішній поверхні мембрани
 - г. Різниця показника рН зовні і всередині клітини
695. Прості цукри
- а. Моносахариди
 - б. Дисахариди
 - в. Полісахариди
 - г. Глікозиди
696. Крохмаль у клітинах відкладається у вигляді
- а. Зерен
 - б. Краплин
 - в. Кристалів
 - г. Пухирців
697. Целюлоза є основним структурним компонентом
- а. Міжклітинної речовини кісткової тканини
 - б. Клітинних стінок бактерій
 - в. Клітинних стінок рослин
 - г. Клітинних стінок грибів
698. Хітин є основним структурним компонентом
- а. Міжклітинної речовини хрящової тканини
 - б. Клітинних стінок бактерій
 - в. Клітинних стінок рослин
 - г. Клітинних стінок грибів
699. Замінні амінокислоти
- а. При синтезі білків можуть замінюватись фосфорною кислотою
 - б. Синтезуються в організмі тварин та людини
 - в. Не синтезуються в організмі тварин та людини (потрапляють з продуктами харчування)
 - г. Не зустрічаються у складі білків
700. Незамінні амінокислоти

- а. При синтезі білків можуть замінюватись фосфорною кислотою
- б. Синтезуються в організмі тварин та людини
- в. Не синтезуються в організмі тварин та людини (потрапляють з продуктами харчування)
- г. Не зустрічаються у складі білків

701. Первинна структура білкової молекули визначається

- а. Особливостями будови молекул окремих амінокислот
- б. Якісним, кількісним складом амінокислот, їхньою послідовністю у поліпептидному ланцюгу
- в. Формуванням просторової конфігурації – глобули
- г. Об'єднанням окремих поліпептидних ланцюгів (глобул) в одну функціональну одиницю

702. Вторинна структура білкової молекули характеризується

- а. Якісним, кількісним складом амінокислот, їхньою послідовністю у поліпептидному ланцюгу
- б. Утворенням просторової конфігурації – α -спіралі (β -складчастого шару)
- в. Формуванням просторової конфігурації – глобули
- г. Об'єднанням окремих поліпептидних ланцюгів (глобул) в одну функціональну одиницю

703. Третинна структура білкової молекули характеризується

- а. Якісним, кількісним складом амінокислот, їхньою послідовністю у поліпептидному ланцюгу
- б. Утворенням просторової конфігурації – α -спіралі (β -складчастого шару)
- в. Формуванням просторової конфігурації – глобули
- г. об'єднанням окремих поліпептидних ланцюгів (глобул) в одну Функціональну одиницю

704. Четвертинна структура білкової молекули характеризується

- а. Якісним, кількісним складом амінокислот, їхньою послідовністю у поліпептидному ланцюгу
- б. Утворенням просторової конфігурації – α -спіралі (β -складчастого шару)
- в. Формуванням просторової конфігурації – глобули
- г. Об'єднанням окремих поліпептидних ланцюгів (глобул) в одну функціональну одиницю

705. Первинна структура білкової молекули підтримується

- а. Пептидними зв'язками
- б. Водневими зв'язками
- в. Пептидними, глікозидними, ефірними зв'язками
- г. Гідрофобними взаємодіями, іонними, водневими, дисульфідними зв'язками

706. Вторинна структура білкової молекули підтримується

- а. Пептидними зв'язками
- б. Водневими зв'язками
- в. Гідрофобними, електростатичними взаємодіями, іонними, водневими зв'язками
- г. Гідрофобними взаємодіями, іонними, водневими, дисульфідними зв'язками

707. Третинна структура білкової молекули підтримується

- а. Водневими зв'язками
- б. Пептидними, глікозидними, ефірними зв'язками
- в. Гідрофобними, електростатичними взаємодіями, іонними, водневими зв'язками
- г. Гідрофобними взаємодіями, іонними, водневими, дисульфідними зв'язками

708. Четвертинна структура білкової молекули підтримується

- а. Водневими зв'язками
- б. Пептидними, глікозидними, ефірними зв'язками
- в. Гідрофобними, електростатичними взаємодіями, іонними, водневими зв'язками
- г. Гідрофобними взаємодіями, іонними, водневими, дисульфідними зв'язками

709. Структура білкової молекули, яка визначається якісним, кількісним складом амінокислот, їхньою послідовністю у поліпептидному ланцюгу

- а. Первинна
- б. Третинна
- в. Четвертинна
- г. Проміжна

710. Структура білкової молекули, яка характеризується формуванням просторової конфігурації – α -спіралі (β -складчастого шару)

- а. Первинна
- б. Вторинна
- в. Третинна
- г. Проміжна

711. Структура білкової молекули, яка характеризується формуванням просторової конфігурації – глобули

- а. Вторинна
- б. Третинна
- в. Четвертинна
- г. Проміжна

712. Структура білкової молекули, яка характеризується об'єднанням окремих поліпептидних ланцюгів (глобул) в одну функціональну одиницю

- а. Первинна
- б. Третинна
- в. Четвертинна
- г. Проміжна

713. Структура білкової молекули, яка підтримується пептидними зв'язками

- а. Первинна
- б. Вторинна
- в. Третинна
- г. Проміжна

714. Структура білкової молекули, яка підтримується тільки водневими зв'язками

- а. Первинна
- б. Вторинна
- в. Третинна
- г. Проміжна

715. Структура білкової молекули, яка підтримується гідрофобними взаємодіями, іонними, водневими, дисульфідними зв'язками

- а. Первинна
- б. Вторинна

- в. Третинна
- г. Множинна

716. Структура білкової молекули, яка підтримується гідрофобними, електростатичними взаємодіями, іонними, водневими зв'язками

- а. Проміжна
- б. Первинна
- в. Вторинна
- г. Четвертинна

717. Четвертинна структура характерна для білка

- а. Колагену
- б. Еластину
- в. Міоглобіну
- г. Гемоглобіну

718. Кількість поліпептидних ланцюгів (глобул), які об'єднані у четвертинну структуру молекули гемоглобіну

- а. 4
- б. 6
- в. 8
- г. 10

719. Процес порушення природної структури білка (руйнування четвертинної, третинної, вторинної структури при збереженні первинної)

- а. Денатурація
- б. Ренатурація
- в. Реплікація
- г. Кон'югація

720. Процес відновлення природної структури білка за умови припинення дії негативних чинників на перших стадіях денатурації

- а. Деструкція
- б. Ренатурація
- в. Реплікація
- г. Кон'югація

721. Необоротний процес руйнування первинної структури білка

- а. Деструкція
- б. Денатурація
- в. Реплікація
- г. Кон'югація

722. Прості білки (протеїни)

- а. Мають тільки фібрилярну структуру
- б. Мають тільки глобулярну структуру
- в. Містять небілкові компоненти
- г. Складаються виключно із залишків амінокислот

723. До складу міжклітинної речовини кісткової тканини входить білок

- а. Міозин
- б. Осейн
- в. Тубулін
- г. Тромбін

724. До складу хрящів і сухожиль входить білок

- а. Кератин
- б. Колаген
- в. Актин
- г. Трипсин

725. Захисну функцію виконують білки

- а. Колаген, еластин
- б. Тромбін, фібрин
- в. Міозин, актин
- г. Гемоглобін, гемоціанін

726. Транспортну функцію виконують білки

- а. Колаген, еластин
- б. Міозин, актин
- в. Альбумін, казеїн
- г. Гемоглобін, гемоціанін

727. Структурну функцію виконують білки

- а. Колаген, еластин
- б. Міозин, актин
- в. Альбумін, казеїн
- г. Гемоглобін, гемоціанін

728. Скоротливу функцію виконують білки

- а. Колаген, еластин
- б. Міозин, актин
- в. Альбумін, казеїн
- г. Гемоглобін, гемоціанін

729. Запасуючу (поживну) функцію виконують білки

- а. Тромбін, фібрин
- б. Міозин, актин
- в. Альбумін, казеїн
- г. Гемоглобін, гемоціанін

730. Регуляторну функцію виконують білки

- а. Тромбін, фібрин
- б. Інсулін, глюкагон
- в. Альбумін, казеїн
- г. Гемоглобін, гемоціанін

731. Каталітичну функцію виконують білки

- а. Гемоглобін, гемоціанін
- б. Пепсин, ліпаза
- в. Альбумін, казеїн
- г. Осейн, кератин

732. Ферменти – речовини, які

- а. Переважно з'єднані з радикалами, що містять азот, виробляються рослинами, отруйні для тварин і людини
- б. Мають різну хімічну природу, виробляються рослинами, регулюють і координують ріст та розвиток рослин
- в. Мають білкову природу, прискорюють проходження біохімічних реакцій
- г. Мають низькомолекулярну органічну будову, потрібні для життєдіяльності організмів

733. Коли відбулося становлення надкласу Риби?

- а. на початку силурійського періоду
- б. на початку – в середині силурійського періоду
- в. у девонському періоді
- г. у тріасовому періоді

734. Скільки часу тривав розвиток риб?

- а. 400-450 млн р.
- б. 400 млн р.
- в. 300 млн р.
- г. 200 млн р.

735. Від яких організмів виникли риби?

- а. панцирних
- б. кладоселахій
- в. пластинчастозябрових
- г. птераспідоморф

736. У яких водоймах спочатку виникли риби?

- а. прісних
- б. морських
- в. одночасно у морях і річках
- г. частково морських

737. Коли вимерли панцирні риби?

- а. на початку силурійського періоду
- б. до кінця девонського – початку кам'яновугільного періоду
- в. у тріасовому періоді
- г. у девонському періоді

738. Який тип хвостового плавця у акулподібних риб?

- а. дифіцеркальний
- б. гетероцеркальний
- в. гомоцеркальний
- г. унісеріальний

739. Які організми були нащадками брадіодонтів?
- а. кладоселахії
 - б. химери
 - в. панцирні риби
 - г. круглороті
740. Який тип луски мали пластинчастозяброві?
- а. плакоїдну
 - б. ктеноїдну
 - в. циклоїдну
 - г. ганоїдну
741. Від яких організмів відособились у кінці силурійського періоду кісткові риби?
- а. безщелепних
 - б. безчерепних
 - в. покривників
 - г. примітивних щелепнозябрових
742. На які надряди розділились лопатепері на початку і в середині девону?
- а. кистипері і дводишні
 - б. променепері і дводишні
 - в. променепері і кистипері
 - г. палеоніски і дводишні
743. Які середовища існування земноводних відомі?
- а. водне
 - б. водне і наземне
 - в. ґрунтове
 - г. водне
744. Яке забарвлення тіла у земноводних?
- а. криптичне, попереджуюче
 - б. криптичне
 - в. попереджуюче
 - г. апосематичне
745. Чим зумовлений широкий плоский череп і великий рот у земноводних?
- а. хрящовим скелетом
 - б. кістковим скелетом
 - в. новим механізмом дихання
 - г. водно-наземним способом життя
746. Які нові відділи виникли у скелеті хребта земноводних?
- а. шийний і грудний
 - б. грудний і тазовий
 - в. поперековий і тазовий
 - г. шийний і крижовий
747. Який тип хребців у вищих хвостатих земноводних?

- а. амфіцельні
- б. процельні
- в. опістоцельні
- г. редуковані

748. Хто із земноводних мають справжні ребра?

- а. безхвості
- б. безногі
- в. хвостаті
- г. ропухи

749. Чим представлений орган рівноваги у земноводних?

- а. мішечком і 3 напівколовими каналами
- б. мішечком і 2 напівколовими каналами
- в. мішечком і 1 напівколовим каналом
- г. 3 напівколовими каналами

750. Як називається слухова кісточка у земноводних?

- а. стремінце
- б. молоточок
- в. ковадельце
- г. уростиль

751. Куди потрапляє чиста артеріальна кров у земноводних?

- а. до головного мозку
- б. до серця
- в. до всіх органів тіла
- г. до головного мозку і органів чуття

752. Ким виступають земноводні у ланцюгах живлення?

- а. консументами 2-го порядку
- б. продуцентами
- в. редуцентами
- г. консументами 1-го порядку

753. До якого ряду належить тигрова амбістома?

- а. безногі
- б. хвостаті
- в. безхвості
- г. стрибаючі

754. Хто зустрічається у підземних водоймах Балкан?

- а. європейський протей
- б. тигрова амбістома
- в. тритон альпійський
- г. амфіума

755. Як називається личинка амбістоми?

- а. амфіума
- б. протей
- в. аксолотль
- г. сирена

756. До якого підкласу належить європейський протей?

- а. хвостаті
- б. стрибаючі
- в. дугохребцеві
- г. тонкохребцеві

757. Яку тварину занесено до Червоної книги України?

- а. тритон гребінчастий
- б. тритон звичайний
- в. саламандра плямиста
- г. сирена

758. До якого ряду належить червоночеревна кумка?

- а. безногі
- б. безхвості
- в. хвостаті
- г. ропухи

759. Які земноводні пристосовані до життя на деревах?

- а. квакша звичайна
- б. ропуха
- в. земляна жаба
- г. сирена

760. Який спосіб життя у безногих земноводних?

- а. риючий
- б. водний
- в. наземний
- г. підземний

761. Хто належить до групи зелених жаб?

- а. жаба трав'яна
- б. жаба гостроморда
- в. жаба прудка
- г. жаба ставкова

762. Яка найбільша жаба Африки?

- а. голіаф
- б. повитуха
- в. земляна
- г. сурінамська

763. Кого вважають предками земноводних?

- а. морські кистипері риби
- б. репідистії
- в. іхтіостегіди
- г. палеоніски

764. У якому періоді виникли земноводні?

- а. девонському
- б. кам'яновугільному
- в. силурійському
- г. пермському

765. Який основний фактор забезпечив вихід земноводних на суходіл?

- а. більше кисню
- б. багата кормова база
- в. відсутність ворогів
- г. багата кормова база і відсутність конкурентів

766. Які організми є перехідною формою між рибами і справжніми земноводними ?

- а. іхтіостегіди
- б. стегоцефали
- в. лабіринтоданти
- г. репідистії

767. Яке походження мають земноводні?

- а. монофілетичне
- б. поліфілетичне
- в. гібридне
- г. монополіфілетичне

768. Які організми відособились від іхтіостегід?

- а. стегоцефали
- б. репідистії
- в. дводишні
- г. кистипері

769. У якому періоді зникли стегоцефали?

- а. девонському
- б. юрському
- в. силурійському
- г. кам'яновугільному

770. Від яких організмів виникли рептилії?

- а. лабіринтодонтів
- б. стрибаючих
- в. безхвостих
- г. безногих

771. Від яких організмів відособились сучасні ряди хвостатих і безногих?

- а. іхтіостегід
- б. репідистій
- в. лабіринтодонтів
- г. мікрозаурій

772. Які організмів відособились від примітивних рахітомових у нижньому тріасі?

- а. примітивні безхвості
- б. хвостаті
- в. сучасні безхвості
- г. безногі

773. Вкажіть характерні для плазунів ознаки:

- а. хрящовий скелет, зяброві мішки
- б. внутрішнє запліднення, двокамерне серце
- в. розвиток зародка на суші, трикамерне серце
- г. наявність плавців, зябер

774. Сезонне явище не характерне для плазунів:

- а. період розмноження
- б. сезонна міграція
- в. нерест
- г. сплячка

775. Особливості шкіри плазунів:

- а. шкіра вкрита роговими лусками
- б. шкіра рептилій суха, вкрита роговими лусками, щитками, немає залоз
- в. шкіра має тільки залози для змащування жиру, є щитки
- г. шкіра завжди суха через відсутність рогових залоз

776. Представники ряду Лускатих:

- а. болотяна черепаха
- б. китайський алігатор
- в. гавіал
- г. гадюка степова

777. Рептилія здатна до автотомії:

- а. ящірка прудка
- б. болотяна черепаха
- в. китайський алігатор
- г. гавіал

778. Ознаки не характерні для нервової системи плазунів:

- а. півкулі головного мозку вкриті корою
- б. мозочок розвинений краще, ніж у земноводних
- в. головний мозок має чотири відділи
- г. передній мозок містить нюховий центр

779. З чого складається контурне перо птаха?

- а. зі стрижня, пуху
- б. зі стрижня, пуху, опахала
- в. з очина, стрижня, пуху
- г. з очина, стрижня, опахала, з борідками 1 та 2-го порядку

780. Виводкові птахи – це:

- а. гуси
- б. голуби
- в. лелеки
- г. ластівки

781. Що відходить від серця ссавців?

- а. права дуга аорти
- б. ліва дуга аорти
- в. порожниста вена
- г. легенева вена

782. У якого класу хребетних миготлива перетинка редукована?

- а. земноводні
- б. плазуни
- в. птахи
- г. ссавці

783. Термін еволюція запропонував?

- а. К. Лінней
- б. Ж.Б. Ламарк
- в. Ш. Боне
- г. Ч. Дарвін

784. За Дарвіном в основі формування порід і сортів є?

- а. спадкова мінливість
- б. природний добір
- в. штучний добір
- г. боротьба за існування

785. Елементарною одиницею еволюції є:

- а. особини
- б. популяція
- в. вид
- г. клас

786. Будь-яке пристосування організму має відносний характер, тому що:

- а. життя закінчується смертю
- б. доцільне в певних умовах довкілля
- в. відбувається боротьба за існування
- г. воно не веде до утворення нового виду

787. Різноманітність сортів рослин і порід свійських тварин зумовлена:

- а. штучними умовами існування
- б. штучним добором
- в. умовами довкілля
- г. модифікаційною мінливістю

788. Комбінативна мінливість детермінує:

- а. зміна генотипу і фенотипу
- б. зміна фенотипу без зміни генотипу
- в. виникнення нових комбінацій генів у генотипі
- г. зміна фенотипу в межах норми реакції

789. Особливості стабілізуючого добору:

- а. спрямований на збереження середнього значення ознаки в популяції та елімінацію особин з крайніми її значеннями
- б. зберігає корисну ознаку й елімінує особини з проміжним значенням ознаки
- в. змінює пристосованість популяції до певних умов
- г. стабільно зміщує модальне значення ознаки в певному напрямі

790. Особливості розвиваючого добору:

- а. стабільно зміщує модальне значення ознаки в певному напрямку
- б. зберігає корисну ознаку й елімінує особини з проміжним значенням ознаки
- в. змінює пристосованість популяції до певних умов
- г. спрямований на збереження середнього значення ознаки в популяції та елімінацію особин з крайніми її значеннями

791. Дрейф генів – це:

- а. зміна кількості генів у хромосомі
- б. зміна послідовності нуклеотидів у ДНК
- в. спадкування лише рецесивних алелей
- г. випадкова і неспрямована зміна частот алелей у популяції

792. Джерелом спадкової мінливості згідно синтетичної теорії еволюції є:

- а. природний добір
- б. дрейф генів
- в. мутації
- г. ізоляція

793. Органи, що мають спільне походження, але виконують різні функції:

- а. рудименти
- б. атавізми
- в. аналогічні
- г. гомологічні

794. Органи, що мають різне походження, але виконують подібні функції:

- а. рудименти
- б. атавізми
- в. аналогічні
- г. гомологічні

795. Недорозвинені чи спрощені за будовою органи:

- а. рудименти
- б. атавізми
- в. аналогічні
- г. гомологічні

796. Розходження ознак у нащадків, як наслідок адаптації предкового виду до різних умов довкілля:

- а. дивергенція
- б. конвергенція
- в. онтогенез
- г. філогенез

797. Види природного добору:

- а. стабілізуючий, рушійний, розриваючий
- б. розриваючий, дизруптивний, свідомий
- в. стабілізуючий, штучний, розриваючий
- г. стабілізуючий, свідомий, рушійний

798. Шляхи досягнення біологічного прогресу:

- а. природний добір, боротьба за існування, спадкова мінливість
- б. хвилі життя, дрейф генів, ізоляція
- в. ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація
- г. ароморфоз, ідіоадаптація, ізоляція

799. Приклад ідіоадаптації:

- а. зникнення органів чуття
- б. утворення квітки у покритонасінних
- в. розмноження рослин насінням
- г. різноманітність будови квіток покритонасінних

800. Розвиток додаткових пар молочних залоз у людини:

- а. рудименти
- б. атавізми
- в. аналогічні органи
- г. гомологічні органи

801. У людини апендикс і куприкові хребці належать до:

- а. рудиментів
- б. атавізмів
- в. гомологічних органів
- г. анахронізмів

802. Виникнення надвидових таксонів:

- а. мікроеволюція
- б. макроеволюція
- в. біологічний прогрес
- г. біологічний регрес

803. Розходження ознак у філогенетично споріднених організмів:

- а. дивергенція
- б. конвергенція
- в. дегенерація
- г. ідіоадаптація

804. Фактор, що не впливає на видоутворення:

- а. модифікації
- б. мутації
- в. ізоляція
- г. дрейф генів

805. Незалежний розвиток філогенетично споріднених організмів у процесі еволюції:

- а. ідіоадаптації
- б. ізоляція
- в. паралелізм
- г. хвилі життя

806. Популяційні хвилі сприяють:

- а. сповільненню еволюційного процесу
- б. зміні частот генів і генотипів у популяціях
- в. послабленню природного добору
- г. стабілізації частот генів і генотипів у популяціях

807. Фенотипова мінливість веде до:

- а. виникнення нових комбінацій генів
- б. реорганізації окремих генів
- в. змін генотипу і фенотипу
- г. змін фенотипу і не супроводжується змінами генотипу

808. В основі штучного добору лежить мінливість:

- а. спадкова, мутаційна, генотипна
- б. модифікаційна
- в. невизначена
- г. стихійна

809. Приклад ароморфозу:

- а. комахоїдність
- б. типи коренів у рослин
- в. форма дзьоба у птахів
- г. внутрішнє запліднення

810. У результаті конвергенції виникли:

- а. різні форми дзьоба у галапагоських в'юрків
- б. біле оперення в тундрової куріпки і зайця біляка
- в. товстий шар підшкірного жиру й ласти в морських котиків, моржів і тюленів
- г. різні способи запилення у покритонасінних

811. Біологічний прогрес характеризується:

- а. розширенням ареалу, збільшенням кількості особин виду
- б. зменшенням кількості особин виду
- в. звуженням ареалу, зменшенням кількості особин виду
- г. утворення нових популяцій і підвидів

812. Головні напрями еволюції:

- а. дегенерація
- б. ідіоадаптація
- в. біологічний прогрес і регрес
- г. ароморфоз і адаптація

813. Із просторовою ізоляцією окремих популяцій пов'язане з видоутворенням:

- а. алопатичне
- б. симпатричне
- в. філетичне
- г. генетичне

814. Ароморфози – це зміни, які:

- а. ведуть до вузької спеціалізації
- б. зумовлені спрощенням організації
- в. підвищують морфофізіологічну організацію
- г. ведуть до перерозвитку

815. Ідіоадаптація – це:

- а. морфологічний прогрес, що веде до змін, які забезпечують загальне вдосконалення організмів
- б. зміна організмів, що сприяє пристосуванню до певних умов довкілля
- в. морфологічний регрес
- г. відбір відхилень від усталеної норми ознак

816. Шляхом мікроеволюції виникають:

- а. види
- б. роди
- в. родини
- г. класи

817. Видоутворення – це:

- а. наслідок модифікації генів
- б. наслідок рекомбінації генів
- в. мікроеволюційний процес
- г. макроеволюційний процес

818. Катагенез – шлях еволюції організмів, який супроводжується:

- а. спрощенням будови
- б. пристосуванням до конкретних умов
- в. підвищенням загального рівня організації
- г. виникненням нових органів

819. Арогенез – шлях еволюції організмів, який супроводжується:

- а. підвищенням загального рівня організації
- б. виникненням нових органів
- в. пристосуванням до конкретних умов
- г. максимальним спрощенням їх будови

820. Конвергенція – це:

- а. розвиток подібних ознак у близькоспоріднених груп
- б. збіжність ознак у неспоріднених груп
- в. утворення ізольованої групи в середині популяції
- г. збіжність ознак у споріднених груп

821. Причиною еволюції культурних форм за Дарвіном є:

- а. невизначені спадкові зміни
- б. штучний добір
- в. раптові поодинокі відхилення
- г. взаємна конкуренція

822. К. Лінней, Ж. Кюве належать до:

- а. креаціоністів
- б. еволюціоністів
- в. неоламаркістів
- г. антидарвіністів

823. Форми мінливості за Ч. Дарвіном:

- а. визначена і невизначена
- б. модифікаційна й мутаційна
- в. корелятивна й фенотипна
- г. спонтанна й соматична

824. Природний добір – це:

- а. складні взаємовідносини в середині виду
- б. напрямлений характер пристосування
- в. єдиний елементарний фактор еволюції
- г. виживання найбільш пристосованих організмів до певних умов

825. Позитивним у теорії Ж. Ламарка є:

- а. висвітлення проблеми рушійних сил еволюції
- б. ролі успадкування корисних ознак в еволюції
- в. з'ясування спорідненості між видами
- г. вроджена здатність організмів пристосовуватись до змін умов довкілля

826. Ж.Ламарк під терміном "градація" розумів:

- а. еволюційний розвиток без підвищення рівня організації
- б. ускладнення організації організмів
- в. регресивний розвиток організмів
- г. конвергенція

827. Гіпотезу катастроф розробив:

- а. Ч. Дарвін
- б. Ж. Ламарк
- в. Ж. К'юве
- г. Е. Геккель

828. Вчення про стабілізуючий і рушійний добір створив:

- а. І. Шмальгаузен
- б. О. Сєверцов
- в. С. Четвериков
- г. Н. Дубінін

829. Філогенез – це:

- а. індивідуальний розвиток організмів
- б. історичний розвиток організмів
- в. ембріональний розвиток організмів
- г. постембріональний розвиток організмів

830. Існування природного добору довів:

- а. К. Лінней
- б. Ж. Ламарк
- в. Ч. Дарвін
- г. В. Вернадський

831. Виберіть аналогічні органи:

- а. вусики гороху – колючки кактуса
- б. вуса суніці – кореневища пирію
- в. цибулина тюльпану – цибулина лілії
- г. бульби картоплі – коренебульби жоржини

832. Рудиментарні органи людини:

- а. м'язи вух
- б. хвостовий придаток
- в. кілька пар сосків
- г. шість пальців на руках

833. Закон про те, що організми з широким діапазоном толерантності щодо всіх екологічних факторів найбільш поширені належить:

- а. Пригожин 1876
- б. Е. Геккель 1866
- в. М. Реймерс 1907
- г. Ю. Одум 1907

834. Основоположник вчення про бісферу:

- а. М. Голубець
- б. Ю. Шеляг-Сосонко
- в. Б. Гаврилишин
- г. В. Вернадський

835. Розділ екології, який вивчає вплив факторів неживої природи на організми називається:

- а. біоценологія
- б. біогеоценологія
- в. демекологія
- г. аутекологія

836. Яка екологічна мережа має також назву "Смарагдова екологічна мережа"?

- а. Панєвропейська екологічна мережа
- б. Еконет
- в. Emerald
- г. Natura 2000

837. Яка документ був прийнятий на Конференції ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро?

- а. Документ щодо охорони басейнових екосистем річки Дунай
- б. програму дій на 21 століття "Agenda 21"
- в. програма ООН щодо навколишнього середовища
- г. програма щодо запобігання нелегальною торгівлею твариин

838. До якого розділу екології можна віднести вчення про рослинні угруповання?

- а. аутекології
- б. демекології
- в. синекології
- г. Біосферології

839. Які з форм охорони природи відносяться до локального рівня?

- а. заповідники
- б. урочища
- в. заказники
- г. пам'ятки природи

840. Що не є причиною кліматичних змін?

- а. збільшення викидів CO₂ в атмосферу
- б. використання викопного палива
- в. танення льодовиків
- г. поширення генетично модифікованих продуктів

841. Що відбулося в червні 1992 року?

- а. засновано Римський клуб
- б. проведено Стокгольмську конференцію
- в. прийнята декларація "Прав тварин"
- г. проведено конференцію "Сталого розвитку"

842. Який принцип не характерний для систем, які вивчає екологія?

- а. емерджентність
- б. ієрархічність
- в. відкритість
- г. закритість

843. В якому році і ким був запропонований термін "популяція":

- а. К. Шрьотер 1902
- б. В. Йогансен 1903
- в. М. Реймерс 1907
- г. Ю. Одум 1907

844. Яким проблемам присвячена праця Донелла Медоуз і Денніс Медоуз "Межі зростання":

- а. генетично-модифікованим продуктам
- б. населення людей на Землі
- в. зникненню біорізноманіття
- г. рекреаційному навантаженню

845. Який розділ екології вивчає взаємодію особин різних видів між собою і середовищем їх існування в межах локальної екосистеми:

- а. аутекологія
- б. демекологія
- в. синекологія
- г. Біосферологія

846. Яка з екологічних мереж базується на Бернській конвенції:

- а. Панєвропейська екологічна мережа
- б. Європейська екологічна мережа
- в. Emerald
- г. Natura 2000

847. Над якою працею працювали Донелла Медоуз і Денніс Медоуз:

- а. програма "ЮНЕП"
- б. "Agenda 21"
- в. Всесвітня декларація з прав тварин
- г. доповідь "Межі зростання"

848. Картахенський протокол присвячений:

- а. збереженню рідкісних видів
- б. генетично-модифікованим організмам
- в. зміні клімату
- г. захороненню відходів

849. Які форми охорони природи виділяють на локальному рівні

- а. заповідні урочища
- б. національні парки
- в. природні заповідники
- г. регіональні ландшафтні парки

850. Яка різниця між популяцією та ценопопуляцією:

- а. різниці немає
- б. популяція складається з ценопопуляцій
- в. ценопопуляція складається з популяцій
- г. ценопопуляція – це популяція в межах фітоценозу

851. Який із зазначених об'єктів є біосферним резерватом:

- а. Східні Карпати
- б. Галицький національний парк
- в. Дністровський каньйон
- г. Заповідник Ґорґани

852. Які з рівнів організації живого найчастіше вивчає аутокологія?

- а. клітинний
- б. популяційний
- в. організмівий
- г. тканинний

853. Відношення прегенеративних до генеративних особин в популяції це:

- а. індекс заміщення
- б. індекс генерування
- в. індекс відновлення
- г. індекс виживання

854. Формула $se+p+j+im+v$ менше ніж $g1+g2+g3+ss+s$ описує:

- а. динаміку смертності
- б. динаміку виживання
- в. лівобічні вікові спектри в популяції
- г. правобічні вікові спектри в популяції

855. Нормальна повночленна популяція це:

- а. немає правильної відповіді
- б. популяція, у якій народжуванність переважає над вимиранням
- в. популяція у якій співвідношення статей є однаковим
- г. популяція, яка складається з особин усіх вікових станів називається

856. Формула $Nab/(Na+Nb-Nab)$ описує:

- а. Коефіцієнт Жаккара
- б. Індекс Соренсена
- в. Коефіцієнт генерування
- г. Індекс відновлення

857. Структуру рослинних угруповань вивчає підрозділ який називається

- а. синтаксономія
- б. синдинаміка
- в. синморфологія
- г. немає правильної відповіді

858. Група, що включає в себе предкову форму та всіх нащадків називається:

- а. Нема правильної відповіді
- б. Поліфілетична
- в. Монофілетична група
- г. Парафілетична

859. Чотири класи екосистем по відношенню до їх продуктивності виділив:

- a. Whittaker
- б. Urban
- в. WWF
- г. Cronquist

860. Бета-різноманіття це:

- a. різноманіття, яке показує загальну кількість видів для всіх екосистем
- б. різноманіття, яке показує загальну кількість унікальних видів для порівнюваних екосистем
- в. різноманіття, яке показує загальну кількість видів унікальних видів для однієї екосистеми
- г. нема правильної відповіді

861. Формула "видове багатство/середня вирівняність видів в угрупованні" описує:

- a. Індекс відновлення
- б. Індекс Соренсена
- в. Індекс Віттекера
- г. Індекс життєздатності

862. За яким принципом обирають кінцеву кладограму (філогенетичне дерево):

- a. за принципом толерантності
- б. за принципом емерджентності
- в. за принципом парсимонії
- г. за принципом ієрархічності

863. Лінійно-кумулятивна модель розвитку характерна для:

- a. некласичних наук
- б. постнекласичних наук
- в. класичних наук
- г. жодної правильної відповіді

864. Злобін Юліан Андрійович розробив:

- a. аналіз структури популяцій
- б. аналіз життєвості популяцій
- в. аналіз динаміки популяцій
- г. аналіз стратегій популяцій

865. Сукупність властивостей, ознак і зв'язків, що забезпечують притаманну популяції здатність підтримувати рівень системної організації, необхідний для відновлення, розселення та еволюції це:

- a. буферність популяції
- б. комплексність популяції
- в. життєздатність популяції
- г. стратегія популяції

866. Формула " $v+g_1+g_2+g_3+ss+s$ " описує:

- a. молоді особини
- б. дорослі особини
- в. старіючі особини
- г. генеративні особини

867. Регресивна популяція це:

- а. Популяція, яка складається з молодих прегенеративних особин
- б. Популяція, яка складається зі старих постгенеративних особин
- в. Популяція, яка складається з особин усіх вікових груп
- г. нема правильної відповіді

868. Наука про самоорганізуючі та саморегулюючі системи це:

- а. екологія
- б. системологія
- в. синергетика
- г. немає правильної відповіді

869. Плезіоморфна ознака:

- а. наявна як у кореневого виду, так і у його нащадків
- б. наявна тільки у пізніх нащадків
- в. характерна для монофілетичної групи і при цьому є відмінною ознакою від інших споріднених груп.
- г. нема правильної відповіді

870. Відношення генеративних до дорослих особин називається:

- а. коефіцієнтом генерування
- б. коефіцієнтом відновлення
- в. коефіцієнтом спорідненості
- г. коефіцієнтом життєздатності

871. Карл Поппер...

- а. вніс принцип емерджентності
- б. вніс принцип мінімуму речовин і енергії
- в. вніс принцип фальсифікації
- г. вніс принцип обмеженості біологічних систем

872. Як називається розділ екології, який досліджує глобальну екосистему Землі:

- а. аутекологія
- б. демекологія
- в. синекологія
- г. біосферологія

873. Екологічні фактори, які пов'язані з впливом неживої природи називаються?

- а. абіотичні
- б. біотичні
- в. антропогенні
- г. едафічні

874. Поняття "екотон" було введено:

- а. Сукачовим
- б. Докучаєвом
- в. Вернадським
- г. Клементсом

875. Послідовна та необоротна зміна одного рослинного угруповання іншим називається:

- а. синюзія
- б. толерантність
- в. сукцесія
- г. тотипотентність

876. Англійський вчений Раймонд Лінденман відкрив закон:

- а. мінімуму
- б. піраміди енергії
- в. природного циклу
- г. конкуренції

877. Частина фітоценозу (біоценозу), сукупність особин одного або подібних видів:

- а. екотип
- б. біом
- в. біоценоз
- г. синюзія

878. Метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта пізнання іншим, подібним до нього називають:

- а. моніторинг
- б. модифікація
- в. метаболізм
- г. моделювання

879. Рослини та тварини, як пережитки флори і фауни минулих геологічних епох називаються:

- а. реліктовими
- б. карантинними
- в. ендемічними
- г. раритетними

880. Види сприятливих і не порушених місць існування, домінанти і едифікатори рослинних угруповань з широкими реалізованими нішами називаються:

- а. експлеренти
- б. пацієнти
- в. віоленти
- г. немає правильної відповіді

881. Хто розробив поняття стратегій популяцій:

- а. Дж. Грайм
- б. Ю. Одум
- в. В. Сукачов
- г. М. Голубець

882. Світлолюбні рослини, що пристосовані до життя при повному сонячному освітленні називаються:

- а. псамофіти
- б. геліофіти
- в. галофіти
- г. сукуленти

883. Евтрофікація це:

- а. збагачення водойм біогенними елементами, що супроводжується підвищенням продуктивності
- б. збіднення водойм біогенними елементами, що супроводжується зниженням продуктивності
- в. збагачення водойм киснем, що супроводжується підвищенням продуктивності
- г. збіднення водойм киснем, що супроводжується зниженням продуктивності

884. Який розділ вивчає динаміку популяцій:

- а. аутокологія
- б. синекологія
- в. демекологія
- г. біосферологія

885. Рослини тропічних дощових лісів належать до наступної групи організмів:

- а. Еврітермних
- б. Пойкілотермних
- в. Стенотермних
- г. Немає правильної відповіді

886. Харчовий режим це:

- а. своєрідність харчового матеріалу, що є джерелом енергії для тварин
- б. час споживання їжі у тварин протягом доби
- в. періоди споживання їжі у тварин протягом вегетаційних сезонів
- г. кількість спожитої їжі твариною протягом доби

887. Літораль це:

- а. ділянка берега, що заливається під час припливів
- б. глибинна зона Світового океану
- в. зона чи простір морського дна, яка відповідає ложу океану
- г. донна екологічна зона водойми та прилеглі до неї шари води

888. Рослини, що пристосувалися до життя на пісках називаються:

- а. Галофіти
- б. Геліофіти
- в. Псамофіти
- г. Сциофіти

889. Кількісні зміни, які відбуваються в ПТК під дією природних і антропогенних факторів і не приводять до якісної перебудови його структури називають:

- а. динаміка ландшафту
- б. деградація ландшафту
- в. сукцесія ландшафту
- г. трансформація ландшафту

890. Розділ екології, який вивчає причини і наслідки просторової різноманітності називається:

- а. синекологія
- б. ландшафтна екологія

- в. загальна екологія
- г. біосферологія

891. Предметом вивчення синекології є:

- а. біотоп
- б. екосистема
- в. угруповання
- г. екоотоп

892. Життєва форма рослин це:

- а. морфологічна будова рослин, що відображає у зовнішньому вигляді їх пристосування до умов довкілля
- б. фізіологічний тип пристосування рослин до факторів середовища
- в. ступінь адаптації організму рослини до умов довкілля
- г. спосіб розвитку рослини, який залежить від факторів середовища

893. Рослини вологих місць, які віддають перевагу вологим умовам зовнішнього середовища.

- а. Мезофіти
- б. Гідрофіти
- в. Гігрофіти
- г. Псамофіти

894. Види, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем називаються:

- а. Автохтонними
- б. Алохтонними
- в. Інвазійними
- г. Синантропними

895. Термітник це:

- а. Колонія
- б. Стадо
- в. Згряя
- г. Угруповання

896. Види рослин, які визначають особливості фітоценозу та відіграють найважливішу роль у формуванні його структури називаються:

- а. Домінантними
- б. Субдомінантними
- в. Кодомінантними
- г. Нема правильної відповіді

897. Співвідношення чоловічих та жіночих статей в групах 1 до декількох називається:

- а. Колонія
- б. Прайд
- в. Стадо
- г. Згряя

898. Як називається ділянка абіотичного середовища, яку займає угруповання живих організмів:

- а. Ареал
- б. Біоценоз
- в. Біотоп
- г. Екологічна ніша

899. Види навколо яких відбувається об'єднання інших видів називають:

- а. Центральними видами консорцій
- б. Автотрофними видами консорцій
- в. Гетеротрофними видами консорцій
- г. Детермінантними видами консорцій

900. Перелік рідкісних водно-болотних угідь представлений у:

- а. Зеленій книзі України
- б. Червоній книзі України
- в. Бернській конвенції
- г. Рамсарській конвенції

901. Який відсоток території України входить до природньо-заповідного фонду:

- а. Близько 1%
- б. Близько 5%
- в. Близько 10%
- г. Близько 15%

902. Здатність організмів підтримувати постійну температуру тіла незалежно від температури довкілля називається:

- а. евритермність
- б. стенотермність
- в. Пойкілотермність
- г. Гоміотермність

903. Хто ввів визначення, що біогеоценоз є екосистемою в межах фітоценозу:

- а. Лавренко Б. М. і Диліс М. В.
- б. Донелла Медоуз та Денніс Медоуз
- в. В. М. Сукачов
- г. Ю. Одум

904. Угрупування організмів, які штучно створені для отримання сільськогосподарської продукції називаються?

- а. Екосистема
- б. Біогеоценоз
- в. Агроценоз
- г. Популяція

905. Організми, які продукують органічні речовини із неорганічних сполук називаються:

- а. продуценти
- б. консументи
- в. редуценти
- г. деструктори

906. Поєднанням екологічних чинників, яке забезпечує оптимальний перебіг усіх процесів і дозволяє організму мати максимальну біологічну продуктивність називають:

- а. Екологічний песимум
- б. Екологічний оптимум
- в. Екологічний мінімум
- г. Екологічний максимум

907. Організм, вид або біоценоз, за наявності і станом якого можна судити про властивості середовища називають:

- а. біоіндикатори
- б. біотестери
- в. біопоказники
- г. нема правильної відповіді

908. Гетеротрофні організми, що одержують енергію за рахунок споживання готової органічної речовини називаються

- а. Редуценти
- б. Продуценти
- в. Консументи
- г. Конкуренти

909. Властивість рослин виділяти органічні сполуки, які пригнічують проростання, ріст, розвиток інших організмів:

- а. Коменсалізм
- б. Конкуренція
- в. Мутуалізм
- г. Алелопатія

910. Співіснування двох різних видів, корисне для одного з них і байдуже для іншого називається:

- а. Хижацтвом
- б. Паразитизмом
- в. Симбіозом
- г. Коменсалізмом

911. Формою первинної позитивної взаємодії між видами називають:

- а. Протокооперацію
- б. Мутуалізм
- в. Симбіоз
- г. Квартиранство

912. Созологія – це наука про:

- а. охорону природи
- б. популяції зникаючих видів
- в. зникаючі екосистеми
- г. використання природних ресурсів

913. Еколого-філософська концепція охорони дикої природи шляхом створення спеціальних територіальних утворень і введення в них суворого природоохоронного режиму називається:

- а. Категоричною заповідністю
- б. Абсолютною заповідністю
- в. Повною заповідністю
- г. Строгою заповідністю

914. Симбіоз належить до:

- а. антропогенних факторів
- б. абіотичних факторів
- в. біотичних факторів
- г. нема правильної відповіді

915. Еволюційний процес на рівні утворення нових видів та таксономічних одиниць вищої категорії називається:

- а. коеволюцією
- б. макроеволюцією
- в. мегаеволюцією
- г. мікроеволюцією

916. Види, які живуть у екстремальних умовах називаються:

- а. кокуренти
- б. стрес-толеранти
- в. рудерали
- г. віоленти

917. Рослинність, яка поширюється поблизу антропогенних ландшафтів:

- а. Синантропи
- б. Антропічна
- в. Рудерали
- г. Адвентивна

918. Модель Лотки-Вольтерра описує:

- а. внутрішньопопуляційну взаємодію
- б. міжпопуляційну взаємодію
- в. систему хижак-жертва
- г. межі екологічної толерантності

919. Логістична крива описує:

- а. Біотичний потенціал популяції
- б. Ріст популяції в умовах обмежених, але відновлювальних ресурсів
- в. Поліциклічні популяції
- г. Моноциклічні популяції

920. Взаємовідносини виду або популяції з екосистемою, та їхнє в ній розташування:

- а. біотоп
- б. екотоп
- в. екологічна ніша
- г. буферність

921. Хто ввів термін "біосфера" :

- а. В. Вернадський
- б. Е. Зюсс
- в. Ю. Одум
- г. І. Пригожин

922. Хто курує "Дунайсько-Карпатською програмою" сталого розвитку Дунайсько-Карпатського регіону:

- а. Всесвітній фонд дикої природи
- б. Національний екологічний центр України
- в. Київський еколого-культурний центр
- г. Європейське товариство дикої природи

923. Організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ називають:

- а. Екологічну політику
- б. Екологічний аудит
- в. Екологічний менеджмент
- г. Екологічну освіту

924. Конвенція CITES стосується:

- а. участі громадськості у процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
- б. міжнародної торгівлі видами дикої флори і фауни
- в. кліматичної політики
- г. водно-болотних угідь міжнародного значення

925. Боннська конвенція стосується:

- а. Зникаючих видів диких тварин
- б. Зникаючих видів рослин
- в. Мігруючих видів диких тварин
- г. Немає правильно відповіді

926. Який природний об'єкт в Україні включений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

- а. Дністровський каньйон
- б. Букові праліси Карпат
- в. Шацькі озера
- г. Асканія-Нова

927. Кількість біомаси, що виробляється угрупованням або популяцією за одиницю часу на одиниці площі називається:

- а. Трофічна продукція
- б. Біологічна продуктивність
- в. Харчова піраміда
- г. Питома продукція

928. Ліс, який не зазнав жодних змін під впливом людини називається:

- а. Праліс
- б. Старовіковий ліс

- в. Перестійний ліс
- г. Древній ліс

929. Л. фон Берталанфі ввів в екологію:

- а. природоохоронний підхід
- б. принцип емерджентності
- в. принцип біфуркації
- г. системний підхід

930. Сталий розвиток передбачає єдність та гармонійний розвиток:

- а. Соціальної та природної складової
- б. Природної та економічної складової
- в. Природної, соціальної та економічної складової
- г. Соціальної та економічної складової

931. Якого відсотку природно-заповідного фонду повинна досягти Україна відповідно до угоди з Європейським Союзом:

- а. 10%
- б. 15%
- в. 20%
- г. Немає правильної відповіді

932. Рослинна клітина містить:

- а. ядро, мітохондрії, Апарат Гольджі, ендоплазматичний ретикулум, мікротіла, рибосоми, цитоскелет;
- б. ядро з ядерцями, мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум, мікротіла, рибосоми, мікротрубочки та мікроворсинки;
- в. ядро з ядерцями, пластиди, Апарат Гольджі, ендоплазматичний ретикулум, центріолі, рибосоми, цитоскелет;
- г. ядро з ядерцями, мітохондрії, пластиди, ендоплазматичний ретикулум, мікротіла, вакуолі, пелікулу, цитоскелет.

933. У рослинній клітині відсутні:

- а. пероксисоми;
- б. ріст шляхом ділення клітин;
- в. клітинний центр;
- г. ріст шляхом розтягування.

934. Рослинній клітині не притаманний:

- а. біосинтез;
- б. хемосинтез;
- в. фотосинтез;
- г. біокаталіз.

935. У рослинній клітині немає:

- а. олеосом;
- б. лейкопластів;
- в. етіопластів;
- г. лейкоцитів.

936. У складі мембран не зустрічаються:

- а. вуглеводи;
- б. ферменти;
- в. глікопротеїди;
- г. моноцукри.

937. Рідкий стан бішару мембран забезпечують:

- а. фосфоліпіди;
- б. ненасичені жирні кислоти;
- в. тригліцериди;
- г. насичені жирні кислоти.

938. Мембрани виконують такі функції (знайти помилку):

- а. морфогенетичні;
- б. енергетичні;
- в. електричні;
- г. рецепторно-регуляторні.

939. Протиінфекційний бар'єр клітинної стінки залежить від:

- а. геміцелюлози;
- б. екстенсину;
- в. суберину;
- г. лектину.

940. Обрати правильний перелік безбарвних пластид:

- а. етіопласт, лейкопласт, пропластида;
- б. апопласт, пропластида, етіопласт;
- в. лейкоцит, етіопласт, гранулопласт;
- г. пропластида, лейкопласт, тонопласт.

941. Знайти правильний перелік безбарвних пластид:

- а. гранулопласти, етіопласти, пропластиди;
- б. протеїнопласти, пропластиди, етіопласти;
- в. лейкоцити, етіопласти, олеопласти;
- г. пропластиди, лейкопласти, амінопласти.

942. У меристемах трапляються пластиди

- а. тонопласт, протеїнопласт;
- б. апопласт, пропластида;
- в. лейкопласт, хромопласт;
- г. пропластида, лейкопласт.

943. У кореневищах трапляються пластиди

- а. хлоропласт;
- б. апопласт;
- в. лейкопласт;
- г. тонопласт.

944. Обрати правильний шлях взаємоперетворення пластид

- а. хромопласт у протейнопласт;
- б. апопласт у хлоропласт;
- в. лейкопласт у етіопласт;
- г. пропластида у лейкопласт.

945. Знайти правильний шлях взаємоперетворення пластид

- а. амілопласт у пропластиду;
- б. етіопласт у хлоропласт;
- в. лейкопласт у апопласт;
- г. протейнопласт у лейкопласт.

946. Знайти правильний перелік структур хлоропласта

- а. зовнішня й внутрішня мембрани, строма, кристи;
- б. тилакоїди строми, тилакоїди гран, везикули, матрикс;
- в. тилакоїди строми й гран, зовнішня й внутрішня мембрани, строма;
- г. міжмембранний простір, тонопласт, тилакоїди, матрикс.

947. У хромопластах наявні такі пігменти

- а. хлорофіли;
- б. каротини;
- в. антоціани;
- г. меланіни.

948. Рослинні мікротільця – це:

- а. нуклеосоми;
- б. глюкосоми;
- в. олеосоми;
- г. центросоми.

949. Пероксисоми – знаходяться в

- а. листках;
- б. сім'ядолях;
- в. сім'ябруньках;
- г. кореневищах.

950. Гліоксисоми – наявні в

- а. листках;
- б. сім'ядолях;
- в. бульбах;
- г. кореневищах.

951. Структурні компоненти вакуолі

- а. апопласт, вакуолярний сік;
- б. тонопласт, клітинний сік;
- в. етіопласт, строма;
- г. симпласт, вакуолярний сік.

952. рН вакуолярного соку здебільшого має значення

- а. 1-2 одиниці;
- б. 3-4 одиниць;
- в. 5-6 одиниць;
- г. 7-8 одиниць.

953. Вакуолі виконують таку функцію:

- а. осмотичну;
- б. регуляторну;
- в. морфогенетичну;
- г. електрофізіологічну.

954. Функцію автотрофного утворення АТФ у рослинній клітині виконують:

- а. мікротільця;
- б. апарат Гольджі;
- в. мітохондрії;
- г. хлоропласти.

955. Функцію перетворення жирних кислот у цукри в рослинній клітині виконують:

- а. гліоксисоми;
- б. апарат Гольджі;
- в. олеосоми;
- г. олеопласти.

956. Функцію росту розтягуванням в рослинній клітині виконують:

- а. плазмалема;
- б. вакуолі;
- в. цитоскелет;
- г. ендоплазматична сітка.

957. Знайдіть компонент матриксу стінки клітини рослин

- а. целюлоза;
- б. пектин;
- в. суберин;
- г. кутин.

958. Знайдіть інкрустуючі компоненти оболонки клітини рослин

- а. целюлоза;
- б. пектин;
- в. суберин;
- г. кутин.

959. До білків клітинної стінки рослин належить:

- а. екстенсин;
- б. пепсин;
- в. колаген;
- г. тубулін.

960. Оболонки сусідніх клітин рослин скріплюються:

- а. геміцелюлозою;
- б. лігніном;
- в. суберином;
- г. пектином.

961. Водонепроникність клітинної стінки рослин залежить від:

- а. целюлози і геміцелюлози;
- б. пектинових речовин;
- в. суберину і лігніну;
- г. лектину і екстенсину.

962. Катіонообмінну здатність клітинних стінок рослин забезпечують

- а. целюлоза і геміцелюлоза;
- б. кутин і віск;
- в. суберин і лігнін;
- г. лектин і екстенсин.

963. Єдина система клітинних стінок називається

- а. апопласт;
- б. б) тонопласт;
- в. в) протопласт;
- г. г) симпласт.

964. Функції вегетативного розмноження, фотосинтезу, резервну, опорну та провідну виконують

- а. стебла;
- б. листки;
- в. корені;
- г. бруньки.

965. Функції вегетативного розмноження, повітряного живлення, запасну, газообміну і транспірації виконують

- а. стебла;
- б. листки;
- в. корені;
- г. бруньки.

966. Складається зі стеблової (конус наростання) й листової (луски) частин

- а. цибулина;
- б. брунька;
- в. бульба;
- г. сімябрунька.

967. Орган покритонасінних рослин, який утворюється після запліднення із зав'язі

- а. насінний зачаток;
- б. насіння;
- в. плід;
- г. квітка.

968. Забезпечують різнонаправленні потоки речовин. Мова йде про

- а. хлоренхіму;
- б. аеренхіму;
- в. ендодерму;
- г. флоему.

969. Способи живлення рослин (знайти помилку):

- а. автотрофне живлення;
- б. абсорбційне живлення;
- в. ґрунтове живлення;
- г. гетеротрофне живлення.

970. Які функціональні системи рослин мають дифузний характер?

- а. рухова система;
- б. система дихання;
- в. росту і розвитку;
- г. транспортування речовин.

971. Знайдіть функціональну систему рослин.

- а. травна система;
- б. опорно-рухова;
- в. нервова система;
- г. видільна система.

972. Гомеостаз рослинного організму забезпечує:

- а. підтримку параметрів внутрішнього середовища в заданих межах;
- б. постійну експресію інтеграційних регуляторних генів;
- в. здатність тканин реагувати на зовнішні впливи із стабільною швидкістю;
- г. участь у формуванні та прояві реакції кореня на гравітацію.

973. Внутрішньоклітинні системи регуляції об'єднують:

- а. регуляцію на рівні ферментів (метаболічна), генетична та мембранна регуляція;
- б. трофічні взаємодії між різними частинами рослини;
- в. інтеграцію регуляторних механізмів на рівні клітин, тканин, органів;
- г. метаболічну регуляцію, генетичну та електрофізіологічну;

974. Ізостерична регуляція активності ферментів здійснюється:

- а. шляхом трансформації латентної форми фермента в активну форму;
- б. за допомогою алостеричних ефекторів;
- в. в результаті приєднання ко-факторів;
- г. на рівні каталітичних центрів ферментів.

975. Генетична система керування внутрішньоклітинними процесами забезпечує регуляцію на рівні:

- а. реплікації, трансмісії і трансляції;
- б. гліколізу, транскрипції, дихального ланцюга, транспірації;
- в. репарації і трансляції, гліколізу і транслокації;
- г. реплікації, транскрипції, процесингу і трансляції.

976. Гени, які кодують білки, складаються з:

- а. гена-регулятора (промотор + акцепторна зона) та цистронів;
- б. фікоеритрину та кодуючих ділянок нуклеоїда;
- в. промотора, акцепторної зони, нуклеотидної системи транскрипції;
- г. гена-регулятора + РНК-полімераза, інтронів та спейсерів;

977. В основі мембранної регуляції знаходиться:

- а. сукупність залізовмісних ферментів й переносників, які належать до цитохромної системи і локалізовані у мембранах;
- б. стан динамічної нерівноваги, який підтримується в кожній клітині на певному стаціонарному рівні завдяки роботі іонних насосів, локалізованих у мембранах;
- в. механізм фотофосфорильовання АДФ, спряжений з діяльністю мембранного електронно-транспортного ланцюга;
- г. процес сприйняття та перекодування сигналів у електричний імпульс.

978. До фітогормонів стимулюючої дії належать:

- а. індоліл–3-оцтова кислота, етилен і жасмонова кислота;
- б. абсцизова кислота, етилен і жасмонова кислота;
- в. ауксини, абсцизова кислота, триптофан і триптамін;
- г. ауксини, гібереліни, цитокиніни та брасини.

979. До фітогормонів-інгібіторів можна віднести:

- а. етилен, гібереліни, цитокиніни та брасини;
- б. абсцизову кислоту, етилен і жасмонову кислоту;
- в. етилен, абсцизову кислоту, триптофан і триптамін;
- г. індоліл–3-оцтову кислоту, етилен і жасмонову кислоту.

980. Найбільш виражений ефект ауксину виявляється в:

- а. стимуляції дихотомічного галуження кореня;
- б. стимуляції росту розтягуванням;
- в. пригнічення брунькоутворення;
- г. прискорення геотропічної реакції.

981. Основне місце синтезу цитокинінів у вегетуючих рослинах – це:

- а. апікальні меристеми коренів;
- б. інтеркалярні меристеми пагона;
- в. перицикл;
- г. апікальні меристеми пагона.

982. Ентомологія – це...

- а. розділ зоології, що вивчає ссавців
- б. розділ зоології, що вивчає павуків
- в. розділ зоології, що вивчає комах
- г. розділ зоології, що вивчає кліщів

983. Іхтіологія – це...

- а. наука про рибу, один з розділів зоології хребетних
- б. наука, яка вивчає комах
- в. наука, яка вивчає плазуни
- г. наука, яка вивчає молюски

984. Малакологія – це...
- а. наука про риб, один з розділів зоології хребетних
 - б. наука, яка вивчає комахи
 - в. наука, яка вивчає плазуни
 - г. наука, яка вивчає молюски
985. Палеозоологія – наука яка вивчає:
- а. закономірності поведінки тварин
 - б. екологію популяцій і є тісно пов'язана з філогенією
 - в. тваринний світ минулих часів
 - г. антропогенний вплив людини на тваринний світ
986. Вкажіть які групи тварин вивчає кожна з цих наук: 1. Теріологія, 2. Орнітологія, 3. Герпетологія
- а. 1. птахів; 2. ссавців; 3. плазунів
 - б. 1 ссавців; 2. птахів; 3. плазунів
 - в. 1. ссавців; 2. плазунів; 3. птахів
 - г. 1. плазунів; 2. земноводних; 3. плазунів
987. Що вивчає 1.іхтіологія, 2.ентомологія, 3.гельмінтологія?
- а. 1. риб; 2. комах; 3. паразитичних червів
 - б. 1. комах; 2. риб; 3. паразитичних червів
 - в. 1. риб; 2. паразитичних червів; 3. патогенних червів
 - г. 1. патогенних червів; 2. паразитичних червів; 3. риб
988. Як називається злиття двох статевих клітин (гамет)?
- а. Кон'югація
 - б. Шизогонія
 - в. Копуляція
 - г. Стробуляція
989. Як називається чергування статевого та нестатевого способів розмноження?
- а. Онтогенез
 - б. Метагенез
 - в. Ендодіогенія
 - г. Ортоптерез
990. Основною функцією скоротливої вакуолі є
- а. Синтез
 - б. Перетравлення їжі
 - в. Осморегуляція
 - г. Передача спадкової інформації
991. Неперетравлені рештки їжі у амеби виділяються через:
- а. Ротовий отвір
 - б. Поверхню тіла
 - в. Анальний отвір
 - г. Порошицю
992. Яка кількість скоротливих вакуолей у інфузорія тувельки?

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

993. Способи живлення найпростіших:

- а. Автотрофне і гетеротрофне
- б. Гетеротрофне і міксотрофне
- в. Гетеротрофне
- г. Автотрофне і міксотрофне

994. Як називається парне з'єднання грегарин?

- а. Сизигій
- б. Копулянти
- в. Шизонт
- г. Ооциста

995. Організм в якому відбувається статеве розмноження називається:

- а. Остаточний хазяїн
- б. Проміжний хазяїн
- в. Вихідний хазяїн
- г. Хазяїн

996. Переносником лейшманії слугує:

- а. муха це-це
- б. москіт
- в. комар роду Анофелес
- г. джмелі

997. Всередині джгутика є.....

- а. скоротлива вакуоля
- б. ядро
- в. світлочутливе вічко
- г. аксонема

998. Виберіть представників тільки Рослинних джгутикових

- а. евглена зелена, трипаносоми
- б. вольвокс, лямблія
- в. евглена зелена, ночесвітка дивовижна
- г. трипаносома, лямблія

999. Виберіть представників тільки Тваринних джгутикових

- а. евглена зелена, трипаносоми
- б. вольвокс, лямблія
- в. евглена зелена, вольвокс
- г. трипаносома, лямблія

1000. Представники, якого ряду джгутикових спричиняють явище біолоюмінесценції?:

- а. Ряд Панцерні джгутикові
- б. Ряд Евгленові джгутикові
- в. Ряд Кінетопластиди
- г. Ряд Дипломонадні

1001. Протонема у мохів:

- а. утворюється із зиготи
- б. утворюється зі спори
- в. утворює симбіоз з грибами
- г. утворює корені

1002. Вкажіть основне джерело енергії для усіх мешканців нашої планети:

- а. газ
- б. нафта
- в. сонячна енергія
- г. бензин

1003. З'ясуйте, скільки відділів налічує кишечник кільчастих червів:

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 5

Базовий рівень

1. Яка тривалість серцевого циклу у людини?

- а. 0,8
- б. 1,0
- в. 0,5
- г. 0,4

2. Функції м'язів:

- а. опорно-рухова і теплотворна
- б. секреторна
- в. видільна
- г. екстерорецептивна

3. Структурною основою вищої нервової діяльності є:

- а. підкіркові структурні
- б. кора півкуль головного мозку з підкіркою
- в. автономна нервова система
- г. спинний мозок

4. Процеси обміну речовин в фізіології позначаються терміном:

- а. метаболізм
- б. асиміляція
- в. дисиміляція
- г. катаболізм

5. Вуглеводи накопичуються в клітинах у вигляді:

- а. глікогену
- б. глюкози
- в. фруктози
- г. глюкози і фруктози

6. Функція дихальної системи полягає у:

- а. забезпеченні руху крові по кровоносним судинам
- б. забезпеченні організму поживними речовинами
- в. забезпеченні організму киснем та виведенні вуглекислого газу
- г. забезпеченні організму вітамінами і мінералами

7. Однією з основних умов функціонування органів та систем організму є:

- а. достатній теплообмін
- б. високий рівень забезпечення організму жирами та вуглеводами
- в. утримання кислотно-лужної рівноваги
- г. гіподинамія

8. Кислотворну дію на організм виявляють:

- а. продукти тваринного походження
- б. овочі
- в. рослинні продукти
- г. фрукти

9. Нервова регуляція здійснюється за допомогою:

- а. нервових імпульсів
- б. ферментів
- в. вітамінів
- г. гормонів

10. До збудливих тканин належать:

- а. м'язова і нервова
- б. м'язова і сполучна
- в. хрящова і епітеліальна
- г. м'язова і епітеліальна

11. Для синтезу гормонів щитоподібної залози необхідний такий хімічний елемент:

- а. бром
- б. калій
- в. йод
- г. фтор

12. Залози внутрішньої секреції виділяють гормони в:

- а. лімфу
- б. кров
- в. тканинну рідину
- г. просвіт кишечника

13. Недостача інсуліну в організмі викликає розвиток:

- а. ниркової недостатності
- б. ниркового діабету
- в. цукрового діабету
- г. порушень травлення

14. Гіркий смак відчувається такою ділянкою язика:

- а. коренем
- б. бічними поверхнями
- в. кінчиком
- г. усією поверхнею

15. Дальтонізм пов'язаний з порушеним сприйняттям кольору:

- а. чорного
- б. синього
- в. фіолетового
- г. червоного і зеленого

16. Екстерорецептори розташовуються:

- а. в м'язах
- б. на зовнішній поверхні тіла
- в. у внутрішніх органах
- г. в легенях

17. Інтерорецептори розташовуються:

- а. в залозах зовнішньої секреції
- б. на зовнішній поверхні тіла
- в. у внутрішніх органах
- г. на шкірі

18. Синтезу зорових речовин сприяє вітамін:

- а. С
- б. В
- в. В12
- г. А

19. Вестибулярний апарат реагує на зміну положення тіла завдяки наявності:

- а. отолітової кулі
- б. слухових кісточок
- в. Євстахієвої труби
- г. півовального вікна

20. Внутрішнє середовище організму - це:

- а. ротова порожнина
- б. весь травний канал
- в. кров, лімфа і міжтканинна рідина
- г. порожнина сечового міхура

21. У носовій порожнині відбувається:

- а. зігрівання повітря
- б. очищення повітря
- в. газообмін
- г. очищення і зігрівання повітря

22. До формених елементів крові належать:

- а. еритроцити
- б. еритроцити, лейкоцити
- в. лейкоцити, тромбоцити
- г. еритроцити, лейкоцити, тромбоцити

23. В період статевого дозрівання у дівчат встановлюється тип дихання:

- а. черевний
- б. грудний
- в. змішаний
- г. діафрагмальний

24. Еритроцити дозрівають в:

- а. лімфовузлах
- б. печінці
- в. селезінці
- г. червоному кістковому мозку

25. Звуковираження пов'язане з таким відділом дихальної системи:

- а. глотка
- б. трахея
- в. гортань
- г. бронхи

26. Залози внутрішньої секреції виробляють:

- а. травні соки
- б. гормони
- в. ферменти
- г. вітаміни

27. Основним механізмом діяльності головного мозку є:

- а. рефлекс
- б. домінанта
- в. динамічний стереотип
- г. екстраполяція

28. Регулюючий вплив нервової системи і гормонів залоз внутрішньої секреції на організм, називається:

- а. нейрогуморальною регуляцією
- б. гормональною регуляцією
- в. нервовою регуляцією
- г. рефлекторною регуляцією

29. Подразнення із зовнішнього середовища сприймаються:

- а. інтерорецепторами
- б. екстерорецепторами
- в. пропріорецепторами
- г. осморецепторами

30. На відміну від безумовних рефлексів умовні рефлекси:

- а. набуті і індивідуальні
- б. спадкові і видові
- в. мають сталі рефлекторні дуги
- г. відмінності немає

31. Гормонами щитоподібної залози є:

- а. тироксин і трийодтиронін
- б. інсулін і глюкагон
- в. адреналін
- г. соматотропний гормон

32. Друга сигнальна система дійсності - це:

- а. довільна рухова активність
- б. мова
- в. мимовільна рухова активність
- г. рецепторна чутливість

33. Пристосування аналізаторів до дії адекватних подразників, називається:

- а. гомеостазом
- б. адаптацією
- в. акліматизацією
- г. акомодациєю.

34. Підтримання вертикального положення тіла людини в умовах дії сил гравітації забезпечується з допомогою такої сенсорної системи:

- а. слухової
- б. нюхової
- в. вестибулярної
- г. смакової

35. Мальтаза слини діє на:

- а. крохмаль
- б. мальтозу
- в. глюкозу
- г. яєчний білок

36. Пережовану, змочену слиною та частково розщеплену їжу язик проштовхує до:

- а. глотки
- б. стравоходу
- в. шлунка
- г. тонкої кишки

37. Шлунок складається з такої кількості відділів:

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

38. Вкажіть, які судини переносять кров від серця до органів?

- а. артерії
- б. вени
- в. капіляри
- г. анастомози

39. Вкажіть, які судини переносять кров від органів до серця?

- а. вени
- б. артерії
- в. капіляри
- г. анастомози

40. В умовах екзаменаційного стресу частота серцевих скорочень і кров'яний тиск:

- а. зростають
- б. зменшуються
- в. зменшуються несуттєво
- г. зменшуються лише безпосередньо перед екзаменом

41. Сильний, неврівноважений (з перевагою збудження над гальмуванням) "нестримний" тип ВНД:

- а. сангвінічний
- б. холеричний
- в. флегматичний
- г. меланхолічний

42. На стресові чинники первинно реагує:

- а. система виділення
- б. опорно-рухова
- в. система дихання
- г. нервова і залози внутрішньої секреції

43. Стрес - це напруження, яке:

- а. забезпечує пристосування організму до дії надзвичайних подразників
- б. підтримує необхідний рівень глюкози в крові
- в. викликає почуття радості
- г. сприяє надходженню в організм поживних речовин

44. Велике коло кровообігу починається з:

- а. правого шлуночка
- б. лівого шлуночка
- в. правого передсердя
- г. лівого передсердя

45. Фаза виснаження стресу проявляється (вкажіть неправильну відповідь):

- а. посиленням розпадом білків в організмі
- б. зниженням артеріального тиску
- в. атрофією кіркового шару наднирників
- г. мобілізацією резервів і підвищенням працездатності

46. На стресові чинники перш за все реагує:

- а. нервова система
- б. система виділення
- в. серцево-судинна система
- г. опорно-рухова система

47. Вкажіть, в яких судинах відбувається обмін газів та речовин:

- а. вени
- б. артерії
- в. капіляри
- г. анастомози

48. Збудливими є клітини таких тканин:

- а. сполучної
- б. кісткової
- в. нервової і м'язової
- г. кісткової і жирової

49. Подразники, до дії яких рецептори відповідних сенсорних систем пристосовані філогенетично, називаються:

- а. адекватними
- б. неадекватними
- в. пороговими
- г. підпороговими.

50. Які речовини всмоктують стінки товстого кишечника

- а. вуглеводи
- б. жири
- в. воду
- г. білки

51. Продукти обміну речовин, тканинні гормони, медіаторні речовини лежать в основі:

- а. нервової регуляції функцій
- б. гормональної регуляції функцій
- в. гуморальної регуляції функцій
- г. нейрогормональної регуляції

52. Відображення властивостей предметів об'єктивного світу, що виникає при їх безпосередній дії на рецептори, називається:

- а. відчуття
- б. сприйняттям
- в. уявленням
- г. умовиводом

53. Сильний, врівноважений, повільний тип нервової системи:
- а. сангвінічний
 - б. холеричний
 - в. флегматичний
 - г. меланхолічний
54. Виберіть, які структури серця забезпечують виштовхування крові в судини?
- а. атипові кардіоміоцити
 - б. клапани серця
 - в. передсердя
 - г. шлуночки
55. Головним структурно-функціональним елементом нервово-м'язового апарата є:
- а. рухова одиниця
 - б. нефрон
 - в. міофібрили
 - г. саркоплазматичний ретикулум
56. Посилають синтез білків в м'язах гормони
- а. естрогени
 - б. андрогени
 - в. кортикостероїди
 - г. інсулін
57. Скорочення м'язів, при яких вони розвивають напруження, але не змінюють своєї довжини, називаються:
- а. динамічними
 - б. аусотонічними
 - в. статичними
 - г. циклічними
58. Вся кишкова трубка є безперервною, її довжина близько (м):
- а. 7-8
 - б. 5-6
 - в. 3-4
 - г. 1-2
59. Основною структурною і функціональною одиницею нирки є:
- а. нейрон
 - б. нефрон
 - в. рухова одиниця
 - г. мотонейрон
60. Зниження кількості еритроцитів в крові нижче 3млн/мм³ і кількості гемоглобіну нижче 60 % свідчить про:
- а. наявність анемічного стану
 - б. еритроцитом

- в. лейкоцитоз
- г. тромбоцитоз

61. Сстійке підвищення артеріального тиску:

- а. гіпотонія
- б. атонія
- в. гіпертонія
- г. гіпотензія

62. Фізіологічна система:

- а. литковий і двоголовий м'язи
- б. серце і судини
- в. язик і зуби
- г. шкіра і волосся

63. Регуляція функцій в організмі здійснюється:

- а. нервовою системою
- б. залозами внутрішньої секреції (ЗВС)
- в. серцево-судинною системою
- г. нервовою системою і ЗВС

64. Адекватними подразниками для рецепторів сітківки ока є:

- а. світлові електромагнітні хвилі певного діапазону довжин
- б. коливання звукових хвиль певної частоти
- в. зміни положення тіла в просторі
- г. газоподібні хімічні речовини повітря

65. Білок скелетних м'язів, який здатний зв'язувати близько 15% кисню:

- а. гемоглобін
- б. оксигемоглобін
- в. міоглобін
- г. міоальбумін

66. Виберіть вітамін, при нестачі якого у дітей розвивається рахіт, а у дорослих остеомаліяція?

- а. вітамін А
- б. вітамін Е
- в. вітамін К
- г. вітамін D

67. Продуктом секреторної діяльності печінкових клітин є:

- а. шлунковий сік
- б. кишковий сік
- в. жовч
- г. гормони

68. Продукти гідролізу жирів в травному тракті:

- а. амінокислоти
- б. поліпептиди

- в. моноцукри
- г. гліцерин і жирні кислоти

69. Без якого вітаміну в організмі виникає куряча сліпота?

- а. В1
- б. D
- в. А
- г. В12

70. Виділяють такі основні форми неврозів:

- а. неврастенія, невроз нав'язливих станів
- б. невроз нав'язливих станів, істерія
- в. неврастенія, істерія
- г. неврастенія, невроз нав'язливих станів, істерія

71. На збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі первинно реагує:

- а. система виділення
- б. опорно-рухова
- в. система дихання
- г. нервова і залози внутрішньої секреції

72. Вкажіть, що таке відносно постійний склад внутрішнього середовища організму:

- а. гомеостаз
- б. гемостаз
- в. живий організм
- г. мертвий організм

73. Вкажіть, хто вперше побачив і описав кровоносні капіляри:

- а. Клавдій Гален
- б. Аристотель
- в. Марчело Мальпігі
- г. Вільям Гарвей

74. Основним структурно-функціональним елементом нервової системи організму є:

- а. перехват Ранв 'є
- б. нейрон
- в. аксон
- г. синапс

75. Недостатнє виділення гормону росту спричинює розвиток:

- а. гігантизму
- б. кретинізму
- в. карликовості
- г. акромегалії

76. Кожний аналізатор чуття складається з:

- а. рецептора, доцентрового нервового волокна, нервового центра
- б. м'язів і кісток

- в. залоз зовнішньої секреції і м'язів
- г. крові і лімфи

77. Слухові кісточки розміщуються в:

- а. Євстахієвій трубці
- б. завитку
- в. порожнині середнього вуха
- г. зовнішньому слуховому проході

78. Під дією адреналіну та йонів калію діяльність серця:

- а. прискорюється
- б. сповільнюється
- в. не змінюється
- г. призупиняється

79. Які із органів відносяться до органів імунної системи?

- а. печінка, жовтий кістковий мозок
- б. вилочкова залоза, лімфатичні вузли, мигдалики, червоний кістковий мозок
- в. гіпофіз, епіталамус, гіпоталамус
- г. печінка, червоний кістковий мозок

80. Рівень глюкози в крові регулює гормон:

- а. адреналін
- б. інсулін
- в. тироксин
- г. норадреналін

81. У яких судинах кров насичена киснем і тече від серця до всіх органів?

- а. в артеріях
- б. у венах
- в. у капілярах
- г. у черевній частині аорти

82. Головні клітини слизової оболонки шлунка синтезують:

- а. слиз
- б. ферменти
- в. соляну кислоту
- г. муцин

83. Тактильні і смакові рецептори належать до:

- а. пропріорецепторів
- б. вісцерорецепторів
- в. контактних екстерорецепторів
- г. дистанічних екстерорецепторів.

84. Безпосереднім джерелом енергії для м'язового скорочення є:

- а. білки
- б. жири

- в. АТФ
- г. вуглеводи

85. Продукти гідролізу білків в травному тракті всмоктуються в кров у вигляді:

- а. гліцерину і жирних кислот
- б. моноцукрів
- в. поліпептидів
- г. амінокислот

86. Хребтовий вигин в області шиї, спрямований опуклістю вперед, називається:

- а. поперековий лордоз
- б. шийний лордоз
- в. грудний кіфоз
- г. шийно-грудний сколіоз

87. Найменша кількість енергії, яка витрачається організмом для підтримання життя в стані повного м'язового і психічного спокою, натщесерце і при температурі комфорту (20-22°C), називається:

- а. основним обміном
- б. загальним обміном
- в. додатковими енерговитратами
- г. специфічно-динамічною дією

88. Вкажіть, яка тканина належить до збудливих тканин?

- а. м'язова
- б. епітеліальна
- в. сполучна
- г. статева

89. Як називається місце контакту двох клітин?

- а. симпласт
- б. пора
- в. синапс
- г. мембрана

90. Найменша сила подразнення, яка здатна викликати мінімальну відповідь збудливої тканини, називається:

- а. порогом подразнення
- б. супермаксимальним подразненням
- в. підпороговим подразненням
- г. максимальною силою подразнення

91. Відчуття дотику, тиску і вібрації пов'язані з сприйняттям подразників, які діють на рецептори:

- а. органа слуху
- б. шкіри
- в. органа зору
- г. розташовані в м'язах, зв'язках і сухожилках

92. У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якого гормону є причиною цього:

- а. вазопресин
- б. інсулін
- в. кортизон
- г. окситоцин

93. Дефекація відбувається внаслідок:

- а. скорочення м'язів прямої кишки та розслаблення м'язів сфінктерів
- б. скорочення м'язів прямої кишки та скорочення м'язів сфінктерів
- в. розслаблення м'язів прямої кишки та розслаблення м'язів сфінктерів
- г. розслаблення м'язів прямої кишки та скорочення м'язів сфінктерів

94. Яким шляхом видаляється вуглекислий газ з організму?

- а. з видихуванним повітрям
- б. з калом і сечею
- в. з потом і сечею
- г. з потом через шкіру

95. Які рецептори ротової порожнини збуджуються раніше за інших?

- а. больові
- б. холодові
- в. теплові
- г. тактильні

96. В лабораторію на дослідження доставлений травний сік, рН якого становить 2,2. Який це травний сік?

- а. шлунковий сік
- б. підшлунковий сік
- в. жовч
- г. кишковий сік

97. Вкажіть, який гормон гіпофізу стимулює дозрівання фолікула?

- а. кортикотропний (АКТГ)
- б. тиреотропний (ТТГ)
- в. фолікулотропний (ФТГ)
- г. соматотропний (СТГ)

98. У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага, поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

- а. інсулін
- б. глюкагон
- в. кортизол
- г. соматотропін

99. Який із перелічених факторів найкраще забезпечив би розширення та зростання проникності судин мікроциркуляторного русла:

- а. гістамін
- б. ендотелін
- в. вазопресин
- г. норадреналін

100. Легеня вкрита плеврою, яка це оболонка?
- а. серозна
 - б. слизова
 - в. м'язова
 - г. нервова
101. Який з легеневих об'ємів неможливо визначити за допомогою спірометрії
- а. залишковий об'єм
 - б. дихальний об'єм
 - в. резервний об'єм вдиху
 - г. резервний об'єм видиху
102. У загальному аналізі крові дитини 12 років виявили збільшену кількість еозинофілів 12%. Вкажіть, при якому стані це може спостерігатися:
- а. аскаридоз
 - б. загальний інтоксикаційний синдром
 - в. пневмонія
 - г. імунодефіцитний стан
103. У людини схильність до розвитку карієса. Причиною цього може бути недостатній вміст у слині наступного компонента:
- а. альфа-амілаза
 - б. мальтаза
 - в. слиз
 - г. лізоцим
104. Яка залоза виділяє гормон інсулін?
- а. щитоподібна
 - б. паращитоподібна
 - в. епіфіз
 - г. підшлункова
105. Вкажіть, який гормон гіпофізу стимулює обмін речовин та ріст людини?
- а. кортикотропний (АКТГ)
 - б. тиреотропний (ТТГ)
 - в. фолікулотропний (ФТГ)
 - г. соматотропний (СТГ)
106. Вкажіть які гормони виділяють яєчники?
- а. естрогени, прогестерон
 - б. інсулін, глюкагон
 - в. мінералокортикоїди, глюкокортикоїди
 - г. паратгормон
107. У хворого при ураженні одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м'язів під час виконання довільних рухів, порушення тону м'язів. Який із відділів ЦНС уражений?

- а. мозочок
- б. довгастий мозок
- в. проміжний мозок
- г. середній мозок

108. Під час морської прогулянки виникли прояви хвороби руху: збліднення, пітливість, запаморочення, нудота, прискорення дихання, зниження артеріального тиску та ін. Що стало причиною?

- а. надмірне подразнення вестибулярного апарата
- б. надмірне подразнення вісцерорецепторів черевної порожнини
- в. порушення координації між зоровою і руховою системами
- г. активація симпатичного відділу автономної нервової системи

109. Виберіть, як впливає на організм інсулін?

- а. регулює мінеральний обмін, затримує натрій
- б. сприяє потраплянню глюкози в клітини, зменшує рівень глюкози в крові
- в. прискорює обмін речовин, викликає тахікардію та підвищує АТ
- г. регулює мінеральний обмін, затримує кальцій

110. При тривалій дії смакових речовин у людини відбувається зниження інтенсивності смакового відчуття – адаптація. Найбільш повільно вона розвивається до:

- а. гіркого і кислого
- б. солодкого і солоного
- в. солоного і кислого
- г. гіркого і солоного

111. У людини досліджують функцію нюхового аналізатора. Від нюхових рецепторів носової порожнини імпульси спочатку направляються в:

- а. нюхову цибулину
- б. нюховий горбик
- в. переднє нюхове ядро
- г. ядра мигдалевидного комплексу

112. Молодий чоловік спробував підняти вантаж, який раніше ніколи не піднімав. Спроба виявилася невдалою. Який вид м'язового скорочення мав місце в цьому випадку:

- а. ізометричне
- б. ізотонічне
- в. ауксотонічне
- г. зубчастий тетанус

113. У юнака 16 років зріст 90 см, пропорції тіла та інтелектуальні здібності нормальні. Найбільш ймовірно причиною цього стану є недостатність секреції в період дитинства:

- а. соматотропіну
- б. інсуліну
- в. тироксину
- г. андрогенів

114. До складу яких формених елементів крові входить гемоглобін?

- а. еритроцити
- б. лімфоцити
- в. еозинофіли
- г. тромбоцити

115. Яка залоза виділяє гормон тестостерон?

- а. вилочкова
- б. підшлункова
- в. надниркові
- г. статеві залози

116. При тривалому тренуванні в спортсмена виникла втома. У якій частині рефлекторної дуги відбулася втома:

- а. нервовому центрі
- б. аферентному нервовому волокні
- в. еферентному нервовому волокні
- г. м'язі

117. У будівельника при завершенні робочої зміни знижується працездатність, яка відновлюється після відпочинку. Яку назву має цей процес ?

- а. втома
- б. парабіоз
- в. песимум
- г. оптимум

118. І.М.Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:

- а. активний відпочинок
- б. парабіоз
- в. песимум
- г. оптимум

119. В експерименті вивчалися головні показники гемодинаміки. Який з нижче перерахованих показників гемодинаміки є однаковим для великого й малого кіл кровообігу

- а. об'ємна швидкість кровотоку
- б. середній артеріальний тиск
- в. опір кровотоку
- г. лінійна швидкість кровотоку

120. Під час емоційного збудження в людини виявлено збільшення: частоти серцевих скорочень, АТ, вмісту глюкози в крові. Стан підшлункової залози не змінено. Збільшення концентрації якого гормону призвело до такого стану:

- а. інсуліну
- б. паратгормону
- в. естрогену
- г. адреналіну

121. Зазвичай людина в стані алкогольного сп'яніння на морозі замерзає швидше, ніж тверезий. У чому причина?

- а. алкоголь розширює судини шкіри, зменшується вміст ліпідів у крові
- б. зменшується вміст ліпідів крові
- в. порушується функція крові
- г. судини спазмуються, шкіра швидко охолоджується

122. Дівчинка 10 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких виникають множинні точкові крововиливи на місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце у хворої?

- а. А
- б. С
- в. В6
- г. В1

123. При підвищенні концентрації глюкози в крові більш, ніж 10 ммоль/л буде спостерігатися:

- а. глюкозурія
- б. протеїнурія
- в. анурія
- г. глюконеогенез

124. Після вживання солодкого чаю в крові підвищується рівень наступного гормону:

- а. глюкагону
- б. інсуліну
- в. кортизолу
- г. альдостерону

125. Страх перед болем часто є причиною уникнення відвідування пацієнтом стоматолога. Який вид пам'яті лежить в основі цього явища?

- а. емоційна
- б. моторна
- в. генетична
- г. словесно-логічна

126. У хлопчика 9 років виявлено запізнення статевого розвитку. Де виробляються чоловічі статеві гормони, які впливають на розвиток статевих органів до статевого дозрівання ?

- а. у наднирниках
- б. у яєчках
- в. у гіпоталамусі
- г. у гіпофізі

127. В умовах сучасних міст автомобільний потік збільшує вміст оксиду вуглецю (СО) в навколишньому середовищі. До утворення якої патологічної сполуки гемоглобіну це приводить?

- а. оксигемоглобіну
- б. метгемоглобіну
- в. карбоксигемоглобіну
- г. карбгемоглобіну

128. До фізіологічних властивостей серцевого м'язу людини відносяться всі наступні, крім:

- а. еластичність
- б. скоротливість

- в. збудливість
- г. провідність

129. Свій загальний енергетичний обмін можна розрахувати, якщо відома кількість :

- а. виділеного CO₂
- б. спожитого O₂ та виділеного CO₂
- в. спожитих білків
- г. спожитих жирів

130. Виберіть, як впливають на організм естрогени?

- а. регулюють мінеральний обмін, затримують натрій
- б. сприяють відновленню ендометрію та дозріванню фолікула
- в. прискорюють обмін речовин, викликають тахікардію та підвищує АТ
- г. сприяють потраплянню глюкози в клітини, зменшують рівень глюкози в крові

131. Вкажіть, як називається наука яка вивчає прояви життєдіяльності організму в цілому та окремих його частин в нормі?

- а. фізіологія
- б. анатомія
- в. біологія
- г. медицина

132. Виберіть, які функції виконує фібриноген?

- а. транспортує гормони та ліпіди
- б. забезпечує осмотичний тиск крові
- в. приймає участь в утворенні антитіл
- г. приймає участь у згортанні крові

133. Виберіть. які функції організму належать до соматичних?

- а. обмін речовин
- б. дихання
- в. травлення
- г. повзання

134. Взаємозв'язок між ендокринною і нервовою системами в значній мірі здійснюється за допомогою рилізінг-гормонів. Вкажіть місце їх вироблення:

- а. аденогіпофіз
- б. нейрогіпофіз
- в. гіпоталамус
- г. епіфіз

135. Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб спричинити згортання?

- а. іони натрію
- б. протромбін
- в. іони кальцію
- г. фібриноген

136. Міокард являє собою функціональний синтицій і збудження, що виникає у будь-якій ділянці поширюється на всі інші відділи. У зв'язку з цією особливістю збудження в серці підлягає закону:

- а. усе або нічого
- б. Лапласа
- в. Франка-Старлінга
- г. Анрепа

137. Головним продуктом діяльності печінки є:

- а. жовч
- б. кров
- в. лімфа
- г. слина

138. У людини в стані спокою частота серцевих скорочень 60 за хвилину. Якою є тривалість серцевого циклу у цієї людини?

- а. 1,0 секунда
- б. 0,6 секунди
- в. 0,7 секунди
- г. 0,8 секунди

139. Виберіть з чого складається кров?

- а. води – 90% та сухого залишку – 10%
- б. плазми-55-60% та формених елементів – 40-45%
- в. білків, жирів, вуглеводів
- г. альбуміни, глобуліни, фібриноген

140. Акросома – це:

- а. видозмінений комплекс Гольджі
- б. видозмінена ендоплазматична сітка
- в. мітохондрії
- г. рибосоми

141. Причиною тромбоутворення в разі ушкодження ендотелію є:

- а. порушення продукції ендотелієм простагліну і антитромбіну
- б. активація фібринолізу
- в. адгезія і агрегація тромбоцитів
- г. розширення судин

142. Який процес називається фагоцитозом?

- а. вихід за межі судинного русла рідкої частини крові
- б. порушення оболонки еритроцитів
- в. пошкодження тканин
- г. здатність клітин організму поглинати і перетравлювати часточки живої та неживої природи

143. Сангвінік відрізняється від флегматика:

- а. силою процесів збудження
- б. рухомістю нервових процесів

- в. врівноваженістю нервових процесів
- г. слабкістю нервових процесів

144. Холерик відрізняється від флегматика:

- а. неврівноваженістю і рухливістю нервових процесів
- б. слабкістю і неврівноваженістю нервових процесів
- в. врівноваженістю і рухливістю нервових процесів
- г. силою процесів збудження і рухливістю нервових процесів

145. Як називається збільшення глюкози в крові?

- а. гіперглікемія
- б. гіпоксія
- в. гіпоглікемія
- г. гіподинамія

146. У людини – дефіцит вітаміну D, що призводить до недостатнього всмоктування:

- а. кальцію
- б. заліза
- в. натрію
- г. хлору

147. Клітиною нервової тканини є:

- а. нейрон
- б. нефрон
- в. ацинус
- г. еритроцит

148. Тривалість життя еритроцитів становить:

- а. 20 днів
- б. 0-15 днів
- в. 8-12 днів
- г. 120 днів

149. Протягом життєдіяльності процеси зсідання крові можуть порушуватися. Як називається стан, при якому пришвидшується зсідання крові?

- а. гіпокоагуляція
- б. тромбоцитопенія
- в. еритремія
- г. гіперкоагуляція

150. Чоловічі статеві клітини утворюються у:

- а. яєчниках
- б. яєчках
- в. мошонці
- г. передміхуровій залозі

151. Відомо, що в людини є два кола кровообігу. З якого відділу серця починається мале коло кровообігу?

- а. з правого шлуночка
- б. з правого передсердя
- в. з лівого передсердя
- г. з лівого шлуночка

152. Під час заняття студенти виділили серце жаби і помістили його в ізотонічний розчин, де воно продовжувало скорочуватися. Якою властивістю зумовлено скорочення ізольованого серця?

- а. провідність
- б. збудливість
- в. рефрактерність
- г. автоматизм

153. Жіночі статеві клітини утворюються у:

- а. яєчниках
- б. яєчках
- в. матці
- г. маткових трубах

154. Процес утворення і виділення сечі з організму називається?

- а. анурія
- б. діурез
- в. глікозурія
- г. уремія

155. У підтриманні крові у рідкому стані важливу роль відіграють протизсідальні речовини. Яка їх назва?

- а. прокоагулянти.
- б. коензими
- в. антикоагулянти
- г. ферменти

156. При обстеженні пацієнта виникла необхідність визначення величини серцевого викиду. Який метод може бути використаний?

- а. сфінгографія
- б. рентгенографія
- в. ЕКГ
- г. ехокардіографія

157. Дівчина 16 років, при швидкому переході з горизонтального положення у вертикальне знепритомніла. Що з нижче наведеного спричинило виникнення непритомності?

- а. збільшення венозного повернення крові до серця
- б. збільшення ЧСС
- в. збільшення артеріального тиску
- г. зниження венозного повернення крові до серця

158. У судинах кров рухається завдяки:

- а. осмотичному тиску крові
- б. пасивному тиску крові

- в. скорочення міокарда передсердь
- г. градієнту тиску в напрямі від високого до нижчого

159. Вода у кишечнику всмоктується за рахунок:

- а. дифузії
- б. фільтрації
- в. осмосу
- г. дифузії та фільтрації

160. Вкажіть, що означає поняття лейкоцитоз?

- а. зменшення кількості еритроцитів
- б. збільшення кількості еритроцитів
- в. збільшення кількості лейкоцитів
- г. збільшення кількості лімфоцитів

161. Лейкоцитарна формула крові у здорових людей похилого віку характеризується:

- а. еозинофілією
- б. базофілією
- в. моноцитозом
- г. відсутністю особливих змін

162. Виберіть, яку основну функцію виконують еозинофіли?

- а. переносять кисень та вуглекислий газ
- б. зупинка кровотечі
- в. виділяють гістаміназу, забезпечують захист від паразитів
- г. захисна

163. Чим можна пояснити велику сприйнятливість дітей до 5 років до інфекційних захворювань:

- а. малим вмістом нейтрофілів
- б. недостатньою зрілістю нейтрофілів
- в. великим вмістом лімфоцитів
- г. малим вмістом та недостатньою зрілістю нейтрофілів

164. У хворого знижена активність імунітету. Які клітини є ефektorною ланкою імунної системи організму?

- а. лімфоцити
- б. ретикулоцити
- в. еритроцити
- г. тромбоцити

165. Виберіть, яку основну функцію виконують лейкоцити?

- а. переносять кисень та вуглекислий газ
- б. зупинка кровотечі
- в. захисна
- г. забезпечують обмін речовин

166. Виберіть, яка частина рефлекторної дуги забезпечує сприйняття змін зовнішнього або внутрішнього середовища організму?

- а. орган-ефектор
- б. рецептори
- в. відцентрові(еферентні) нервові волокна
- г. відділ ЦНС

167. Виберіть, яка частина рефлекторної дуги забезпечує виконання певних дій у відповідь на дію подразника?

- а. рецептори
- б. відцентрові(еферентні) нервові волокна
- в. відділ ЦНС
- г. орган-ефектор

168. Опір руху крові в різних судинах організму не однаковий. Від чого це залежить:

- а. від в'язкості крові і радіусу судини
- б. від довжини і радіусу судини
- в. від довжини судини і в'язкості крові
- г. від довжини судини, в'язкості крові і радіусу судини

169. Які лейкоцити після виходу з судинного русла зберігають потенцію до подальшого розвитку?

- а. базофіли
- б. моноцити
- в. еозинофіли
- г. лімфоцити

170. Виберіть, які види подразників бувають в залежності від причин?

- а. адекватний та неадекватний
- б. підпороговий, пороговий, надпороговий
- в. приємний та неприємний
- г. механічні, фізичні, хімічні

171. У дорослої людини частота дихання в 1 хвилину складає:

- а. 7-8
- б. 9-10
- в. 12-18
- г. 19-20

172. У яких клітинах крові людини відсутні ядра?

- а. еритроцитах
- б. лімфоцитах
- в. нейтрофілах
- г. базофілах

173. Назвіть 5 функцій лімфи:

- а. підтримання об'єму тканинної рідини, перенесення поживних речовин, фільтраційна, бар'єрна, участь в імунологічних реакціях
- б. захисна, терморегуляторна, видільна, транспортна, фільтраційна
- в. бар'єрна, видільна, захисна, гомеостатична, перенесення поживних речовин
- г. видільна, захисна, дренажна, гомеостатична, бар'єрна

174. З яких шарів складається стінка серця:
- а. міокарда і епікарда
 - б. епікарда і ендокарда
 - в. міокарда і ендокарда
 - г. епікарда, міокарда і ендокарда
175. Який метод використовують для реєстрації біопотенціалів серця:
- а. ЕКГ
 - б. реографію
 - в. ехокардіографію
 - г. спірографію
176. Який вид транспорту забезпечує проникнення високомолекулярних білків у лімфу?
- а. дифузія
 - б. перенесення за допомогою іонів натрію
 - в. перенесення за допомогою іонів калію
 - г. піноцитоз
177. Коагуляційний гемостаз протікає у три фази. Вкажіть назву другої фази зсідання крові
- а. утворення колагену
 - б. руйнування еритроцитів
 - в. утворення тромбіну
 - г. утворення фібрину
178. Поглинання клітиною крапельок рідини – це:
- а. фагоцитоз
 - б. екскреція
 - в. піноцитоз
 - г. рекреція
179. Вкажіть назву третьої фази зсідання крові:
- а. утворення колагену
 - б. перетворення протромбіну
 - в. перетворення фібриногену на фібрин
 - г. утворення гемоглобіну
180. Вкажіть назву речовини, яка сприяє перетворенню фібриногену плазми на фібрин?
- а. протромбіназа
 - б. фосфатаза
 - в. колаген
 - г. тромбін
181. Чим зумовлена в'язкість крові людини:
- а. концентрацією тромбоцитів
 - б. концентрацією іонів
 - в. кількістю лейкоцитів
 - г. кількістю еритроцитів
182. Людину вкусив отруйний павук. Які зміни в системі крові можуть відбутися внаслідок укусу?

- а. виникне тромбоцитоз
- б. виникне гемоліз еритроцитів
- в. виникне анемія
- г. виникне гіпоглікемія

183. При фізичній роботі у людини зростає швидкість зсідання крові внаслідок збільшення концентрації в крові?

- а. серотоніну
- б. гістаміну
- в. міоглобіну
- г. адреналіну

184. Екскреція – це

- а. виведення токсичних або шкідливих продуктів метаболізму
- б. поглинання клітиною рідини
- в. видалення структурних компонентів клітини за її межі
- г. виведення клітиною секреторних продуктів

185. Як називається постійне напруження гладких м'язів стінок судин?

- а. тонічна активність
- б. спонтанна активність
- в. залишковий тонус
- г. м'язовий тонус

186. Які лейкоцити є макрофагами?

- а. базофіли
- б. лімфоцити
- в. нейтрофіли
- г. моноцити

187. Як називаються рецептори, які реагують на зміну тиску?

- а. хеморецептори
- б. терморецептори
- в. адренорецептори
- г. механорецептори

188. Як називається гормон задньої частки гіпофіза, який викликає звуження артерій і артеріол органів черевної порожнини, легень, шкіри?

- а. вазопресин
- б. меланін
- в. окситоцин
- г. гонадотропін

189. Як зміниться просвіт судин серця при атеросклерозі?

- а. розширюються тільки вени, а артерії звужуються
- б. звуження вени і артерії
- в. змін просвіту судин не буде
- г. розширюються

190. Процес поглинання клітиною речовин - це:
- а. ендоцитоз
 - б. секреція
 - в. екзоцитоз
 - г. екскреція
191. Фібриноліз - це розщеплення фібрину. Де спостерігається процес фібринолізу у здорових людей?
- а. у тромбоцитах
 - б. у еритроцитах
 - в. у макрофагах
 - г. у неушкодженій судині
192. Що запобігає зворотному руху крові у венах?
- а. гладкі м'язи
 - б. клапани
 - в. прекапілярні сфінктери
 - г. середній шар стінки судини
193. Людина отруїлася чадним газом (CO). Яка сполука гемоглобіну утворилася у крові?
- а. оксигемоглобін
 - б. карбгемоглобін
 - в. дезоксигемоглобін
 - г. карбоксигемоглобін
194. Швидкість кровотоку в капілярах визначається градієнтом тиску в ?
- а. венах
 - б. артеріях
 - в. артеріоло-венулярних анастомозах
 - г. пре- і посткапілярах
195. Чому дорівнює кількість гемоглобіну в чоловіків:
- а. 130-160 г/л
 - б. 60-80 г/л
 - в. 90-110 г/л
 - г. 150-220 г/л
196. Чому дорівнює кількість гемоглобіну в жінок:
- а. 60-80 г/л
 - б. 90-110 г/л
 - в. 130-160 г/л
 - г. 120-140 г/л
197. У дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися?
- а. збільшення вмісту гемоглобіну
 - б. зменшення вмісту глобулінів
 - в. збільшення об'єму плазми
 - г. збільшення кількості еозинофілів

198. У студентки М., 19 років визначили концентрацію гемоглобіну. Виявилось, що результат відповідає нормі. Який показник відповідає нормі?

- а. 108 г/л
- б. 91 г/л
- в. 160 г/л
- г. 133 г/л

199. Де відбувається біосинтез основної кількості АТФ в клітині?

- а. у комплексі Гольджі
- б. на рибосомах
- в. у лізосомах
- г. у мітохондріях

200. Величина ЖЄЛ залежить від:

- а. віку, статі
- б. росту, маси тіла
- в. фізичного розвитку
- г. всіх перелічених показників

201. Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?

- а. життєва ємкість легень
- б. функціональна залишкова ємкість легень
- в. дихальний об'єм
- г. загальна ємкість легень

202. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?

- а. функціональна залишкова ємкість легень
- б. ємкість вдиху
- в. альвеолярний об'єм
- г. залишковий об'єм

203. Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в системі крові будуть у неї?

- а. збільшення кількості лейкоцитів
- б. зниження кількості лейкоцитів
- в. порідшення пульсу
- г. збільшення кількості гемоглобіну

204. У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

- а. дихальний об'єм
- б. життєва ємкість легенів
- в. резервний об'єм вдиху
- г. загальна ємкість легенів

205. Назвіть головний дихальний м'яз?

- а. зовнішні міжреберні м'язи
- б. внутрішні міжреберні м'язи
- в. діафрагма
- г. міжхрящові м'язи

206. Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові?

- а. оксигемоглобіну
- б. карбоксигемоглобіну
- в. дезоксигемоглобіну
- г. карбгемоглобіну

207. У особи відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон'юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при недостатці:

- а. вітаміну В
- б. вітаміну С
- в. вітаміну D
- г. вітаміну А

208. Недостатнє поступлення вітамінів супроводжується змінами обмінних і фізіологічних функцій організму. При якому гіповітамінозі спостерігається порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?

- а. вітамін Е
- б. вітамін А
- в. вітамін К
- г. вітамін D

209. Для підтримання нормальної еластичності та регенерації шкіри та її придатків необхідна достатня кількість вітаміну?

- а. С
- б. В12
- в. К
- г. А

210. Обстежуваний скаржиться на загальну слабкість і кровоточивість ясен. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого стану?

- а. вітаміна Е
- б. вітаміна С
- в. вітаміна А
- г. вітаміна F

211. Який гормон знижує вміст глюкози в крові?

- а. глюкагон
- б. адреналін
- в. соматотропний гормон
- г. інсулін

212. При підвищенні температури навколишнього середовища інтенсивність процесів обміну?

- а. незначно підвищується
 - б. значно підвищується
 - в. не змінюється
 - г. знижується
213. При зниженні температури навколишнього середовища інтенсивність процесів обміну:
- а. незначно знижується
 - б. підвищується
 - в. значно знижується
 - г. не змінюється
214. Виберіть, яку основну функцію виконують еритроцити ?
- а. захисна
 - б. зупинка кровотечі
 - в. переносять кисень та вуглекислий газ, приймають участь у визначенні груп крові
 - г. виділяють гістамін, забезпечують утворення алергічних реакцій
215. Непереносимість людьми молока виникає через дефіцит ферментів?
- а. лактози
 - б. ліпази
 - в. лактулози
 - г. фосфатази
216. Молочнокислі бактерії здатні продукувати вітаміни:
- а. С
 - б. А
 - в. Е
 - г. групи В
217. Під впливом молочнокислих бактерій кисломолочних продуктів перетворюється:
- а. лактулоза в молочну кислоту
 - б. лактоза в молочну кислоту
 - в. фруктоза в молочну кислоту
 - г. галактоза в молочну кислоту
218. Де локалізується центр терморегуляції?
- а. таламус
 - б. довгастий мозок
 - в. гіпофіз
 - г. гіпоталамус
219. Назвіть найбільше депо крові у людини:
- а. кишківник
 - б. нирки
 - в. серце
 - г. печінка
220. Які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити:

- а. вони забезпечують клітинний імунітет
- б. вони є нейтрофілами
- в. вони забезпечують дихання
- г. вони забезпечують травлення

221. Що імовірніше всього буде спостерігатись, якщо змішати на склі кров від двох випадково обраних здорових людей:

- а. агрегація
- б. нагрівання
- в. зміна забарвлення
- г. аглютинація

222. Чи можуть еритроцити, з якими відбулася аглютинація виконувати свої функції:

- а. так, бо клітини лишилися цілі
- б. ні, бо настає гемоліз
- в. так, бо гемоглобін не ушкоджений
- г. ні, бо антигени заблоковані антитілами

223. Де дозрівають лімфоцити:

- а. печінка
- б. селезінка
- в. щитоподібна залоза
- г. кістковий мозок

224. У клітинах м'язової тканини відбувається інтенсивний аеробний процес утворення і накопичення енергії у вигляді макроергічних зв'язків АТФ. В якій органелі відбуваються ці процеси?

- а. пероксисомі
- б. ендоплазматичній сітці
- в. лізосомі
- г. мітохондрії

225. Гепарин у крові виконує головну функцію:

- а. антикоагулянта
- б. антиоксиданта
- в. оксиданта
- г. прокоагулянта

226. Як побудована і які властивості має нервова тканина?

- а. складається з нейронів, характеризується скоротливістю
- б. складається з нейроглії, характеризується здатністю до регенерації
- в. складається з нейроглії, характеризується подразливістю і збудливістю;
- г. складається з нейронів і нейроглії, характеризується збудливістю і провідністю

227. Виберіть ознаки, характерні для лейкоцитів:

- а. є різних типів
- б. всі мають ядро
- в. основна функція захисна
- г. всі вище перелічені відповіді правильні

228. Клітини реагують з чужорідними антигенами, беруть участь у клітинних імунних реакціях, виконують функції регуляції імунної системи та сприяють виділенню імуноглобулінів іншими клітинами, які відповідальні за прояв гуморального імунітету. Про які клітини йде мова?

- а. В-лімфоцити
- б. Т-лімфоцити
- в. моноцити
- г. нейтрофіли

229. Нейрони, які посилають нервові імпульси до виконавчих органів, називають ... (знайдіть правильне продовження):

- а. руховими
- б. вставними
- в. чутливими
- г. аферентними

230. Коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

- а. усі перераховані причини
- б. у старих людей
- в. у дітей 5-10 років
- г. після прийому їжі

231. Які клітини беруть участь у розпізнаванні генетично чужорідних речовин та біосинтезі антитіл?

- а. нейтрофіли
- б. лімфоцити, моноцити
- в. базофіли
- г. еозинофіли

232. До білків плазми крові належать:

- а. протромбін, фібриноген
- б. еластин, колаген
- в. актин, міозин
- г. казеїн, осеїн

233. Залозами змішаної секреції є:

- а. молочні
- б. сальні
- в. кишкові
- г. статеві

234. Назвіть орган в якому здійснюється дихальна функція крові?

- а. лімфатичні вузли
- б. легені
- в. печінка
- г. червоний кістковий мозок

235. Назвіть орган в якому здійснюється руйнування еритроцитів?

- а. легені
- б. русло крові: макрофаги

- в. лімфатичні капіляри
- г. селезінка

236. Назвіть органи-депо лейкоцитів:

- а. шлунок
- б. кістковий мозок, селезінка, печінка
- в. легені
- г. серце

237. Кров складається із рідкої частини - плазми, скільки вона займає об'єму?

- а. 55-60%
- б. 40-60%
- в. 50-70%
- г. 40-45%

238. Який орган кісток виконує функцію кровотворення?

- а. остеон
- б. остеобласт
- в. червоний кістковий мозок
- г. остеоцит

239. Дитина смоче соску, що подразнюється при реалізації такого рефлексу:

- а. довгастий мозочок
- б. нерви
- в. гіпоталамус
- г. рецептори ротової порожнини

240. У шлунку людини відбулося порушення функції додаткових клітин покривного епітелію. Це призвело до зниження вмісту в складі соку:

- а. пепсиногену
- б. хлористоводневої кислоти
- в. слизу
- г. астриксину

241. Внутрішня оболонка серця – це:

- а. епікард
- б. міокард
- в. ендокард
- г. слизова

242. У людини виявлено недостатність вітаміну А. Недостатність, можливо, зв'язана з порушення всмоктування:

- а. поліпептидів
- б. вуглеводів
- в. амінокислот
- г. жирів

243. Як змінюється дихання, якщо повітря проникає у плевральну порожнину?

- а. виникає задишка
- б. дихання стає глибоким і рідким
- в. дихання стає неможливим
- г. дихання стає поверхневим і рідким

244. Найтонші артерії м'язового типу – це:

- а. вени
- б. венули
- в. артеріоли
- г. прекапіляри

245. У людини видалено жовчний міхур. Який з зазначених процесів не буде відбуватися

- а. гідроліз жиру
- б. жовчоутворення
- в. концентрування жовчі
- г. жовчовиділення

246. Обід з 3-х страв: свинина з картоплею, бульйон, компот. У якій послідовності треба приймати ці блюда, щоб забезпечити нормальну секрецію шлункового соку?

- а. бульйон, компот, свинина з картоплею
- б. компот, свинина з картоплею, бульйон
- в. свинина з картоплею, компот, бульйон
- г. бульйон, свинина з картоплею, компот

247. Через деякий час після надходження до шлунку молока відбувається його створення. Який з компонентів шлункового соку зумовлює такі зміни?

- а. соляна кислота
- б. пепсин
- в. гастрин
- г. слиз

248. До складу первинної сечі не входять:

- а. моносахариди
- б. азотисті сполуки
- в. еритроцити
- г. мінеральні солі

249. Кров, що йде від кишечника, проходить через

- а. селезінку
- б. печінку
- в. підшлункову залозу
- г. нирки

250. До функцій печінки не належить:

- а. підтримання гомеостазу
- б. знешкодження отруйних речовин
- в. відкладання про запас поживних речовин
- г. синтез гормонів

251. Підтримання гомеостазу, участь в обмінних процесах, знешкодження отруйних речовин, відкладання про запас поживних речовин, депонування крові – це функції:

- а. селезінки
- б. печінки
- в. підшлункової залози
- г. гіпофізу

252. У ротовій порожнині починається травлення:

- а. білків
- б. жирів
- в. вуглеводів
- г. нуклеїнових кислот

253. Травлення вуглеводів починається у:

- а. ротовій порожнині
- б. шлунку
- в. дванадцятипалій кишці
- г. порожній кишці

254. У шлунку починається травлення:

- а. білків
- б. жирів
- в. вуглеводів
- г. нуклеїнових кислот

255. Травлення білків починається у:

- а. ротовій порожнині
- б. шлунку
- в. дванадцятипалій кишці
- г. клубовій кишці

256. Травлення жирів найінтенсивніше відбувається у:

- а. ротовій порожнині
- б. шлунку
- в. дванадцятипалій кишці
- г. сліпій кишці

257. Травлення нуклеїнових кислот відбувається у:

- а. ротовій порожнині
- б. шлунку
- в. дванадцятипалій кишці
- г. сліпій кишці

258. Остаточне травлення білків відбувається у:

- а. ротовій порожнині
- б. шлунку
- в. дванадцятипалій кишці
- г. ободовій кишці

259. Ферменти, які містяться у слині:

- а. амілаза, птіалін
- б. муцин, лізоцим
- в. пепсин, трипсин
- г. ліпаза, нуклеаза

260. Фермент шлункового соку:

- а. птіалін
- б. трипсин
- в. пепсин
- г. сахараза

261. Фермент підшлункового соку, що розщеплює білки:

- а. птіалін
- б. трипсин
- в. пепсин
- г. мальтаза

262. Фермент кишкового соку:

- а. птіалін
- б. муцин
- в. пепсин
- г. сахараза

263. Амілаза, мальтаза – ферменти:

- а. слини
- б. шлункового соку
- в. підшлункового соку
- г. жовчі

264. Пепсин – фермент:

- а. слини
- б. шлункового соку
- в. підшлункового соку
- г. кишкового соку

265. Трипсин – фермент:

- а. слини
- б. шлункового соку
- в. підшлункового соку
- г. жовчі

266. Хімотрипсин – фермент:

- а. слини
- б. шлункового соку
- в. підшлункового соку
- г. жовчі

267. Ліпаза, нуклеази – ферменти:

- а. слини
- б. шлункового соку
- в. підшлункового соку
- г. жовчі

268. Мальтаза, сахараза, лактаза – ферменти:

- а. слини
- б. шлункового соку
- в. підшлункового соку
- г. кишкового соку

269. Пепсиноген (неактивна форма) перетворюється на пепсин (активна форма) під дією:

- а. H₂O
- б. HCl
- в. CO₂
- г. NaCl

270. Компонент слини, що служить для склеювання часточок їжі :

- а. птіалін
- б. муцин
- в. ліпаза
- г. лізоцим

271. Компонент слини, що має бактерицидні властивості :

- а. птіалін
- б. муцин
- в. ліпаза
- г. лізоцим

272. Під дією ферментів слини розщеплюється:

- а. глюкоза
- б. фруктоза
- в. крохмаль
- г. білок

273. Амілаза слини розщеплює крохмаль до:

- а. сахарози
- б. лактози
- в. галактози
- г. мальтози

274. Пепсин розщеплює білки до:

- а. вищих жирних кислот
- б. нуклеотидів
- в. тригліцеридів
- г. пептидів

275. Трипсин і хімотрипсин розщеплюють пептиди до:

- а. нуклеотидів
- б. моносахаридів
- в. амінокислот
- г. альдегідів

276. Солі жовчних кислот виконують функцію:

- а. емульгації жирів
- б. розщеплення тригліцеридів
- в. регуляції водно-сольового обміну
- г. активізації ферментів шлункового соку

277. Ліпаза розщеплює жири до:

- а. гліцерину і вищих жирних кислот
- б. нуклеотидів
- в. моносахаридів
- г. амінокислот

278. Залози, що мають протоки і виділяють секрети назовні або в порожнини органів:

- а. екзокринні
- б. ендокринні
- в. змішаної секреції
- г. загальні

279. Залози, що не мають протоків і виділяють секрети (гормони) безпосередньо в кров:

- а. екзокринні
- б. ендокринні
- в. змішаної секреції
- г. загальні

280. Залози, що одні секрети виділяють через протоки назовні або в порожнини органів, а інші (гормони) – безпосередньо в кров:

- а. екзокринні
- б. ендокринні
- в. змішаної секреції
- г. загальні

281. До екзокринних залоз не належать:

- а. потові
- б. слинні
- в. шлункові
- г. надниркові

282. До ендокринних залоз не належить:

- а. печінка
- б. щитоподібна залоза
- в. гіпофіз
- г. надниркова залоза

283. Екзокринною залозою є:

- а. печінка
- б. щитоподібна залоза
- в. гіпофіз
- г. епіфіз

284. Ендокринними залозами є:

- а. потові
- б. сальні
- в. шлункові
- г. надниркові

285. Залозою змішаної секреції є:

- а. печінка
- б. підшлункова залоза
- в. епіфіз
- г. під'язикова слинна залоза

286. Біологічно активні речовини різної хімічної природи, які в невеликих кількостях істотно впливають на функції організму (є факторами гуморальної регуляції):

- а. антигени
- б. антитіла
- в. гормони
- г. ферменти

287. Гіпоталамус є зоною:

- а. довгастого мозку
- б. мозочка
- в. середнього мозку
- г. проміжного мозку

288. Гормони, які синтезуються у гіпоталамусі і секретуються задньою часткою гіпофіза:

- а. окситоцин, вазопресин
- б. пролактин, тиреотропний гормон
- в. трийодтиронін, тироксин
- г. адреналін, норадреналін

289. Секрецію гормонів гіпофіза регулюють:

- а. статини, ліберини
- б. естрадіол, прогестерон
- в. трийодтиронін, тироксин
- г. адреналін, норадреналін

290. Частки гіпофіза:

- а. права, ліва
- б. передня, задня
- в. кіркова, мозкова
- г. зовнішня, внутрішня

291. Гормон задньої частки гіпофіза, який стимулює скорочення матки при пологах і виділення молока:

- а. окситоцин
- б. тиреотропний гормон
- в. вазопресин
- г. естрадіол

292. Гормон задньої частки гіпофіза, який регулює діурез (утворення вторинної сечі):

- а. окситоцин
- б. тиреотропний гормон
- в. вазопресин
- г. прогестерон

293. Антидіуретичний гормон гіпофіза регулює:

- а. секрецію гормонів надниркових залоз
- б. утворення вторинної сечі
- в. дозрівання еритроцитів
- г. ріст яйцевих фолікулів у жінок

294. Гормон передньої частки гіпофіза, який стимулює утворення молока:

- а. пролактин
- б. лютеїнізуючий гормон
- в. фолікулостимулюючий гормон
- г. тиреотропний гормон

295. Гормон передньої частки гіпофіза, який стимулює секрецію гормонів щитоподібної залози:

- а. лютеїнізуючий гормон
- б. фолікулостимулюючий гормон
- в. тиреотропний гормон
- г. соматотропний гормон

296. Гормон передньої частки гіпофіза, який стимулює секрецію гормонів надниркових залоз:

- а. адренкортикотропний гормон
- б. лютеїнізуючий гормон
- в. фолікулостимулюючий гормон
- г. соматотропний гормон

297. Гормон передньої частки гіпофіза, який стимулює білковий синтез, впливає на ріст кісток:

- а. адренкортикотропний гормон
- б. фолікулостимулюючий гормон
- в. тиреотропний гормон
- г. соматотропний гормон

298. При гіпофункції гіпофіза щодо секреції соматотропного гормону в дитячому віці розвивається:

- а. гігантизм
- б. карликовість
- в. акромегалія
- г. мікседема

299. При гіперфункції гіпофіза щодо секреції соматотропного гормону в дитячому віці розвивається:
- а. гігантизм
 - б. карликовість
 - в. мікседема
 - г. кретинізм
300. При гіперфункції гіпофіза щодо секреції соматотропного гормону в дорослому віці розвивається:
- а. карликовість
 - б. акромегалія
 - в. мікседема
 - г. кретинізм
301. Розростання окремих частин тіла, спричинене гіперфункцією гіпофіза щодо секреції соматотропного гормону в дорослому віці:
- а. карликовість
 - б. акромегалія
 - в. мікседема
 - г. кретинізм
302. Гормон епіфіза, який впливає на пігментацію шкіри:
- а. паратгормон
 - б. мелатонін
 - в. трийодтиронін
 - г. тироксин
303. Статеві клітини самців називаються:
- а. сперматогонії
 - б. сперматоцити
 - в. сперматозоїди (спермії)
 - г. сперматиди
304. Гормон щитоподібної залози, що регулює основний обмін, процеси росту і розвитку організму:
- а. глюкагон
 - б. соматотропін
 - в. тироксин
 - г. адреналін
305. При гіпофункції щитоподібної залози в дитячому віці розвивається:
- а. гігантизм
 - б. карликовість
 - в. мікседема
 - г. кретинізм
306. При гіпофункції щитоподібної залози в дорослому віці розвивається:
- а. цукровий діабет
 - б. Аддісонова хвороба
 - в. мікседема
 - г. кретинізм

307. При гіперфункції щитоподібної залози в дорослому віці розвивається:
- а. базедова хвороба
 - б. Аддісонова хвороба
 - в. карликовість
 - г. цукровий діабет
308. Затримка фізичного і психічного розвитку, спричинена гіпофункцією щитоподібної залози в дитячому віці:
- а. базедова хвороба
 - б. Аддісонова хвороба
 - в. акромегалія
 - г. кретинізм
309. Зниження інтенсивності обміну, спричинене гіпофункцією щитоподібної залози в дорослому віці:
- а. карликовість
 - б. Аддісонова хвороба
 - в. акромегалія
 - г. мікседема
310. Підвищення інтенсивності обміну, спричинене гіперфункцією щитоподібної залози в дорослому віці:
- а. базедова хвороба
 - б. Аддісонова хвороба
 - в. карликовість
 - г. кретинізм
311. Розростання щитоподібної залози, спричинене нестачею йоду в їжі:
- а. базедова хвороба
 - б. акромегалія
 - в. мікседема
 - г. зоб
312. Гормон прищитоподібної залози, який регулює вміст Са і Р в плазмі крові:
- а. мелатонін
 - б. адреналін
 - в. глюкагон
 - г. паратгормон.
313. Нефрон – це основна структурна і функціональна одиниця:
- а. печінки
 - б. селезінки
 - в. підшлункової залози
 - г. нирки;
314. Шари надниркової залози:
- а. роговий, ростковий
 - б. твердий, м'який

- в. пірамідальний, сітчастий
- г. кірковий, мозковий

315. Гормон мозкового шару наднирників, який підвищує частоту і силу серцевих скорочень:

- а. альдостерон
- б. глюкагон
- в. тироксин
- г. адреналін

316. Кортикостероїди є гормонами:

- а. кіркового шару наднирників
- б. підшлункової залози
- в. задньої частки гіпофіза
- г. щитоподібної залози

317. Мінералокортикоїди є гормонами:

- а. кіркового шару наднирників
- б. підшлункової залози
- в. задньої частки гіпофіза
- г. щитоподібної залози

318. Глюкокортикоїди є гормонами:

- а. кіркового шару наднирників
- б. підшлункової залози
- в. задньої частки гіпофіза
- г. щитоподібної залози

319. CO₂ виділяється з організму через:

- а. сечовидільну систему
- б. дихальну систему
- в. травну систему
- г. ендокринну систему

320. До органів сечовидільної системи не належить:

- а. нирка
- б. сечовід
- в. сечовий міхур
- г. надниркова залоза

321. Гормон кори наднирників, що регулює водно-сольовий обмін:

- а. інсулін
- б. альдостерон
- в. адреналін
- г. трийодтиронін

322. Гормон кори наднирників, що впливає на обмін білків, жирів, вуглеводів:

- а. кортизон
- б. інсулін

- в. мелатонін
- г. трийодтиронін

323. При гіперфункції наднирників розвивається:

- а. карликовість
- б. Аддісонова хвороба
- в. акромегалія
- г. мікседема

324. Гормоном підшлункової залози є:

- а. паратгормон
- б. кортизон
- в. інсулін
- г. тироксин

325. Гормон підшлункової залози, який знижує рівень глюкози в крові (сприяє перетворенню глюкози в глікоген):

- а. мелатонін
- б. інсулін
- в. глюкагон
- г. адреналін

326. Як називається бічне викривлення хребта?

- а. кіфоз
- б. лордоз
- в. сколіоз
- г. ні одна відповідь не вірна

327. Гормон підшлункової залози, який підвищує рівень глюкози в крові (сприяє перетворенню глікогену в глюкозу):

- а. мелатонін
- б. інсулін
- в. глюкагон
- г. адреналін

328. При гіпофункції підшлункової залози щодо секреції інсуліну розвивається:

- а. цукровий діабет
- б. Аддісонова хвороба
- в. акромегалія
- г. мікседема

329. Андрогени є гормонами:

- а. яєчників
- б. сім'яників
- в. щитоподібної залози
- г. підшлункової залози

330. Естрогени є гормонами:

- а. яєчників
- б. сім'яників
- в. щитоподібної залози
- г. підшлункової залози

331. Гормоном сім'яників є:

- а. естрадіол
- б. прогестерон
- в. тестостерон
- г. альдостерон

332. Гормоном яєчників є:

- а. паратгормон
- б. естрадіол
- в. тестостерон
- г. альдостерон

333. Гормон сім'яників, який впливає на розвиток вторинних чоловічих ознак і на репродуктивні функції:

- а. естрадіол
- б. прогестерон
- в. тестостерон
- г. альдостерон

334. Рідка сполучна тканина, яка циркулює в серцево-судинній системі організму людини:

- а. міжклітинна рідина
- б. кров
- в. плазма
- г. лімфа

335. До функцій крові не належить:

- а. дихальна
- б. трофічна
- в. видільна
- г. асиміляційна

336. Дихальна функція крові полягає в тому, що вона:

- а. транспортує O_2 і CO_2
- б. транспортує поживні речовини
- в. транспортує продукти обміну
- г. забезпечує імунний захист організму

337. Трофічна функція крові полягає в тому, що вона:

- а. транспортує O_2 і CO_2
- б. транспортує поживні речовини
- в. транспортує продукти обміну
- г. забезпечує імунний захист організму

338. Видільна функція крові полягає в тому, що вона:

- а. транспортує O₂ і CO₂
- б. транспортує поживні речовини
- в. транспортує продукти обміну
- г. забезпечує імунний захист організму

339. Захисна функція крові полягає в тому, що вона:

- а. транспортує O₂ і CO₂
- б. транспортує поживні речовини
- в. транспортує продукти обміну
- г. забезпечує імунний захист організму

340. Гуморальна функція крові полягає в тому, що вона:

- а. транспортує O₂ і CO₂
- б. транспортує поживні речовини
- в. транспортує гормони та інші біологічно активні речовини
- г. забезпечує імунний захист організму

341. До білків плазми крові не належить:

- а. протромбін
- б. фібриноген
- в. сироватковий альбумін
- г. кератин

342. Форменими елементами крові є:

- а. хондроцити, хондробласти
- б. лейкоцити, тромбоцити
- в. адипоцити, меланоцити
- г. остеобласти, остеобласти

343. Червоні кров'яні тільця:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. гепатоцити

344. Без'ядерні клітини крові, що мають форму двовгнутого диска:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. гепатоцити

345. Клітини крові, що містять у цитоплазмі дихальний пігмент гемоглобін:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. гепатоцити

346. Еритроцити мають форму:

- а. двовгнутого диска
- б. двоопуклої лінзи
- в. веретеноподібну
- г. кубічну

347. Місцем утворення еритроцитів є:

- а. тимус, лімфатичні вузли
- б. червоний кістковий мозок, селезінка
- в. печінка, підшлункова залоза
- г. гіаліновий хрящ, окістя

348. У червоному кістковому мозку і селезінці утворюються:

- а. гепатоцити
- б. еритроцити
- в. остеоцити
- г. меланоцити

349. Основною функцією еритроцитів є транспорт:

- а. H_2O
- б. CO_2
- в. O_2
- г. CO

350. Дихальний пігмент, що міститься в цитоплазмі еритроцитів:

- а. гемоціанін
- б. гемоглобін
- в. родопсин
- г. родопсин

351. Нестійка сполука гемоглобіну з O_2 :

- а. гем
- б. міоглобін
- в. карбаміногемоглобін
- г. оксигемоглобін

352. Кров, насичена O_2 :

- а. артеріальна
- б. венозна
- в. капілярна
- г. серцева

353. Кров, насичена CO_2 :

- а. артеріальна
- б. венозна
- в. капілярна
- г. серцева

354. Артеріальною називається кров, яка:

- а. насичена O₂
- б. насичена CO₂
- в. насичена CO
- г. ні одна відповідь невірна

355. Венозною називається кров, яка:

- а. насичена O₂
- б. насичена CO₂
- в. насичена CO
- г. ні одна відповідь невірна

356. Зменшення кількості еритроцитів або зниження в них вмісту гемоглобіну:

- а. лейкоцитоз
- б. лейкопенія
- в. гемофілія
- г. недокрів'я

357. Білі кров'яні тільця:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. подоцити

358. Ядерні, безбарвні клітини крові:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. гепатоцити

359. Клітини крові, для яких характерний амебоїдний рух:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. остецити

360. Клітини крові, які здатні до фагоцитозу:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. еритробласти

361. Кров'яні пластинки:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. лімфоцити

362. Формені елементи крові, що представлені без'ядерними фрагментами клітин і мають округлу або неправильну форму:

- а. еритроцити
- б. лейкоцити
- в. тромбоцити
- г. лімфоцити

363. Основною функцією тромбоцитів є:

- а. підтримання гомеостазу
- б. транспорт CO₂
- в. транспорт O₂
- г. забезпечення зсідання крові

364. Захисна реакція організму, що запобігає крововтраті:

- а. реакція аглютинації
- б. стрес
- в. відторгнення трансплантату
- г. зсідання крові

365. Зсідання крові можливе за наявності у плазмі білка:

- а. еластину
- б. колагену
- в. фібриногену
- г. міозину

366. Білок, який формує тромб (сітку волокон, у якій застрягають формені елементи крові):

- а. тромбопластин
- б. тромбін
- в. фібриноген
- г. фібрин

367. Речовини плазми крові, які запобігають утворенню тромбів:

- а. протромбін, фібриноген
- б. фібринолізин, гепарин
- в. інсулін, глюкагон
- г. аглютиноген, аглютинін

368. Спадкове захворювання, що виявляється в нездатності крові до зсідання:

- а. ахондроплазія
- б. фенілкетонурія
- в. серпоподібноклітинна анемія
- г. гемофілія

369. Ознакою спадкового захворювання гемофілії є:

- а. аномалія розвитку головного мозку
- б. порушення колірного зору
- в. зміна форми еритроцитів
- г. нездатність крові до зсідання

370. Речовини білкової природи на мембранах еритроцитів, наявність чи відсутність яких визначає групу крові:

- а. аглютиногени
- б. аглютиніни
- в. антитіла
- г. антигени

371. В крові однієї людини не може бути одночасно:

- а. аглютиногену А і аглютиніну β
- б. аглютиногену В і аглютиніну α
- в. аглютиногену В і аглютиніну β
- г. аглютинінів α і β

372. В крові I групи містяться:

- а. аглютиноген А і аглютинін β
- б. аглютиноген В і аглютинін α
- в. аглютиноген А і аглютинін α
- г. аглютиніни α і β

373. В крові II групи містяться:

- а. аглютиноген А і аглютинін β
- б. аглютиноген В і аглютинін α
- в. аглютиноген А і аглютинін α
- г. аглютиногени А і В

374. В крові III групи містяться:

- а. аглютиноген А і аглютинін β
- б. аглютиноген В і аглютинін α
- в. аглютиноген А і аглютинін α
- г. аглютиніни α і β

375. В крові IV групи містяться:

- а. аглютиноген А і аглютинін β
- б. аглютиноген В і аглютинін α
- в. аглютиногени А і В
- г. аглютиніни α і β

376. Група крові, яка характеризується вмістом аглютиногену А і аглютиніну β :

- а. I
- б. II
- в. III
- г. IV

377. Група крові, яка характеризується вмістом аглютиногену В і аглютиніну α :

- а. I
- б. II
- в. III
- г. IV

378. Група крові, яка характеризується вмістом аглютиногенів А і В:

- а. I
- б. II
- в. III
- г. IV

379. Група крові, яка характеризується вмістом аглютининів α і β :

- а. I
- б. II
- в. III
- г. IV

380. Людина, яка приймає кров при переливанні:

- а. донор
- б. реципієнт
- в. акцептор
- г. рецептор

381. Універсальними донорами є люди з групою крові:

- а. I
- б. II
- в. III
- г. IV

382. Універсальними реципієнтами є люди з групою крові:

- а. I
- б. II
- в. III
- г. IV

383. Прояв захисних реакцій організму, спрямованих на збереження гомеостазу, у відповідь на генетично чужорідні речовини:

- а. стрес
- б. алергія
- в. імунітет
- г. інстинкт

384. Генетично чужорідні речовини:

- а. медіатори
- б. коф фактори
- в. коферменти
- г. антигени

385. Види імунітету за природою:

- а. центральний, периферичний
- б. клітинний, гуморальний
- в. мимовільний, довільний
- г. пластичний, енергетичний

386. Види імунітету за походженням:

- а. центральний, периферичний
- б. природний, штучний
- в. короткочасний, довготривалий
- г. мимовільний, довільний

387. Імунітет, який забезпечується фагоцитами:

- а. клітинний
- б. гуморальний
- в. пластичний
- г. умовний

388. Імунітет, який забезпечується білковими речовинами:

- а. клітинний
- б. гуморальний
- в. пластичний
- г. безумовний

389. Клітинний імунітет забезпечується:

- а. тромбоцитами
- б. фагоцитами
- в. еритроцитами
- г. гепатоцитами

390. Гуморальний імунітет забезпечується:

- а. вітамінами
- б. гормонами
- в. фагоцитами
- г. антитілами

391. Імунітет, спрямований на знищення хвороботворних мікроорганізмів:

- а. інфекційний
- б. трансплантаційний
- в. протипухлинний
- г. безумовний

392. Імунітет, спрямований на відторгнення чужорідних тканин чи органів:

- а. інфекційний
- б. трансплантаційний
- в. протипухлинний
- г. безумовний

393. Імунітет, спрямований на знищення новоутворень в організмі:

- а. інфекційний
- б. трансплантаційний
- в. протипухлинний
- г. безумовний

394. Імунітет, який успадковується від батьків:

- а. штучний
- б. активний
- в. набутий
- г. природжений

395. Імунітет, який виникає після перенесення інфекційних захворювань:

- а. штучний
- б. пасивний
- в. набутий
- г. природжений

396. Ослаблена або вбита культура хвороботворних мікроорганізмів:

- а. інтерферон
- б. вакцина
- в. антибіотик
- г. сироватка

397. Стан підвищеної чутливості організму до дії алергенів:

- а. анорексія
- б. гіпертензія
- в. анемія
- г. алергія

398. Рух крові по замкнених порожнинах серця і кровоносних судин:

- а. кровообіг
- б. тиск крові
- в. пульс
- г. систола

399. Порожнистий м'язовий орган у формі сплющеного конуса, розташований у передній частині грудної клітки:

- а. аорта
- б. серце
- в. легені
- г. діафрагма

400. Сукупність структур, що поєднують, узгоджують, регулюють роботу органів і систем, забезпечують зв'язок організму з навколишнім середовищем, а також діяльність людини як соціальної істоти:

- а. нервова система
- б. ендокринна система
- в. кровоносна система
- г. травна система

401. Клітини нервової тканини, які спеціалізуються на проведенні нервових імпульсів:

- а. остеобласти
- б. нематобласти
- в. нейрони
- г. подоцити

402. Сукупність клітин нервової тканини, які забезпечують в ЦНС механічну і трофічну підтримку нейронам:

- а. синцитій
- б. нейроглія
- в. симпласт
- г. гіподерма

403. Короткі відростки, що проводять нервові імпульси до тіла нейрона:

- а. синапси
- б. аксони
- в. дендрити
- г. перикаріони

404. Довгий відросток, що проводить нервові імпульси від тіла нейрона:

- а. синапс
- б. аксон
- в. дендрит
- г. перикаріон

405. Нейрон, який проводить нервовий імпульс від рецептора до ЦНС:

- а. аферентний
- б. вставний
- в. еферентний
- г. руховий

406. Нейрон, який зв'язує між собою нейрони в ЦНС:

- а. аферентний
- б. вставний
- в. еферентний
- г. руховий

407. Нейрон, який проводить нервовий імпульс від ЦНС до робочого органа:

- а. аферентний
- б. вставний
- в. руховий
- г. чутливий

408. Виникнення нервового імпульсу:

- а. збудження
- б. гальмування
- в. іррадіація
- г. концентрація

409. Припинення збудження у нервовій системі:

- а. термінація
- б. гальмування
- в. іррадіація
- г. концентрація

410. Сигнал електрохімічної природи, який проходить мембранами нейронів:
- а. синапс
 - б. нервовий імпульс
 - в. струм
 - г. систола
411. Головними процесами, що відбуваються у нервовій системі, є:
- а. кон'югація, трансформація, трансдукція
 - б. прогрес, регрес
 - в. ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація
 - г. збудження, гальмування
412. Місце функціонального сполучення між нейронами, у якому здійснюється передача нервового імпульсу:
- а. синапс
 - б. перикаріон
 - в. кінцева пластинка
 - г. акросома
413. Реакція організму у відповідь на будь-яке подразнення, яка здійснюється і контролюється нервовою системою:
- а. таксис
 - б. тропізм
 - в. рефлекс
 - г. імунітет
414. Шлях, по якому проходить нервовий імпульс при здійсненні рефлексу:
- а. рефлекторний цикл
 - б. рефлекторна дуга
 - в. рефлекторний колектор
 - г. симпласт
415. Сприймаючий апарат рефлекторної дуги:
- а. рецептор
 - б. аферентний нейрон
 - в. еферентний нейрон
 - г. ефектор
416. Компонент рефлекторної дуги, який проводить нервовий імпульс до ЦНС:
- а. рецептор
 - б. аферентний нейрон
 - в. вставний нейрон
 - г. еферентний нейрон
417. Компонент рефлекторної дуги, який міститься у ЦНС:
- а. рецептор
 - б. аферентний нейрон

- в. вставний нейрон
- г. ефектор

418. Компонент рефлекторної дуги, який проводить нервовий імпульс від ЦНС:

- а. рецептор
- б. аферентний нейрон
- в. вставний нейрон
- г. еферентний нейрон

419. Рецептори, які сприймають механічні подразнення, містяться у шкірі, у внутрішньому вусі, в органі рівноваги, в опорно-руховій системі, у внутрішніх органах:

- а. фоторецептори
- б. хеморецептори
- в. механорецептори
- г. терморецептори

420. Рецептори, які сприймають зміни температури, містяться в шкірі:

- а. фоторецептори
- б. хеморецептори
- в. механорецептори
- г. терморецептори

421. Анатомічно нервова система поділяється на:

- а. первинну, вторинну
- б. зовнішню, внутрішню
- в. зосереджену, розсіяну
- г. центральну, периферичну

422. Нервова система, що включає нерви, нервові сплетення, нервові вузли:

- а. первинна
- б. базальна
- в. центральна
- г. периферична

423. Нервова система, що іннервує скелетні м'язи і органи чуття:

- а. основна
- б. базальна
- в. соматична
- г. автономна

424. Нервова система, що іннервує внутрішні органи:

- а. основна
- б. базальна
- в. вегетативна
- г. соматична

425. Відділи автономної (вегетативної) нервової системи:

- а. руховий, чутливий
- б. симпатичний, парасимпатичний

- в. сприймаючий, провідниковий
- г. аферентний, еферентний

426. Оцінка та інтеграція інформації, що надходить від м'язів, суглобів, сухожиль, вестибулярного апарату, рухових центрів кори великих півкуль відбувається у:

- а. довгастому мозку
- б. мозочку
- в. середньому мозку
- г. проміжному мозку

427. Відділ головного мозку, основною функцією якого є узгодження та координація рухів організму:

- а. довгастий мозок
- б. мозочок
- в. середній мозок
- г. проміжний мозок

428. Підкіркові центри зору, слуху, м'язового тонусу містяться у ядра:

- а. довгастого мозку
- б. мозочка
- в. середнього мозку
- г. проміжного мозку

429. Сукупність процесів утворення складних органічних речовин із простіших з використанням енергії:

- а. денатурація
- б. дисиміляція
- в. анаболізм
- г. катаболізм

430. Система органів, через яку з організму виділяються азотисті сполуки, іони мінеральних солей:

- а. кровоносна
- б. дихальна
- в. травна
- г. сечовидільна

431. Сукупність процесів розпаду (окиснення) складних органічних речовин до простіших із вивільненням енергії:

- а. денатурація
- б. катаболізм
- в. анаболізм
- г. асиміляція

432. Моносахариди окиснюються у мітохондріях до:

- а. HCl і H₂O
- б. NO₂ і H₂O
- в. SO₂ і H₂O
- г. CO₂ і H₂O

433. NH₃ бере участь в утворенні:

- а. сечовини
- б. глікогену
- в. целюлози
- г. глюкози

434. Надлишок глюкози перетворюється на глікоген у:

- а. шлунку
- б. селезінці
- в. підшлунковій залозі
- г. печінці

435. Надлишок глюкози в печінці перетворюється на:

- а. глікоген
- б. гліцерин
- в. целюлозу
- г. пектин

436. Біологічно активні речовини різної хімічної природи, які в невеликих кількостях істотно впливають на обмінні процеси і необхідні для нормальної життєдіяльності організму:

- а. антитіла
- б. ферменти
- в. вітаміни
- г. фітонциди

437. Відсутність певних вітамінів в організмі:

- а. гіповітаміноз
- б. гіпервітаміноз
- в. авітаміноз
- г. анорексія

438. Нестача певних вітамінів в організмі:

- а. авітаміноз
- б. гіповітаміноз
- в. гіпервітаміноз
- г. гіпотензія

439. Надлишок певних вітамінів в організмі:

- а. авітаміноз
- б. гіповітаміноз
- в. гіпервітаміноз
- г. гіпертензія

440. Недостатня кількість вітамінів у продуктах харчування є однією з причин:

- а. гіповітамінозу
- б. гіпервітамінозу
- в. гіподинамії
- г. гіпотонії

441. Приклад залози змішаної секреції:

- а. Печінка
- б. гіпофіз
- в. підшлункова залоза
- г. щитовидна залоза

442. Залози внутрішньої секреції виділяють гормони , які надходять в:

- а. кров
- б. кишечник
- в. нервові клітини
- г. статеві клітини

443. Для лікування важких форм цукрового діабету хворим необхідно вводити:

- а. гемоглобін
- б. антитіла
- в. інсулін
- г. глікоген

444. Спинний мозок – це частина:

- а. центральної нервової системи
- б. хребта
- в. головного мозку
- г. периферичної нервової системи

445. Прозора передня частина білкової оболонки (склери) – це :

- а. райдужка
- б. жовта пляма
- в. сітківка
- г. рогівка

446. В якій оболонці ока знаходяться рецептори у вигляді паличок і колб?

- а. білковій (склері)
- б. судинній
- в. сітківці
- г. райдужній

447. Нюхові рецептори розташовані в:

- а. нюховому тракті
- б. нюховій області носової порожнини
- в. в трахеї
- г. в зоні кори головного мозку

448. До складу внутрішнього вуха входять:

- а. слухові кісточки
- б. барабанна перетинка
- в. завитка і півколові канали
- г. вушна раковина

449. Людина здатна відчувати смак речовин:

- а. тільки сухих
- б. тільки летючих
- в. тільки розчинених у воді (слині)
- г. тільки твердих

450. Функція чутливого нейрона:

- а. перетворює подразнення в нервові імпульси
- б. передає у мозок нервові імпульси від органів чуття і внутрішніх органів
- в. здійснює передачу нервових імпульсів з одного нейрона на інший в спинному мозку
- г. передає нервові імпульси м'язам , залозам і іншим виконавчим органам

451. Функція рухового нейрона:

- а. перетворює подразнення в нервові імпульси
- б. передає у мозок нервові імпульси від органів чуття і внутрішніх органів
- в. здійснює передачу нервових імпульсів з одного нейрона на інший в спинному мозку
- г. передає нервові імпульси м'язам , залозам і іншим виконавчим органам

452. Яка функція еритроцитів?

- а. зсідання крові
- б. транспорт газів
- в. захист від чужорідних агентів
- г. виділення гормонів

453. Яка функція лейкоцитів?

- а. зсідання крові
- б. транспорт газів
- в. захист від чужорідних агентів
- г. виділення гормонів

454. Яка функція тромбоцитів?

- а. зсідання крові
- б. транспорт газів
- в. захист від чужорідних агентів
- г. виділення гормонів

455. Укажіть, скільки пар нервів відходить від спинного мозку:

- а. 31
- б. 12
- в. 25
- г. 70

456. Укажіть відділ головного мозку, в якому утворюються звивини та борозни:

- а. кора великих півкуль
- б. проміжний мозок
- в. довгастий мозок
- г. середній мозок

457. Визначте, до якої нервової системи належить головний мозок:

- а. периферичної
- б. центральної
- в. вегетативної
- г. соматичної

458. Визначте, за допомогою чого відбувається нервова регуляція:

- а. рефлексів
- б. гормонів
- в. лімфи та крові
- г. міжклітинної речовини

459. Укажіть відділ головного мозку, що відповідає за координацію рухів людини:

- а. великий мозок
- б. мозочок
- в. довгастий мозок
- г. середній мозок

460. Найменшою структурною одиницею людського організму є:

- а. тканина
- б. клітина
- в. орган
- г. функціональна система

461. Яка з перерахованих тканин здатна до збудження:

- а. хрящова
- б. кісткова
- в. епітеліальна
- г. нервова

462. М'язи серця складаються з:

- а. гладенької м'язової тканини
- б. посмугованої м'язової тканини
- в. особливої м'язової тканини
- г. ні одна відповідь не вірна

463. Хребет складається з:

- а. 33-34 хребців
- б. 36-37 хребців
- в. 41-42 хребців
- г. ні одна відповідь не вірна

464. Шийний відділ складається з:

- а. 4 хребців
- б. 7 хребців
- в. 12 хребців
- г. ні одна відповідь не вірна

465. Як називається хвороба, при нестачі вітаміну D в організмі дитини і порушенні мінералізації кісток:

- а. хвороба Дауна
- б. рахіт
- в. параліч
- г. цукровий діабет

466. Грудний відділ складається з:

- а. 12 хребців
- б. 14 хребців
- в. 16 хребців
- г. 7 хребців

467. Двоопукла еластична прозора лінза – це :

- а. кришталік
- б. рогівка
- в. склоподібне тіло
- г. склера

468. У головному мозку півкулі і кору мають:

- а. півкулі великого мозку і мозочок
- б. мозочок і проміжний мозок
- в. середній мозок і півкулі великого мозку
- г. проміжний мозок і півкулі великого мозку

469. Як називається викривлення хребта опуклістю вперед?

- а. сколіоз
- б. кіфоз
- в. лордоз
- г. ні одна відповідь не вірна

470. Як називається викривлення хребта опуклістю хребта назад?

- а. сколіоз
- б. кіфоз
- в. лордоз
- г. ні одна відповідь не вірна

471. Яка частина органа виконує функцію кровотворення?

- а. остеон
- б. остеобласт
- в. червоний кістковий мозок
- г. окістя

472. Які кістки черепа з'єднані рухомо?

- а. лобна
- б. верхня щелепна
- в. нижня щелепна
- г. скронева

473. Кінці скількох останніх пар ребер розташовані вільно?

- а. 2
- б. 5
- в. 7
- г. 4

474. Яка тканина є сполученням кісток у новонароджених?

- а. хрящ
- б. посмуговані м'язи
- в. епітеліальна
- г. гладенькі м'язи

475. Основою скелету тулуба є:

- а. таз
- б. хребет
- в. шийний відділ хребта
- г. череп

476. Чи є в хребті такі відділи:

- а. шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий
- б. черепний, грудний, поперековий, крижовий, тазовий
- в. черепний, шийний, грудний, крижовий, тазовий
- г. ні одна відповідь не вірна

477. Скількома парами ребер утворена грудна клітка?

- а. 17 пар ребер
- б. 12 пар ребер
- в. 15 пар ребер
- г. 6 пар ребер

478. Як впливає на діурез (виділення сечі) зменшення споживання води?

- а. зменшує кількість сечі
- б. збільшує кількість сечі
- в. відсутність сечі
- г. ні одна відповідь не вірна

479. Як впливає на діурез (виділення сечі) крововтрата?

- а. зменшує кількість сечі
- б. збільшує кількість сечі
- в. відсутність сечі
- г. ні одна відповідь не вірна

480. Як впливає на серцево-судинну систему крововтрата?

- а. знижується артеріальний тиск
- б. підвищується артеріальний тиск
- в. не змінюється тиск
- г. ні одна відповідь не вірна

481. Що з'являється в сечі при цукровому діабеті?

- а. білок
- б. кров
- в. цукор
- г. ні одна відповідь не вірна

482. Чи можна втамувати спрагу морською водою?

- а. можна
- б. не можна
- в. небажано
- г. ні одна відповідь не вірна

483. Чи бажано дітям використовувати памперси?

- а. небажано
- б. бажано
- в. бажано тільки на ніч
- г. ні одна відповідь не вірна

484. Які органи беруть участь у виведенні води?

- а. м'язи
- б. кістки
- в. нирки, легені, кишечник
- г. печінка

485. Скільки в нирці нефронів?

- а. 200
- б. 500
- в. 1000
- г. мільйон

486. Що є функціональною одиницею нирки?

- а. нейрон
- б. нефрон
- в. альвеола
- г. ниркові каналці

487. Яка сеча стікає у ниркові каналці?

- а. вторинна
- б. первинна
- в. третинна
- г. ні одна відповідь не вірна

488. Цистит — це:

- а. запалення слизової оболонки печінки
- б. запалення слизової оболонки сечового міхура
- в. запалення слизової оболонки тонкого кишечника
- г. запалення слизової оболонки шлунка

489. Запалення нирок називають:

- а. цистит
- б. нефрит
- в. уретрит
- г. панкреатит

490. Яка сеча стікає у ниркову миску?

- а. вторинна
- б. первинна
- в. третинна
- г. ні одна відповідь не вірна

491. Вегетативна нервова система регулює роботу:

- а. скелетних м'язів
- б. кісток
- в. серця
- г. ні одна відповідь не вірна

492. Вегетативна нервова система ділиться на:

- а. 1 відділ
- б. 2 відділи
- в. 4 відділи
- г. 7 відділів

493. Виведення з організму непотрібних і шкідливих (отруйних) продуктів життєдіяльності:

- а. живлення
- б. виділення
- в. дихання
- г. енергетичний обмін

494. В передніх рогах спинного мозку знаходяться тіла:

- а. вставних нейронів
- б. рухових нейронів
- в. чутливих нейронів
- г. чутливих і рухових нейронів

495. Центральний відділ парасимпатичної нервової системи знаходиться в:

- а. середньому мозку, довгастому мозку, мості, бічних рогах крижового відділу спинного мозку
- б. проміжному мозку
- в. мозочку
- г. в корі великих півкуль

496. Яка частина вегетативної нервової системи прискорює роботу органів?

- а. симпатична
- б. парасимпатична
- в. соматична
- г. ні одна відповідь не вірна

497. Яка частина вегетативної нервової системи сповільнює роботу органів :

- а. соматична
- б. парасимпатична
- в. симпатична
- г. ні одна відповідь не вірна

498. Де локалізується центральний відділ симпатичної нервової системи?

- а. бічні роги спинного мозку
- б. в довгастому мозку
- в. мозочку
- г. в мості

499. Бічні шлуночки є порожнинами:

- а. проміжного мозку
- б. кінцевого мозку
- в. заднього мозку
- г. середнього мозку

500. В передніх корінцях спинного мозку проходять волокна:

- а. чутливі
- б. змішані
- в. рухові
- г. чутливі і рухові